Volksgezondheid
Veiligheid van de Voedselketen
Leefmilieu

DG Dier, Plant, Voeding
Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten

Dossiernummer: 39114
Datum ondertekening: 17/09/2025

TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL

Betreft : Aanpassing productiesite

Handelsbenaming :

FUBOL

Toelatingsnummer :

29597P/B

Gebruikerscategorie : **PROFESSIONEEL**

Toelatingshouder :

Syngenta Crop Protection
Naamloze vennootschap
Avenue Louise 489
1050 BRUXELLES
Belgique

Aard van het middel : **Fungicide**

Formuleringstype : **SL (Met water mengbaar concentraat)**

Gewaarborgd gehalte van de werkzame stof(fen), synergist(en) en beschermstof(fen) :

- **metalaxyl-M: 465,2 g/l (werkzame stof)**

Deze toelating is geldig van **22/09/2025** tot en met **31/05/2036** en vervangt elke eventuele voorafgaande toelatingsakte voor dit product.

Toegekende punten voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage (in toepassing van het koninklijk besluit

van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten) : **3**.

Het product, voor zover het voldoet aan alle voorwaarden vastgesteld in deze toelatingsakte en haar bijlage, is toegelaten in toepassing van:

• de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;
• het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma :
de toelating is slechts geldig voor zover de namen en adressen van elke invoerder van dit product voorafgaandelijk meegedeeld worden aan de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

BIJLAGE

INDELING EN ETIKETTERING VAN HET PRODUCT

Onverminderd de bepalingen inzake indeling en/of etikettering van :

- de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006;
- de Verordening (EU) nr. 547/2011 van de Commissie van 08 juni 2011 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen;
- het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik;

moeten de volgende vermeldingen op het etiket van het product vermeld worden:

Indeling en etikettering in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008

Gevarenklassen en -categorieën :
- Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2
- Gevaar voor het aquatisch milieu - Chronisch gevaar, Categorie 2

Signaalwoord :
- WAARSCHUWING

GHS-codes en gevarenpictogrammen :
- GHS07 : Schadelijk 
- GHS09 : Milieugevaarlijk 

Gevarenaanduidingen (H zinnen) :
- H302 : Schadelijk bij inslikken.
- H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (P zinnen) :
- P280 : Oogbescherming dragen.
- P301 + P330 + P311 : NA INSLIKKEN: De mond spoelen en het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
- P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN : voorzichtig afspoelen

met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
- P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie : Een arts raadplegen.
- P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.

Aanvullende gevareninformatie (EUH zinnen) :
- EUH401 : Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Zinnen volgens Verordening (EG) nr. 1107/2009 of (EU) nr. 547/2011

Standaardzinnen voor veiligheidsadviezen (SP zinnen) :
- SP1 : Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPa1 : Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 4.
- SPo : Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Andere voorwaarden/nationale zinnen

- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn (en) te verkorten.

- De spuitoplossing continu roeren tijdens de toepassing indien dit product met andere gewasbeschermingsmiddelen wordt gemengd.

- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

GEBRUIKEN

De toepassingen waarvoor het product is toegelaten en de specifieke voorwaarden waaronder het product gebruikt mag worden :

tuinkers en andere kiemen en scheuten (*Lepidium sativum*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Hyaloperonospora brassicae*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

veldsla (*Valerianella locusta*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora valerianellae*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

slasoorten (*Lactuca sp.*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Bremia lactucae*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

andijvie/radicchio rosso/suikerbrood (*Cichorium endivia/C. intybus var. foliosum*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Bremia lactucae*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

spinazie (*Spinacia oleracea*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Opmerking(en):

Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (wolf) (*Peronospora farinosa f. sp. spinaciae*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

warmoes (snijbiet) (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. flavescens*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (wolf) (*Peronospora farinosa f. sp. spinaciae*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

rucola (*Eruca vesicaria subsp. sativa/Diplotaxis tenuifolia*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Hyaloperonospora brassicae*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

babyleaf (geoogst tot het stadium 8 bladeren) (*babyleaf (harvested before BBCH 18)*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Bremia lactucae*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

bieslook (consumptie bladeren) (*Allium schoenoprasum*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

dille (consumptie vruchten, bessen en/of zaden) (*Anethum graveolens*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

karwij (consumptie vruchten, bessen en/of zaden) (*Carum carvi*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige

handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

koriander (consumptie vruchten, bessen en/of zaden) (*Coriandrum sativum*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

komijn (consumptie vruchten, bessen en/of zaden) (*Cuminum cyminum*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

lavas / maggiplant (consumptie vruchten, bessen en/of zaden) (*Levisticum officinale*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

anijs (consumptie vruchten, bessen en/of zaden) (*Pimpinella anisum*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

dille (consumptie bladeren) (*Anethum graveolens*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

grote engelwortel (consumptie bladeren) (*Angelica archangelica*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

kervel (consumptie bladeren) (*Anthriscus cerefolium*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

snijselder (consumptie bladeren) (*Apium graveolens var. secalinum*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

karwij (consumptie bladeren) (*Carum carvi*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

koriander (consumptie bladeren) (*Coriandrum sativum*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

lavas / maggiplant (consumptie bladeren) (*Levisticum officinale*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

roomse kervel (consumptie bladeren) (*Myrrhis odorata*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

peterselie (consumptie bladeren) (*Petroselinum crispum*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

anijs (consumptie bladeren) (*Pimpinella anisum*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

dragon (consumptie vruchten, bessen en/of zaden) (*Artemisia dracunculus*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

dragon (consumptie bladeren) (*Artemisia dracunculus*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

gewone bernagie (consumptie vruchten, bessen en/of zaden) (*Borago officinalis*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

zeekraal (consumptie bladeren en/of stengels) (*Salicornia europaea*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

jeneverbes (consumptie bladeren en/of stengels) (*Juniperus communis*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

fenegriek (consumptie vruchten, bessen en/of zaden) (*Trigonella foenum-graecum*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

hysop (consumptie bladeren) (*Hyssopus officinalis*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

citroenmelisse (consumptie bladeren) (*Melissa officinalis*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

munt (consumptie bladeren) (*Mentha sp.*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

basilicum (consumptie bladeren) (*Ocimum basilicum*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

marjolein / oregano (consumptie bladeren) (*Origanum majorana*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

salie (consumptie bladeren) (*Salvia officinalis*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

bonenkruid (consumptie bladeren) (*Satureja hortensis*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

tijm (consumptie bladeren) (*Thymus sp.*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

rozemarijn (consumptie bladeren) (*Salvia rosmarinus*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

laurier (consumptie bladeren) (*Laurus nobilis*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

zuring (consumptie bladeren) (*Rumex acetosa*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

postelein (consumptie bladeren) (*Portulaca oleracea*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Bremia lactucae*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

eetbare bloemen (*Edible flowers*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
Tijdens de toepassing vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora spp.*)
Dosis: 0,2 l/ha
Aantal toepassingen: 1
In menging met: een fungicide
Toepassingstechniek: bespuiting

VERPAKKINGEN

Dit product mag alleen op de markt worden gebracht in de volgende verpakkingen :

Type :	**fles**	**Materiaal :**	**HDPE**
Volume :	**0,25 l**	Inhoud :	**0,25 l**
Volume :	**1 l**	Inhoud :	**1 l**
Type :	**jerrycan**	**Materiaal :**	**HDPE**
Volume :	**5 l**	Inhoud :	**5 l**
Type :	**fles**	**Materiaal :**	**HDPE/PA**
Volume :	**0,25 l**	Inhoud :	**0,25 l**
Volume :	**1 l**	Inhoud :	**1 l**
Type :	**jerrycan**	**Materiaal :**	**f-HDPE**
Volume :	**5 l**	Inhoud :	**5 l**

OMSCHRIJVING VAN DE TEELTEN

tuinkers en andere kiemen en scheuten (*Lepidium sativum*) : alle variëteiten van scheutgroenten

veldsla (*Valerianella locusta*) : alle variëteiten

slasoorten (*Lactuca sp.*) : alle soorten en variëteiten

andijvie/radicchio rosso/suikerbrood (*Cichorium endivia/C. intybus var. foliosum*) : alle variëteiten

spinazie (*Spinacia oleracea*) : alle variëteiten

warmoes (snijbiet) (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. flavescens*) : alle variëteiten, alleen gekweekt voor de bladeren

rucola (*Eruca vesicaria subsp. sativa/Diplotaxis tenuifolia*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

babyleaf (geoogst tot het stadium 8 bladeren) (*babyleaf (harvested before BBCH 18)*) : Elk gewas behorend tot de familie van de Brassicaceae, de Asteraceae of de Amaranthaceae (of een mengeling van deze) voor zover het geoogst wordt tot het stadium 8 echte bladeren.

bieslook (consumptie bladeren) (*Allium schoenoprasum*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

dille (consumptie vruchten, bessen en/of zaden) (*Anethum graveolens*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

karwij (consumptie vruchten, bessen en/of zaden) (*Carum carvi*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

koriander (consumptie vruchten, bessen en/of zaden) (*Coriandrum sativum*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

komijn (consumptie vruchten, bessen en/of zaden) (*Cuminum cyminum*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

lavas / maggiplant (consumptie vruchten, bessen en/of zaden) (*Levisticum officinale*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

anijs (consumptie vruchten, bessen en/of zaden) (*Pimpinella anisum*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

dille (consumptie bladeren) (*Anethum graveolens*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

grote engelwortel (consumptie bladeren) (*Angelica archangelica*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

kervel (consumptie bladeren) (*Anthriscus cerefolium*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

snijselder (consumptie bladeren) (*Apium graveolens var. secalinum*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

karwij (consumptie bladeren) (*Carum carvi*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

koriander (consumptie bladeren) (*Coriandrum sativum*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

lavas / maggiplant (consumptie bladeren) (*Levisticum officinale*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

roomse kervel (consumptie bladeren) (*Myrrhis odorata*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

peterselie (consumptie bladeren) (*Petroselinum crispum*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

anijs (consumptie bladeren) (*Pimpinella anisum*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

dragon (consumptie vruchten, bessen en/of zaden) (*Artemisia dracunculus*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

dragon (consumptie bladeren) (*Artemisia dracunculus*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

gewone bernagie (consumptie vruchten, bessen en/of zaden) (*Borago officinalis*) : aromatische en medicinale plant, alle variëteiten

zeekraal (consumptie bladeren en/of stengels) (*Salicornia europaea*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

jeneverbes (consumptie bladeren en/of stengels) (*Juniperus communis*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

fenegriek (consumptie vruchten, bessen en/of zaden) (*Trigonella foenum-graecum*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

hysop (consumptie bladeren) (*Hyssopus officinalis*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

citroenmelisse (consumptie bladeren) (*Melissa officinalis*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

munt (consumptie bladeren) (*Mentha sp.*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

basilicum (consumptie bladeren) (*Ocimum basilicum*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

marjolein / oregano (consumptie bladeren) (*Origanum majorana*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

salie (consumptie bladeren) (*Salvia officinalis*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

bonenkruid (consumptie bladeren) (*Satureja hortensis*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

tijm (consumptie bladeren) (*Thymus sp.*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

rozemarijn (consumptie bladeren) (*Salvia rosmarinus*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

laurier (consumptie bladeren) (*Laurus nobilis*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

zuring (consumptie bladeren) (*Rumex acetosa*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

postelein (consumptie bladeren) (*Portulaca oleracea*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

eetbare bloemen (*Edible flowers*) : aromatische of medicinale plant, alle soorten en variëteiten, consumptie van versgeoogste bloemen