

Numéro de dossier : 35671  
Date : 23/08/2024

## AUTORISATION D'UN PRODUIT PHYTOPHARMACEUTIQUE

Concerne : nouvelle source de chlorhydrate de propamocarbe

Nom commercial :

**RAPORT**

Numéro d'autorisation :

**31657P/B**

Catégorie d'utilisateurs: **PROFESSIONNELS**

Détenteur de l'autorisation :

**GLOBACHEM**

Société anonyme  
Lichtenberglaan 2019  
3800 SINT-TRUIDEN  
België

Nature du produit : **Fongicide**

Type de formulation : **SL (Concentré soluble)**

Produit de référence : **29385P/B**

Teneur garantie en substance(s) active(s), synergiste(s) et phytoprotecteur(s) :

- **chlorhydrate de propamocarbe : 722 g/l (substance active)**

Cette autorisation est valable du **26/08/2024** au **15/06/2026** inclus et remplace, le cas échéant, tout autre acte d'autorisation antérieur pour ce produit.



Le nombre de points attribués pour le calcul de la contribution annuelle (en application de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits) : **2**.

Le produit, pour autant qu'il remplisse toutes les conditions définies dans cet acte d'autorisation et son annexe, est autorisé en application :

- du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
- de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.

La phrase suivante est uniquement d'application pour un acte établi au nom d'une firme étrangère : cette autorisation n'est valable que pour autant que les noms et adresses des importateurs de ce produit en Belgique soient communiqués préalablement au Service Produits phytopharmaceutiques et Fertilisants.

Cette autorisation n'engage pas la responsabilité de l'Etat en cas d'accidents dus à l'emploi du produit. Elle est délivrée sans préjudice des dispositions émanant du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement et du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en ce qui concerne la fabrication et l'emploi de matières toxiques ou nocives.

## ANNEXE

### **CLASSIFICATION ET ÉTIQUETAGE DU PRODUIT**

Sans préjudice des dispositions relatives à la classification et l'étiquetage :

- du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006 ;
- du Règlement (UE) n° 547/2011 de la Commission du 08 juin 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'étiquetage de produits phytopharmaceutiques ;
- de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole ;

les mentions suivantes doivent se trouver sur l'étiquette du produit :

#### **Classification et étiquetage conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008**


Classes et catégories de danger :

- Sensibilisation cutanée, Catégorie 1

Mention d'avertissement :

- ATTENTION

Codes SGH et pictogrammes de danger :

- GHS07 : Nocif 

Mentions de danger (phrases H) :

- H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.

Conseils de prudence (phrases P) :

- P261 : Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation.
- P280 : Porter des gants de protection et des vêtements de protection.
- P302 + P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.
- P333 + P313 : En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin.

Informations additionnelles sur les dangers (phrases EUH) :

- EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

#### **Phrases selon le Règlement (CE) n° 1107/2009 ou le Règlement (UE) n° 547/2011**

Phrases types indiquant les mesures de sécurité (phrases SP) :

- SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.



- SPa1 : Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code FRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est 28.
- SPo : Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

**Autres mentions/phrases nationales :**

- La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.
- Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.



## USAGES

Les applications pour lesquelles le produit est autorisé et les conditions particulières d'application :

### **pommes de terre (*Solanum tuberosum*)**

Localisation du traitement : plein air

Type de culture : tout

Délai avant la récolte : 14 jour(s)

Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

#### **Pour lutter contre : mildiou (*Phytophthora infestans*)**

Stade d'application : selon les avertissements

Dose : 1,4 l/ha.

Nombre d'applications : 1 à 6

Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)

Méthode d'application : pulvérisation

### **culture de plants de pommes de terre (*Solanum tuberosum*)**

Localisation du traitement : plein air

Type de culture : tout

Délai avant la récolte : 14 jour(s)

Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

#### **Pour lutter contre : mildiou (*Phytophthora infestans*)**

Stade d'application : selon les avertissements

Dose : 1,4 l/ha.

Nombre d'applications : 1 à 6

Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)

Méthode d'application : pulvérisation



## EMBALLAGES

Ce produit ne peut être mis sur le marché que dans les emballages suivants :

**Type :** jerrican **Matériel :** PEHD

---

<u>Volume :</u>	10 l	<u>Contenu :</u>	10 l
<u>Volume :</u>	15 l	<u>Contenu :</u>	15 l
<u>Volume :</u>	2 l	<u>Contenu :</u>	2 l
<u>Volume :</u>	20 l	<u>Contenu :</u>	20 l
<u>Volume :</u>	3 l	<u>Contenu :</u>	3 l
<u>Volume :</u>	5 l	<u>Contenu :</u>	5 l

**Type :** jerrican **Matériel :** PEHD fluoré

---

<u>Volume :</u>	10 l	<u>Contenu :</u>	10 l
<u>Volume :</u>	15 l	<u>Contenu :</u>	15 l
<u>Volume :</u>	2 l	<u>Contenu :</u>	2 l
<u>Volume :</u>	20 l	<u>Contenu :</u>	20 l
<u>Volume :</u>	3 l	<u>Contenu :</u>	3 l
<u>Volume :</u>	5 l	<u>Contenu :</u>	5 l

**Type :** jerrican **Matériel :** PEHD/EVOH

---

<u>Volume :</u>	10 l	<u>Contenu :</u>	10 l
<u>Volume :</u>	15 l	<u>Contenu :</u>	15 l
<u>Volume :</u>	2 l	<u>Contenu :</u>	2 l



<u>Volume :</u>	20 l	<u>Contenu :</u>	20 l
<u>Volume :</u>	3 l	<u>Contenu :</u>	3 l
<u>Volume :</u>	5 l	<u>Contenu :</u>	5 l

**Type :** jerrican

**Matériel :** PEHD/PA

---

<u>Volume :</u>	10 l	<u>Contenu :</u>	10 l
<u>Volume :</u>	15 l	<u>Contenu :</u>	15 l
<u>Volume :</u>	2 l	<u>Contenu :</u>	2 l
<u>Volume :</u>	20 l	<u>Contenu :</u>	20 l
<u>Volume :</u>	3 l	<u>Contenu :</u>	3 l
<u>Volume :</u>	5 l	<u>Contenu :</u>	5 l

**Type :** bouteille

**Matériel :** PEHD

---

<u>Volume :</u>	0,1 l	<u>Contenu :</u>	0.1 l
<u>Volume :</u>	0,15 l	<u>Contenu :</u>	0.15 l
<u>Volume :</u>	0,25 l	<u>Contenu :</u>	0.25 l
<u>Volume :</u>	0,5 l	<u>Contenu :</u>	0.5 l
<u>Volume :</u>	1 l	<u>Contenu :</u>	1 l

**Type :** bouteille

**Matériel :** PEHD fluoré

---

<u>Volume :</u>	0,1 l	<u>Contenu :</u>	0.1 l
<u>Volume :</u>	0,15 l	<u>Contenu :</u>	0.15 l



<u>Volume :</u>	0,25 l	<u>Contenu :</u>	0.25 l
<u>Volume :</u>	0,5 l	<u>Contenu :</u>	0.5 l
<u>Volume :</u>	1 l	<u>Contenu :</u>	1 l

**Type :** bouteille

**Matériel :** PEHD/EVOH

---

<u>Volume :</u>	0,1 l	<u>Contenu :</u>	0.1 l
<u>Volume :</u>	0,15 l	<u>Contenu :</u>	0.15 l
<u>Volume :</u>	0,25 l	<u>Contenu :</u>	0.25 l
<u>Volume :</u>	0,5 l	<u>Contenu :</u>	0.5 l
<u>Volume :</u>	1 l	<u>Contenu :</u>	1 l

**Type :** bouteille

**Matériel :** PEHD/PA

---

<u>Volume :</u>	0,1 l	<u>Contenu :</u>	0.1 l
<u>Volume :</u>	0,15 l	<u>Contenu :</u>	0.15 l
<u>Volume :</u>	0,25 l	<u>Contenu :</u>	0.25 l
<u>Volume :</u>	0,5 l	<u>Contenu :</u>	0.5 l
<u>Volume :</u>	1 l	<u>Contenu :</u>	1 l



## DESCRIPTION DES CULTURES

pommes de terre (*Solanum tuberosum*) : traitement de la culture depuis l'implantation jusqu'à la récolte des pommes de terre (primeurs et de conservation)

culture de plants de pommes de terre (*Solanum tuberosum*) : Pommes de terre cultivées pour la production de plants, toutes les variétés. Les tubercules de calibre excessif peuvent être vendus pour la consommation.