Santé publique
Sécurité de la Chaîne alimentaire
Environnement

DG Animaux, Végétaux et Alimentation
Service Produits phytopharmaceutiques
et Fertilisants

Numéro de dossier : 42153
Date de signature : 27/04/2026

AUTORISATION D'UN PRODUIT PHYTOPHARMACEUTIQUE

Concerne : extension en poivron, fraisiers (champ de sélection et pultiplication), cresson alénois, moutarde brune, jeunes pousses, ciboulette, angélique, cerfeuil musqué, sauge, romarin, thym, marjolaine, sarriette des jardins, basilic, menthe, mélisse, fleurs comestibles, laurier, estragon, betterave rouge et jaune (production de semences), carottes (production de semences), radis (production de semences), pois (production de semences), fèves et fèveroles (production de semences) et persil (production de semences) + extension d'ennemi en cerfeuil, céleri à couper, carvi, coriandre, aneth, livèche, oseille, persil et plantes ornementales - modification de la responsabilité

Nom commercial :

VERTAZA

Numéro d'autorisation :

32689P/B

Catégorie d'utilisateurs: **PROFESSIONNELS**

Détenteur de l'autorisation :

Syngenta Crop Protection

Société anonyme
Square de Meeûs 23
1000 BRUXELLES
Belgique

Nature du produit : **Fongicide**

Type de formulation : **SC (Suspension concentrée)**

Produit de référence : **8898P/B**

Teneur garantie en substance(s) active(s), synergiste(s) et phytoprotecteur(s) :

- **azoxystrobine : 250 g/l (substance active)**

Cette autorisation est valable du **02/05/2026** au **31/05/2028** inclus et remplace, le cas échéant, tout autre acte d'autorisation antérieur pour ce produit.

Le nombre de points attribués pour le calcul de la contribution annuelle (en application de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits) : **2**.

Le produit, pour autant qu'il remplisse toutes les conditions définies dans cet acte d'autorisation et son annexe, est autorisé en application :

• du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
• de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.

La phrase suivante est uniquement d'application pour un acte établi au nom d'une firme étrangère :
cette autorisation n'est valable que pour autant que les noms et adresses des importateurs de ce produit en Belgique soient communiqués préalablement au Service Produits phytopharmaceutiques et Fertilisants.

Cette autorisation n'engage pas la responsabilité de l'Etat en cas d'accidents dus à l'emploi du produit. Elle est délivrée sans préjudice des dispositions émanant du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement et du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en ce qui concerne la fabrication et l'emploi de matières toxiques ou nocives.

ANNEXE

CLASSIFICATION ET ÉTIQUETAGE DU PRODUIT

Sans préjudice des dispositions relatives à la classification et l'étiquetage :

- du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006 ;
- du Règlement (UE) n° 547/2011 de la Commission du 08 juin 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d' étiquetage de produits phytopharmaceutiques ;
- de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole ;

les mentions suivantes doivent se trouver sur l'étiquette du produit :

Classification et étiquetage conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008

Mention d'avertissement :

- ATTENTION

Codes SGH et pictogrammes de danger :

- GHS09 : Dangereux pour l'environnement 

Mentions de danger (phrases H) :

- H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence (phrases P) :

- P280 : Porter des gants de protection et des vêtements de protection.
- P391 : Recueillir le produit répandu.

Informations additionnelles sur les dangers (phrases EUH) :

- EUH208 : Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
- EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Phrases selon le Règlement (CE) n° 1107/2009 ou le Règlement (UE) n° 547/2011

Phrases types indiquant les mesures de sécurité (phrases SP) :

- SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
- SPa1 : Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code FRAC pour le mode

d'action de la substance active de ce produit est 11.
- SPe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).
- SPo : Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

Autres mentions/phrases nationales :

- La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n' autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.

- Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

USAGES

Les applications pour lesquelles le produit est autorisé et les conditions particulières d'application :

chou-navet, rutabaga (*Brassica napus subsp. rapifera*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria brassicae*)
Stade d'application : préventivement ou aux premiers signes d'infestation
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

navet (*Brassica rapa subsp. rapa*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria brassicae*)
Stade d'application : préventivement ou aux premiers signes d'infestation
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

pois récoltés secs (sans cosse) (*Pisum sativum*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Stade d'application : les premières fleurs sont ouvertes (sporadiquement dans la culture) - fin de la floraison (BBCH 60-69)
Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 36 jour(s)

Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe pisi*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : anthracnose (*Didymella pisi / Ascochyta pisi*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : pourriture grise (*Botrytis cinerea*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rouille du pois (*Uromyces pisi*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

fèves et féveroles (recoltées sèches) (*Vicia faba*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Stade d'application : les premières fleurs sont ouvertes (sporadiquement dans la culture) - fin de la floraison (BBCH 60-69)
Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : anthracnose (*Didymella pisi / Ascochyta pisi*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : pourriture grise (*Botrytis cinerea*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

fèves et féveroles (récoltées fraîches, sans cosse) (*Vicia faba*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Stade d'application : les premières fleurs sont ouvertes (sporadiquement dans la culture) - fin de la floraison (BBCH 60-69)
Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : anthracnose (*Didymella pisi / Ascochyta pisi*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : pourriture grise (*Botrytis cinerea*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

froment d'hiver (*Triticum aestivum*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Stade d'application : le deuxième noeud est au moins à 2 cm au-dessus du premier noeud - fin de l'épiaison: l'inflorescence est complètement sortie de la gaine (BBCH 32-59)
Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : septoriose des feuilles (*Septoria tritici / Leptosphaeria nodorum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : septoriose de l'épi (*Septoria nodorum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe graminis*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rouille brune (*Puccinia recondita*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rouille jaune (*Puccinia striiformis*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

froment de printemps (*Triticum aestivum*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Stade d'application : le deuxième noeud est au moins à 2 cm au-dessus du premier noeud - fin de l'épiaison: l'inflorescence est complètement sortie de la gaine (BBCH 32-59)
Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : septoriose des feuilles (*Septoria tritici / Leptosphaeria nodorum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : septoriose de l'épi (*Septoria nodorum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe graminis*)
Dose : 1 l/ha.

Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rouille brune (*Puccinia recondita*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rouille jaune (*Puccinia striiformis*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

orge d'hiver (*Hordeum vulgare*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Stade d'application : le premier noeud est au moins à 1 cm au-dessus du plateau de tallage - le limbe de la dernière feuille est entièrement étalé, la ligule est visible (BBCH 31-39)
Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : helminthosporiose (*Pyrenophora / Helminthosporium / Drechslera*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe graminis*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rouille naine (*Puccinia hordei*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

orge de printemps (*Hordeum vulgare*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Stade d'application : le premier noeud est au moins à 1 cm au-dessus du plateau de tallage - le limbe de la dernière feuille est entièrement étalé, la ligule est visible (BBCH 31-39)
Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : helminthosporiose (*Pyrenophora / Helminthosporium / Drechslera*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe graminis*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rouille naine (*Puccinia hordei*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

seigle d'hiver (*Secale cereale*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Stade d'application : le deuxième noeud est au moins à 2 cm au-dessus du premier noeud - fin de l'épiaison: l'inflorescence est complètement sortie de la gaine (BBCH 32-59)
Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : septoriose des feuilles (*Septoria tritici / Leptosphaeria nodorum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)

Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : septoriose de l'épi (*Septoria nodorum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe graminis*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rouille brune (*Puccinia recondita*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rouille jaune (*Puccinia striiformis*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

seigle de printemps (*Secale cereale*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Stade d'application : le deuxième noeud est au moins à 2 cm au-dessus du premier noeud - fin de l'épiaison: l'inflorescence est complètement sortie de la gaine (BBCH 32-59)
Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : septoriose des feuilles (*Septoria tritici / Leptosphaeria nodorum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : septoriose de l'épi (*Septoria nodorum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe graminis*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rouille brune (*Puccinia recondita*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rouille jaune (*Puccinia striiformis*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

triticale d'hiver (*Triticosecale rimpaui*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Stade d'application : le deuxième noeud est au moins à 2 cm au-dessus du premier noeud - fin de l'épiaison: l'inflorescence est complètement sortie de la gaine (BBCH 32-59)
Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : septoriose des feuilles (*Septoria tritici / Leptosphaeria nodorum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : septoriose de l'épi (*Septoria nodorum*)
Dose : 1 l/ha.

Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe graminis*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rouille brune (*Puccinia recondita*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rouille jaune (*Puccinia striiformis*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

triticale de printemps (*Triticosecale rimpaui*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Stade d'application : le deuxième noeud est au moins à 2 cm au-dessus du premier noeud - fin de l'épiaison: l'inflorescence est complètement sortie de la gaine (BBCH 32-59)
Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : septoriose des feuilles (*Septoria tritici / Leptosphaeria nodorum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : septoriose de l'épi (*Septoria nodorum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe graminis*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rouille brune (*Puccinia recondita*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rouille jaune (*Puccinia striiformis*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

pommes de terre (*Solanum tuberosum*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Délai avant la récolte : 7 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Pour lutter contre : alternariose des solanacées (*Alternaria solani*)
Dose : 0,25 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 3
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

pommes de terre (*Solanum tuberosum*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Stade d'application : au moment de la plantation
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : rhizoctone de la pomme de terre (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 22,5 ml/100 m.

Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation
Remarque : dans la ligne

pommes de terre (*Solanum tuberosum*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Stade d'application : avant la plantation
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : rhizoctone de la pomme de terre (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 6 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation
Remarque : en généralisé, incorporation dans le sol

lupin (*Lupinus sp.*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Délai avant la récolte : 35 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : anthracnose (*Colletotrichum lupini*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 28 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

culture de graminées (production de semences) (*Lolium sp./Phleum sp./ Poa sp./Festuca sp.*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : production de semences

Stade d'application : le deuxième noeud est au moins à 2 cm au-dessus du premier noeud - mi-épiaison: 50% de l'inflorescence est sortie (BBCH 32-55)
Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : rhynchosporiose (*Rhynchosporium secalis*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : septoriose de l'épi (*Septoria nodorum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe graminis*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rouille brune (*Puccinia recondita*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rouille jaune (*Puccinia striiformis*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

culture de plants de pommes de terre (*Solanum tuberosum*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Délai avant la récolte : 7 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Pour lutter contre : alternariose des solanacées (*Alternaria solani*)
Dose : 0,25 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 3
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

culture de plants de pommes de terre (*Solanum tuberosum*)

Localisation du traitement : plein air

Type de culture : tout

Stade d'application : au moment de la plantation
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : rhizoctone de la pomme de terre (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 22,5 ml/100 m.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation
Remarque : dans la ligne

culture de plants de pommes de terre (*Solanum tuberosum*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Stade d'application : avant la plantation
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : rhizoctone de la pomme de terre (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 6 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation
Remarque : en généralisé, incorporation dans le sol

EXTENSION DE L'AUTORISATION POUR DES USAGES MINEURS (en application de l' article 51 du Règlement (CE) No 1107/2009).

L'usage du produit pour ces extensions tombe sous la responsabilité de l'utilisateur. En raison du nombre limité de données évaluées concernant l'efficacité et la phytotoxicité, il est conseillé d'effectuer un test avant l'utilisation du produit.

fraisiers (*Fragaria x ananassa*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : champ de sélection et de multiplication

Stade d'application : apparition des ébauches florales au centre de la rosette - récolte principale: la plupart des fraises ont atteint leur couleur spécifique (BBCH 55-87)
Mesures de réduction du risque :

- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Remarque(s) :

- Pendant l'application, porter une combinaison de protection chimique étanche aux liquides et des gants résistant aux produits chimiques.

- Pour protéger la santé, il est nécessaire de porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes en cas de contact de courte durée (moins de 2 heures par jour) et de faible intensité avec la culture (par exemple lors de l'inspection ou de l'irrigation).

- Pour protéger la santé, il est nécessaire de porter des gants résistants aux produits chimiques et un vêtement de protection de base (couvrant bras et jambes) en cas de contact prolongé (plus de 2 heures par jour) ou en cas de contact intense avec la culture (par exemple lors de l'entretien et/ou de la récolte).

Pour lutter contre : oïdium (*Podosphaera aphanis*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 3
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

fraisiers (*Fragaria x ananassa*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : champ de sélection et de multiplication

Stade d'application : apparition des ébauches florales au centre de la rosette - récolte principale: la plupart des fraises ont atteint leur couleur spécifique (BBCH 55-87)
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Remarque(s) :

- Pendant l'application, porter une combinaison de protection chimique étanche aux liquides et des gants résistant aux produits chimiques.

- Pour protéger la santé, il est nécessaire de porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes en cas de contact de courte durée (moins de 2 heures par jour) et de faible intensité avec la culture (par exemple lors de l'inspection ou de l'irrigation).

- Pour protéger la santé, il est nécessaire de porter des gants résistants aux produits chimiques et un vêtement de protection de base (couvrant bras et jambes) en cas de contact prolongé (plus de 2 heures par jour) ou en cas de contact intense avec la culture (par exemple lors de l'entretien et/ou de la récolte).

Pour lutter contre : oïdium (*Podosphaera aphanis*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 3
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

betterave rouge et jaune (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva/Beta vulgaris subsp. vulgaris var. lutea*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : cercosporiose (*Cercospora beticola*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe betae / E. polygoni*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

radis (*Raphanus sativus var. radicula*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 21 jour(s)
Mesures de réduction du risque :

- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Pour lutter contre : rouille blanche (*Albugo candida*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria brassicae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

radis (*Raphanus sativus var. radicula*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 7 jour(s)
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : rouille blanche (*Albugo candida*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria brassicae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

radis noir et radis rave (*Raphanus sativus*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 21 jour(s)
Mesures de réduction du risque :

- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Pour lutter contre : rouille blanche (*Albugo candida*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria brassicae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

radis noir et radis rave (*Raphanus sativus*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 7 jour(s)
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : rouille blanche (*Albugo candida*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria brassicae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

raifort (*Armoracia rusticana*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :

- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Pour lutter contre : septoriose du persil (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria brassicae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

tomate (*Solanum lycopersicum*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Délai avant la récolte : 1 jour(s)
Mesures de réduction du risque :

- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Pour lutter contre : oïdium (*Leveillula taurica*)
Dose : 0,8 l/ha.
Autre expression de la dose : 0,32 l/ha haie
Nombre d'applications : 1 à 3
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose des solanacées (*Alternaria solani*)
Dose : 0,8 l/ha.
Autre expression de la dose : 0,32 l/ha haie
Nombre d'applications : 1 à 3
Méthode d'application : pulvérisation

poivron / piment (*Capsicum annuum*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Délai avant la récolte : 3 jour(s)
Mesures de réduction du risque :

- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Remarque(s) :

- Pendant l'application, porter une combinaison de protection chimique étanche aux liquides et des gants résistant aux produits chimiques.

- Pour protéger la santé, il est nécessaire de porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes en cas de contact de courte durée (moins de 2 heures par jour) et de faible intensité avec la culture (par exemple lors de l'inspection ou de l'irrigation) jusqu'à 21 jours après le traitement.

- Pour protéger la santé, il est nécessaire de porter des gants résistants aux produits chimiques et un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes / un pantalon long en cas de contact prolongé (plus de 2 heures par jour) ou en cas de contact intense avec la culture (par exemple lors de l'entretien et/ou de la récolte) jusqu'à 7 jours après le traitement.

Pour lutter contre : oïdium (*Leveillula taurica*)
Dose : 0,4 l/ha haie.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

chou brocoli (*Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : rouille blanche (*Albugo candida*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria brassicae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

chou-fleur (blanc et vert) (*Brassica oleracea var. botrytis subvar. cauliflora*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 28 jour(s)

Mesures de réduction du risque :

- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Remarque(s) :

Lors de la manipulation et de la récolte de la culture traitée, porter des gants résistants aux produits chimiques.

Pour lutter contre : rouille blanche (*Albugo candida*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria brassicae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

chou frisé (chou palmier) (*Brassica oleracea var. sabellica; Brassica oleracea var. palmifolia*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : rouille blanche (*Albugo candida*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria brassicae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

cresson alénois et autres jeunes pousses (*Lepidium sativum*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Délai avant la récolte : 30 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

cresson alénois et autres jeunes pousses (*Lepidium sativum*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

mâche (*Valerianella locusta*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Stade d'application : cotylédons étalés, point végétatif apical ou initiales des premières vraies feuilles visibles - 6 feuilles étalées (BBCH 10-16)
Mesures de réduction du risque :
- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

laitues (*Lactuca sp.*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 30 jour(s)
Mesures de réduction du risque :

- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Pour lutter contre : mildiou de la laitue (*Bremia lactucae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 7 à 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

laitues (*Lactuca sp.*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : mildiou de la laitue (*Bremia lactucae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 7 à 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

endives/radicchio rosso/pain de sucre (*Cichorium endivia/C. intybus var. foliosum*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 30 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

endives/radicchio rosso/pain de sucre (*Cichorium endivia/C. intybus var. foliosum*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

roquette (*Eruca vesicaria subsp. sativa/Diplotaxis tenuifolia*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire

un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Pour lutter contre : mildiou du chou (*Hyaloperonospora brassicae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 7 à 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

roquette (*Eruca vesicaria subsp. sativa/Diplotaxis tenuifolia*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Pour lutter contre : mildiou du chou (*Hyaloperonospora brassicae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 7 à 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

jeunes pousses (recoltées jusqu'au stade 8 vraies feuilles) (*babyleaf (harvested before BBCH 18)*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Délai avant la récolte : 30 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

jeunes pousses (recoltées jusqu'au stade 8 vraies feuilles) (*babyleaf (harvested before BBCH 18)*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

haricot vert (recolté frais, avec cosse) (*Phaseolus vulgaris*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : anthracnose (*Colletotrichum lindemuthianum*)
Dose : 0,8 - 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rouille du haricot (*Uromyces appendiculatus*)
Dose : 0,8 - 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

soja (récolté sec) (*Glycine max*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Stade d'application : les premières fleurs de la population sont ouvertes (sporadiquement dans la population) - environ 40% des fleurs sont ouvertes (BBCH 60-64)
Délai avant la récolte : 21 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : sclérotiniose (*Sclerotinia minor (S. sclerotiorum)*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

soja/edamame (récolté fraîche, sans cosse) (*Glycine max*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Stade d'application : les premières fleurs de la population sont ouvertes (sporadiquement dans la population) - fin de la floraison: les premières gousses sont visibles (~ 5 mm) (BBCH 60-69)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Remarque(s) :
- max. 1,6 l/ha/culture

Pour lutter contre : anthracnose (*Didymella pisi / Ascochyta pisi*)
Dose : 0,8 - 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : pourriture grise (*Botrytis fabae*)
Dose : 0,8 - 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

soja/edamame (récolté fraîche, sans cosse) (*Glycine max*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Stade d'application : feuille trifoliolée, insérée sur le 7ème noeud, est étalée - environ 20% des gousses ont atteint la longueur finale (15–20 mm) et elles commencent à se remplir de graines (BBCH 17-72)
Délai avant la récolte : 35 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Remarque(s) :
- max. 1,6 l/ha/culture

Pour lutter contre : sclérotiniose (*Sclerotinia minor (S. sclerotiorum)*)
Dose : 0,8 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2

Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

soja/edamame (récolté fraîche, avec cosse) (*Glycine max*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Remarque(s) :
- max. 1,6 l/ha/culture

Pour lutter contre : anthracnose (*Didymella pisi / Ascochyta pisi*)
Dose : 0,8 - 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : pourriture grise (*Botrytis fabae*)
Dose : 0,8 - 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

soja/edamame (récolté fraîche, avec cosse) (*Glycine max*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Stade d'application : feuille trifoliolée, insérée sur le 7ème noeud, est étalée - environ 20% des gousses ont atteint la longueur finale (15–20 mm) et elles commencent à se remplir de graines (BBCH 17-72)
Délai avant la récolte : 35 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Remarque(s) :
- max. 1,6 l/ha/culture

Pour lutter contre : sclérotiniose (*Sclerotinia minor (S. sclerotiorum)*)
Dose : 0,8 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

pois chiche (recoltées sèches) (*Cicer arietinum*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Stade d'application : les premières fleurs sont ouvertes (sporadiquement dans la culture) - fin de la floraison, le début de la formation du fruit est visible (BBCH 60-69)
Délai avant la récolte : 36 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Remarque(s) :
- max. 1,6 l/ha/culture

Pour lutter contre : anthracnose (*Didymella pisi / Ascochyta pisi*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : pourriture grise (*Botrytis fabae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

pois chiche (recoltées sèches) (*Cicer arietinum*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Stade d'application : la septième feuille est complètement étalée - environ 20% des gousses ont atteint la longueur finale et elles commencent à se remplir de graines (BBCH 17-72)
Délai avant la récolte : 35 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Remarque(s) :
- max. 1,6 l/ha/culture

Pour lutter contre : sclérotiniose (*Sclerotinia minor (S. sclerotiorum)*)
Dose : 0,8 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

fenouil (*Foeniculum vulgare*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 3 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :

- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Pour lutter contre : septoriose du persil (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Stade d'application : préventivement ou aux premiers signes d'infestation
Dose : 0,8 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : sclérotiniose (*Sclerotinia minor (S. sclerotiorum)*)
Stade d'application : préventivement ou aux premiers signes d'infestation
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 3
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

fenouil (*Foeniculum vulgare*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 3 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : septoriose du persil (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Stade d'application : préventivement ou aux premiers signes d'infestation
Dose : 0,8 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : sclérotiniose (*Sclerotinia minor (S. sclerotiorum)*)
Stade d'application : préventivement ou aux premiers signes d'infestation
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 3
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

poireau (*Allium porrum*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 4 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :

- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Pour lutter contre : mildiou du poireau (*Phytophthora porri*)
Stade d'application : préventivement ou aux premiers signes d'infestation
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 4
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose du poireau (*Alternaria porri*)
Stade d'application : préventivement ou aux premiers signes d'infestation
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 4
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rouille des alliaceae (*Puccinia porri / P. allii*)
Stade d'application : préventivement ou aux premiers signes d'infestation
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 4
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

poireau (*Allium porrum*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 3 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 21 jour(s)
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : mildiou du poireau (*Phytophthora porri*)
Stade d'application : préventivement ou aux premiers signes d'infestation
Dose : 1 l/ha.

Nombre d'applications : 1 à 3
Intervalle minimal entre deux applications : 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose du poireau (*Alternaria porri*)
Stade d'application : préventivement ou aux premiers signes d'infestation
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 3
Intervalle minimal entre deux applications : 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rouille des alliaceae (*Puccinia porri / P. allii*)
Stade d'application : préventivement ou aux premiers signes d'infestation
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 3
Intervalle minimal entre deux applications : 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

rhubarbe (*Rheum rhabarbarum*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : ramulariose (*Ramularia rhei*)
Dose : 0,8 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Méthode d'application : pulvérisation

ciboulette (consommation des feuilles) (*Allium schoenoprasum*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 30 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :

max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose (*Septoria*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphaceae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria sp.*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

ciboulette (consommation des feuilles) (*Allium schoenoprasum*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose (*Septoria*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphaceae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria sp.*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

aneth (consommation des feuilles) (*Anethum graveolens*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 30 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose du persil (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe heraclei*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose / brûlure des feuilles de la carotte (*Alternaria dauci*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

aneth (consommation des feuilles) (*Anethum graveolens*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose du persil (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe heraclei*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose / brûlure des feuilles de la carotte (*Alternaria dauci*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

angélique (consommation des feuilles) (*Angelica archangelica*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 30 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose du céleri (*Septoria apiicola*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe heraclei*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose / brûlure des feuilles de la carotte (*Alternaria dauci*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

angélique (consommation des feuilles) (*Angelica archangelica*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose du céleri (*Septoria apiicola*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe heraclei*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose / brûlure des feuilles de la carotte (*Alternaria dauci*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

cerfeuil (consommation des feuilles) (*Anthriscus cerefolium*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 30 jour(s)

Mesures de réduction du risque :
- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose du persil (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe heraclei*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose / brûlure des feuilles de la carotte (*Alternaria dauci*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

cerfeuil (consommation des feuilles) (*Anthriscus cerefolium*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose du persil (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe heraclei*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose / brûlure des feuilles de la carotte (*Alternaria dauci*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

céleri à couper (consommation des feuilles) (*Apium graveolens var. secalinum*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 30 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose du persil (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe heraclei*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose / brûlure des feuilles de la carotte (*Alternaria dauci*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

céleri à couper (consommation des feuilles) (*Apium graveolens var. secalinum*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose du persil (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe heraclei*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose / brûlure des feuilles de la carotte (*Alternaria dauci*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

carvi (consommation des feuilles) (*Carum carvi*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 30 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose du persil (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe heraclei*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose / brûlure des feuilles de la carotte (*Alternaria dauci*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

carvi (consommation des feuilles) (*Carum carvi*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose du persil (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe heraclei*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose / brûlure des feuilles de la carotte (*Alternaria dauci*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

coriandre (consommation des feuilles) (*Coriandrum sativum*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 30 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose du persil (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe heraclei*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose / brûlure des feuilles de la carotte (*Alternaria dauci*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

coriandre (consommation des feuilles) (*Coriandrum sativum*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :

- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :

max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose du persil (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe heraclei*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose / brûlure des feuilles de la carotte (*Alternaria dauci*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

livèche (consommation des feuilles) (*Levisticum officinale*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 30 jour(s)
Mesures de réduction du risque :

- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s) :

- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :

max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose du persil (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe heraclei*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose / brûlure des feuilles de la carotte (*Alternaria dauci*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

livèche (consommation des feuilles) (*Levisticum officinale*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose du persil (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe heraclei*)
Dose : 1 l/ha.

Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose / brûlure des feuilles de la carotte (*Alternaria dauci*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

cerfeuil musqué (consommation des feuilles) (*Myrrhis odorata*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 30 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose du persil (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe heraclei*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose / brûlure des feuilles de la carotte (*Alternaria dauci*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1

Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

cerfeuil musqué (consommation des feuilles) (*Myrrhis odorata*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose du persil (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe heraclei*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose / brûlure des feuilles de la carotte (*Alternaria dauci*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)

Méthode d'application : pulvérisation

persil (consommation des feuilles) (*Petroselinum crispum*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 30 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose du persil (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe heraclei*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose / brûlure des feuilles de la carotte (*Alternaria dauci*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

persil (consommation des feuilles) (*Petroselinum crispum*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :

- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :

max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose du persil (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe heraclei*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose / brûlure des feuilles de la carotte (*Alternaria dauci*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

persil à grosses racines et cerfeuil tubéreux (consommation de la racine) (*Petroselinum crispum var. tuberosum & Chaerophyllum bulbosum*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :

- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Pour lutter contre : septoriose du persil (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe heraclei*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose / brûlure des feuilles de la carotte (*Alternaria dauci*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

angélique (consommation des racines) (*Angelica archangelica*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Délai avant la récolte : 10 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Pour lutter contre : septoriose du persil (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

estragon (consommation des feuilles) (*Artemisia dracunculus*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 30 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s) :

- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :

max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose (*Septoria*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe heraclei*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria sp.*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

estragon (consommation des feuilles) (*Artemisia dracunculus*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :

- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :

max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose (*Septoria*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2

Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe heraclei*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria sp.*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

moutarde brune (consommation des feuilles) (*Brassica juncea*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Délai avant la récolte : 30 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

moutarde brune (consommation des feuilles) (*Brassica juncea*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :

- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

mélisse (consommation des feuilles) (*Melissa officinalis*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 30 jour(s)
Mesures de réduction du risque :

- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s) :

- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose (*Septoria*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphaceae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria sp.*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

mélisse (consommation des feuilles) (*Melissa officinalis*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose (*Septoria*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphaceae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria sp.*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

menthe (consommation des feuilles) (*Mentha sp.*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 30 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose (*Septoria*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphaceae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria sp.*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

menthe (consommation des feuilles) (*Mentha sp.*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose (*Septoria*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphaceae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria sp.*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

basilic (consommation des feuilles) (*Ocimum basilicum*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 30 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose (*Septoria*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphaceae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria sp.*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

basilic (consommation des feuilles) (*Ocimum basilicum*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose (*Septoria*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphaceae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria sp.*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

origan / marjolaine (consommation des feuilles) (*Origanum majorana*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 30 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose (*Septoria*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe heraclei*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria sp.*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

origan / marjolaine (consommation des feuilles) (*Origanum majorana*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose (*Septoria*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphaceae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria sp.*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

sauge officinale (consommation des feuilles) (*Salvia officinalis*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 30 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose (*Septoria*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe heraclei*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria sp.*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

sauge officinale (consommation des feuilles) (*Salvia officinalis*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose (*Septoria*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphaceae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria sp.*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

sarriette des jardins (consommation des feuilles) (*Satureja hortensis*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 30 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose (*Septoria*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphaceae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria sp.*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

sarriette des jardins (consommation des feuilles) (*Satureja hortensis*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose (*Septoria*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphaceae*)
Dose : 1 l/ha.

Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria sp.*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

thym (consommation des feuilles) (*Thymus sp.*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 30 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose (*Septoria*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe heraclei*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria sp.*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1

Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

thym (consommation des feuilles) (*Thymus sp.*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose (*Septoria*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphaceae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria sp.*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)

Méthode d'application : pulvérisation

romarin (consommation des feuilles) (*Salvia rosmarinus*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 30 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose (*Septoria*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe heraclei*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria sp.*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

romarin (consommation des feuilles) (*Salvia rosmarinus*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :

- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :

max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose (*Septoria*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphaceae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria sp.*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

laurier (consommation des feuilles) (*Laurus nobilis*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 30 jour(s)
Mesures de réduction du risque :

- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s) :

- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :

max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose (*Septoria*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphaceae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria sp.*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

laurier (consommation des feuilles) (*Laurus nobilis*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose (*Septoria*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphaceae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria sp.*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

oseille (consommation des feuilles) (*Rumex acetosa*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 30 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : ramulariose de l'oseille (*Ramularia pratensis*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

oseille (consommation des feuilles) (*Rumex acetosa*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : ramulariose de l'oseille (*Ramularia pratensis*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

fleurs comestibles (*Edible flowers*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 30 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose (*Septoria*)
Dose : 1 l/ha.

Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphaceae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria sp.*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

fleurs comestibles (*Edible flowers*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :
- Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Remarque(s) :
max. 4 applications/12 mois

Pour lutter contre : septoriose (*Septoria*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphaceae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria sp.*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

betterave rouge et jaune (production de semences) (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva/Beta vulgaris subsp. vulgaris var. lutea*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : production de semences

Stade d'application : ≤ BBCH 59 (les premiers pétales sont visibles, les fleurs sont toujours fermées)
Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : cercosporiose (*Cercospora beticola*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe betae / E. polygoni*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

carottes (production de semences) (*Daucus carota*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : production de semences

Stade d'application : ≤ BBCH 59 (les premiers pétales sont visibles, les fleurs sont toujours fermées)
Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe heraclei*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose / brûlure des feuilles de la carotte (*Alternaria dauci*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

radis (production de semences) (*Raphanus sativus var. radicula*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : production de semences

Stade d'application : ≤ BBCH 59 (les premiers pétales sont visibles, les fleurs sont toujours fermées)
Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : rouille blanche (*Albugo candida*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria brassicae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

persil (production de semences) (*Petroselinum crispum*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : production de semences

Stade d'application : ≤ BBCH 59 (les premiers pétales sont visibles, les fleurs sont toujours fermées)
Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/culture
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : septoriose du persil (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dose : 1 l/ha.

Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe heraclei*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose / brûlure des feuilles de la carotte (*Alternaria dauci*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle entre deux applications : 14 à 21 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

pois (production de semences) (*Pisum sativum*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : production de semences

Stade d'application : les premières fleurs sont ouvertes (sporadiquement dans la culture) - fin de la floraison (BBCH 60-69)
Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphe pisi*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : anthracnose (*Didymella pisi / Ascochyta pisi*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : pourriture grise (*Botrytis fabae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rouille du pois (*Uromyces pisi*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

fèves et féveroles (production de semences) (*Vicia faba*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : production de semences

Stade d'application : les premières fleurs sont ouvertes - fin de la floraison (BBCH 60-69)
Nombre maximal d'applications : 1 application(s)/culture
Délai avant la récolte : 14 jour(s)
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : anthracnose de la féverole (*Ascochyta fabae / Didymella fabae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : pourriture grise (*Botrytis fabae*)
Dose : 1 l/ha.
Nombre d'applications : 1
Méthode d'application : pulvérisation

plantes ornementales (*ornamentals*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/12 mois
Mesures de réduction du risque :

- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s) :

- Utilisation en plantes ornementales accordée sur base d'essais réalisés sur l'(les) espèce (s) suivant(es): /.
- Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation/du permis.
- Les plantes ornementales ne peuvent pas (dans les 3 ans suivant le traitement avec des produits phytopharmaceutiques) être alternées avec des cultures suivantes destinées à la consommation humaine ou animale.

Pour lutter contre : rouille blanche (*Albugo candida*)
Dose : 100 ml/100 l.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : mildiou des plantes ornementales (*Phytophthora spp. / Peronospora spp.*)
Dose : 100 ml/100 l.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : cladosporium (Cladosporium spp.) (*Cladosporium*)
Dose : 100 ml/100 l.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : Calonectria (Cylindrocladium) (*Calonectria spp.*)
Dose : 100 ml/100 l.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : septoriose (*Septoria*)
Dose : 100 ml/100 l.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : stemphylium (*Stemphylium*)
Dose : 100 ml/100 l.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphaceae*)
Dose : 100 ml/100 l.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : sclérotiniose (*Sclerotinia spp.*)
Dose : 100 ml/100 l.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria sp.*)
Dose : 100 ml/100 l.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : Ascochyta (*Ascochyta*)
Dose : 100 ml/100 l.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : pourriture grise (*Botrytis cinerea*)
Dose : 100 ml/100 l.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rouilles (*Puccinia / Uromyces / Phragmidium / ...*)
Stade d'application : préventivement
Dose : 100 ml/100 l.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

plantes ornementales (*ornamentals*)

Localisation du traitement : sous protection
Type de culture : tout

Stade d'application : immédiatement après la plantation ou le bouturage
Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/12 mois
Mesures de réduction du risque :
- Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s) :
- Utilisation en plantes ornementales accordée sur base d'essais réalisés sur l'(les) espèce (s) suivant(es): /

- Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation/du permis.

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 100 ml/100 l.
Nombre d'applications : 1 à 2
Méthode d'application : pulvérisation

plantes ornementales (*ornamentals*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/12 mois
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :
- Utilisation en plantes ornementales accordée sur base d'essais réalisés sur l'(les) espèce (s) suivant(es): Buxus, Viola x wittrockiana, Ranunculus, Prunus lauruceratus, Rosa hybrida, Kalanchoë et Aster.
- Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation/du permis.
- Les plantes ornementales ne peuvent pas (dans les 3 ans suivant le traitement avec des produits phytopharmaceutiques) être alternées avec des cultures suivantes destinées à la consommation humaine ou animale.

Pour lutter contre : rouille blanche (*Albugo candida*)
Dose : 100 ml/100 l.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : mildiou des plantes ornementales (*Phytophthora spp. / Peronospora spp.*)
Dose : 100 ml/100 l.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : cladosporium (Cladosporium spp.) (*Cladosporium*)
Dose : 100 ml/100 l.
Nombre d'applications : 1 à 2

Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : Calonectria (Cylindrocladium) (*Calonectria spp.*)
Dose : 100 ml/100 l.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : septoriose (*Septoria*)
Dose : 100 ml/100 l.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : stemphylium (*Stemphylium*)
Dose : 100 ml/100 l.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : oïdium (*Erysiphaceae*)
Dose : 100 ml/100 l.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : sclérotiniose (*Sclerotinia spp.*)
Dose : 100 ml/100 l.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : alternariose (*Alternaria sp.*)
Dose : 100 ml/100 l.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : Ascochyta (*Ascochyta*)
Dose : 100 ml/100 l.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)

Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : pourriture grise (*Botrytis cinerea*)
Dose : 100 ml/100 l.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rouilles (*Puccinia / Uromyces / Phragmidium / ...*)
Stade d'application : préventivement
Dose : 100 ml/100 l.
Nombre d'applications : 1 à 2
Intervalle minimal entre deux applications : 7 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

plantes ornementales (*ornamentals*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Stade d'application : immédiatement après la plantation ou le bouturage
Nombre maximal d'applications : 2 application(s)/12 mois
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :
- Utilisation en plantes ornementales accordée sur base d'essais réalisés sur l'(les) espèce (s) suivant(es): /
- Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation/du permis.

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 100 ml/100 l.
Nombre d'applications : 1 à 2
Méthode d'application : pulvérisation

gazons et pelouses (sauf terrains de golf) (*Lolium sp./Phleum sp./ Poa sp./Festuca sp.*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 4 application(s)/12 mois
Mesures de réduction du risque :
- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : dollar-spot des graminées (*Sclerotinia homoeocarpa*)
Dose : 0,95 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 4
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : anthracnose (*Colletotrichum graminicola*)
Dose : 0,95 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 4
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : fusariose (*Microdochium nivale / Fusarium sambucinum*)
Dose : 0,95 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 4
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 0,95 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 4
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

terrains de golf (*Lolium sp./Phleum sp./ Poa sp./Festuca sp.*)

Localisation du traitement : plein air
Type de culture : tout

Nombre maximal d'applications : 4 application(s)/12 mois
Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pour lutter contre : dollar-spot des graminées (*Sclerotinia homoeocarpa*)
Dose : 0,95 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 4
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : anthracnose (*Colletotrichum graminicola*)
Dose : 0,95 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 4
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)

Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : fusariose (*Microdochium nivale / Fusarium sambucinum*)
Dose : 0,95 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 4
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

Pour lutter contre : rhizoctone (*Rhizoctonia solani*)
Dose : 0,95 l/ha.
Nombre d'applications : 1 à 4
Intervalle minimal entre deux applications : 14 jour(s)
Méthode d'application : pulvérisation

EMBALLAGES

Ce produit ne peut être mis sur le marché que dans les emballages suivants :

Type :	**jerrican**	**Matériel :**	**PEHD**
Volume :	**5 l**	Contenu :	**5 l**
Volume :	**10 l**	Contenu :	**10 l**

DESCRIPTION DES CULTURES

fraisiers (*Fragaria x ananassa*) : champ de production: fraisiers dont la récolte est destinée à la consommation, toutes les variétés; champ de sélection et de multiplication; seulement pour les cultures destinées à la sélection et la propagation, toutes les variétés, la production ne peut en aucun cas être utilisée pour la consommation

betterave rouge et jaune (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva/Beta vulgaris subsp. vulgaris var. lutea*) : toutes les variétés

radis (*Raphanus sativus var. radicula*) : radis à peau généralement rouge ou blanche, de saveur peu piquante, toutes les variétés

radis noir et radis rave (*Raphanus sativus*) : radis à peau noire, rouge ou blanche de saveur forte, toutes les variétés (le raifort n'est pas compris dans cette définition)

chou-navet, rutabaga (*Brassica napus subsp. rapifera*) : toutes les variétés

navet (*Brassica rapa subsp. rapa*) : toutes les variétés

raifort (*Armoracia rusticana*) : toutes les variétés

tomate (*Solanum lycopersicum*) : toutes les variétés, y compris les tomates cerises

poivron / piment (*Capsicum annuum*) : toutes les variétes

chou brocoli (*Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa*) : toutes les variétés

chou-fleur (blanc et vert) (*Brassica oleracea var. botrytis subvar. cauliflora*) : toutes les variétés

chou frisé (chou palmier) (*Brassica oleracea var. sabellica; Brassica oleracea var. palmifolia*) : toutes les variétés

cresson alénois et autres jeunes pousses (*Lepidium sativum*) : toutes les variétés de pousses de légumes

mâche (*Valerianella locusta*) : toutes les variétés

laitues (*Lactuca sp.*) : toutes les espèces et variétés

endives/radicchio rosso/pain de sucre (*Cichorium endivia/C. intybus var. foliosum*) : toutes les variétés

roquette (*Eruca vesicaria subsp. sativa/Diplotaxis tenuifolia*) : plante aromatique ou médicinale, toutes les variétés

jeunes pousses (recoltées jusqu'au stade 8 vraies feuilles) (*babyleaf (harvested before BBCH 18)*) : Toute culture appartenant à la famille des Brassicaceae, Asteraceae ou Amaranthaceae (ou un mélange de celles-ci) pour autant qu'elle soit récoltée jusqu'au stade de 8 vraies feuilles

haricot vert (recolté frais, avec cosse) (*Phaseolus vulgaris*) : toutes les variétés dont les gousses sont récoltées à un stade immature

pois récoltés secs (sans cosse) (*Pisum sativum*) : toutes variétés dont sont récoltées les graines

sèches, pour la consommation humaine ou animale

fèves et féveroles (recoltées sèches) (*Vicia faba*) : toutes les variétés, récoltées sèches principalement pour la consommation animale

fèves et féveroles (récoltées fraîches, sans cosse) (*Vicia faba*) : toutes les variétés dont les graines sont récoltées immatures

soja (récolté sec) (*Glycine max*) : toutes les variétés dont les graines sont récoltées sèches

soja/edamame (récolté fraîche, sans cosse) (*Glycine max*) : toutes les variétés dont les graines sont récoltées immatures

soja/edamame (récolté fraîche, avec cosse) (*Glycine max*) : toutes les variétés dont les gousses sont récoltées immatures

pois chiche (recoltées sèches) (*Cicer arietinum*) : toutes les variétés

fenouil (*Foeniculum vulgare*) : toutes les variétés

poireau (*Allium porrum*) : Toutes les variétés. Note : le nombre d'applications est exprimé par culture. Cela doit être considéré comme un nombre maximal d'applications que peut recevoir un plant de poireau, indépendamment de l'endroit où il se situe. Dès lors, lit de semences et champ de production doivent être considérés comme une seule culture

rhubarbe (*Rheum rhabarbarum*) : toutes les variétés

ciboulette (consommation des feuilles) (*Allium schoenoprasum*) : plante aromatique ou médicinale, toutes les variétés

aneth (consommation des feuilles) (*Anethum graveolens*) : plante aromatique ou médicinale, toutes les variétés

angélique (consommation des feuilles) (*Angelica archangelica*) : plante aromatique ou médicinale, toutes les variétés

cerfeuil (consommation des feuilles) (*Anthriscus cerefolium*) : plante aromatique ou médicinale, toutes les variétés

céleri à couper (consommation des feuilles) (*Apium graveolens var. secalinum*) : plante aromatique ou médicinale, toutes les variétés

carvi (consommation des feuilles) (*Carum carvi*) : plante aromatique ou médicinale, toutes les variétés

coriandre (consommation des feuilles) (*Coriandrum sativum*) : plante aromatique ou médicinale, toutes les variétés

livèche (consommation des feuilles) (*Levisticum officinale*) : plante aromatique ou médicinale, toutes les variétés

cerfeuil musqué (consommation des feuilles) (*Myrrhis odorata*) : plante aromatique ou médicinale,

toutes les variétés

persil (consommation des feuilles) (*Petroselinum crispum*) : plante aromatique ou médicinale, toutes les variétés

persil à grosses racines et cerfeuil tubéreux (consommation de la racine) (*Petroselinum crispum var. tuberosum & Chaerophyllum bulbosum*) : plante aromatique ou médicinale, toutes les variétés

angélique (consommation des racines) (*Angelica archangelica*) : plante aromatique ou médicinale, toutes les variétés

estragon (consommation des feuilles) (*Artemisia dracunculus*) : plante aromatique ou médicinale, toutes les variétés

moutarde brune (consommation des feuilles) (*Brassica juncea*) : plante aromatique ou médicinale, toutes les variétés

mélisse (consommation des feuilles) (*Melissa officinalis*) : plante aromatique ou médicinale, toutes les variétés

menthe (consommation des feuilles) (*Mentha sp.*) : plante aromatique ou médicinale, toutes les variétés

basilic (consommation des feuilles) (*Ocimum basilicum*) : plante aromatique ou médicinale, toutes les variétés

origan / marjolaine (consommation des feuilles) (*Origanum majorana*) : plante aromatique ou médicinale, toutes les variétés

sauge officinale (consommation des feuilles) (*Salvia officinalis*) : plante aromatique ou médicinale, toutes les variétés

sarriette des jardins (consommation des feuilles) (*Satureja hortensis*) : plante aromatique ou médicinale, toutes les variétés

thym (consommation des feuilles) (*Thymus sp.*) : plante aromatique ou médicinale, toutes les variétés

romarin (consommation des feuilles) (*Salvia rosmarinus*) : plante aromatique ou médicinale, toutes les variétés

laurier (consommation des feuilles) (*Laurus nobilis*) : plante aromatique ou médicinale, toutes les variétés

oseille (consommation des feuilles) (*Rumex acetosa*) : plante aromatique ou médicinale, toutes les variétés

fleurs comestibles (*Edible flowers*) : plantes aromatiques ou médicinales, toutes les espèces et variétés, consommation des fleurs récoltées fraiches

froment d'hiver (*Triticum aestivum*) : toutes les variétés

froment de printemps (*Triticum aestivum*) : toutes les variétés

orge d'hiver (*Hordeum vulgare*) : toutes les variétés

orge de printemps (*Hordeum vulgare*) : toutes les variétés

seigle d'hiver (*Secale cereale*) : toutes les variétés

seigle de printemps (*Secale cereale*) : toutes les variétés

triticale d'hiver (*Triticosecale rimpaui*) : toutes les variétés

triticale de printemps (*Triticosecale rimpaui*) : toutes les variétés

pommes de terre (*Solanum tuberosum*) : traitement de la culture depuis l'implantation jusqu'à la récolte des pommes de terre (primeurs et de conservation)

lupin (*Lupinus sp.*) : toutes les variétés

betterave rouge et jaune (production de semences) (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva/Beta vulgaris subsp. vulgaris var. lutea*) : culture destinée à la récolte de semences, toutes les variétés

carottes (production de semences) (*Daucus carota*) : culture destinée à la récolte de semences, toutes les variétés

radis (production de semences) (*Raphanus sativus var. radicula*) : culture destinée à la récolte de semences, toutes les variétés

persil (production de semences) (*Petroselinum crispum*) : culture destinée à la récolte de semences, toutes les variétés

pois (production de semences) (*Pisum sativum*) : culture destinée à la récolte de semences, toutes les variétés

fèves et féveroles (production de semences) (*Vicia faba*) : culture destinée à la récolte de semences, toutes les variétés

culture de graminées (production de semences) (*Lolium sp./Phleum sp./ Poa sp./Festuca sp.*) : culture destinée à la récolte de semences, toutes les variétés

culture de plants de pommes de terre (*Solanum tuberosum*) : Pommes de terre cultivées pour la production de plants, toutes les variétés. Les tubercules de calibre excessif peuvent être vendus pour la consommation.

plantes ornementales (*ornamentals*) : Toutes les espèces et variétés, non destinées à la consommation. Les produits autorisés pour cette culture peuvent également être utilisés pour la production des arbres et arbustes fruitiers dans la mesure où ceux-ci ne sont pas encore à leur place définitive et que les fruits ne soient pas récoltés.

gazons et pelouses (sauf terrains de golf) (*Lolium sp./Phleum sp./ Poa sp./Festuca sp.*) : Surface enherbée dont l'herbe ne peut être utilisée pour l'alimentation animale. La production de gazon en rouleau tombe sous cette culture.

terrains de golf (*Lolium sp./Phleum sp./ Poa sp./Festuca sp.*) : surface enherbée dont l'herbe ne peut être utilisée pour l'alimentation animale