Volksgezondheid
Veiligheid van de Voedselketen
Leefmilieu

DG Dier, Plant, Voeding
Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten

Dossiernummer: 42152
Datum ondertekening: 27/04/2026

TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL

Betreft : uitbreiding paprika, aardbeiplanten (selectie en -vermeerderingsveld), tuinkers, rode amsoi, babyleaf, bieslook, engelwortel, roomse kervel, salie, rozemarijn, tijm, marjolein, bonenkruid, basilicum, munt, citroenmelisse, eetbare bloemen, laurier, dragon, rode en gele biet (zaadproductie), wortelen (zaadproductie), radijs (zaadproductie), erwten (zaadproductie), viciabonen (zaadproductie) en peterselie (zaadproductie) + bijkomende vijand in kervel, snijselder, karwij, koriander, dille, lavas, zuring, peterselie en sierplanten - wijziging aansprakelijkheid

Handelsbenaming :

NIMAGIS

Toelatingsnummer :

32690P/B

Gebruikerscategorie : **PROFESSIONEEL**

Toelatingshouder :

Syngenta Crop Protection
Naamloze vennootschap
Square de Meeûs 23
1000 BRUXELLES
Belgique

Aard van het middel : **Fungicide**

Formuleringstype : **SC (Suspensieconcentraat)**

Referentieproduct : **8898P/B**

Gewaarborgd gehalte van de werkzame stof(fen), synergist(en) en beschermstof(fen) :

- **azoxystrobin: 250 g/l (werkzame stof)**

Deze toelating is geldig van **02/05/2026** tot en met **31/05/2028** en vervangt elke eventuele voorafgaande toelatingsakte voor dit product.

Toegekende punten voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage (in toepassing van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten) : **2**.

Het product, voor zover het voldoet aan alle voorwaarden vastgesteld in deze toelatingsakte en haar bijlage, is toegelaten in toepassing van:

• de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;
• het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma :
de toelating is slechts geldig voor zover de namen en adressen van elke invoerder van dit product voorafgaandelijk meegedeeld worden aan de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

BIJLAGE

INDELING EN ETIKETTERING VAN HET PRODUCT

Onverminderd de bepalingen inzake indeling en/of etikettering van :

- de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006;
- de Verordening (EU) nr. 547/2011 van de Commissie van 08 juni 2011 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen;
- het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik;

moeten de volgende vermeldingen op het etiket van het product vermeld worden:

Indeling en etikettering in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008

Signaalwoord :

- WAARSCHUWING

GHS-codes en gevarenpictogrammen :

- GHS09 : Milieugevaarlijk 

Gevarenaanduidingen (H zinnen) :

- H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (P zinnen) :

- P280 : Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
- P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.

Aanvullende gevareninformatie (EUH zinnen) :

- EUH208 : Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
- EUH401 : Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Zinnen volgens Verordening (EG) nr. 1107/2009 of (EU) nr. 547/2011

Standaardzinnen voor veiligheidsadviezen (SP zinnen) :

- SP1 : Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPa1 : Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met

producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 11.
- SPe3 : Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
- SPo : Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

<u>Andere voorwaarden/nationale zinnen</u>

- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn (en) te verkorten.

- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

GEBRUIKEN

De toepassingen waarvoor het product is toegelaten en de specifieke voorwaarden waaronder het product gebruikt mag worden :

koolraap (*Brassica napus subsp. rapifera*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: spikkelziekte / alternaria (*Alternaria brassicae*)
Toepassingsstadium: preventief of bij het verschijnen van de eerste aantasting
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

raap (stoppelraap, meiraap) (*Brassica rapa subsp. rapa*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: spikkelziekte / alternaria (*Alternaria brassicae*)
Toepassingsstadium: preventief of bij het verschijnen van de eerste aantasting
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

drooggeoogste erwten (zonder peul) (*Pisum sativum*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste bloemen geopend (sporadisch in gewas) - einde bloei (BBCH 60-69)
Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 36 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe pisi*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: anthracnose (*Didymella pisi / Ascochyta pisi*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: roest (*Uromyces pisi*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

vicia-bonen (paarden-, duiven, tuin-,...) (drooggeoogst) (*Vicia faba*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste bloemen geopend (sporadisch in gewas) - einde bloei (BBCH 60-69)
Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: anthracnose (*Didymella pisi / Ascochyta pisi*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (groengeoogst, zonder peul) (*Vicia faba*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste bloemen geopend (sporadisch in gewas) - einde bloei (BBCH 60-69)
Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: anthracnose (*Didymella pisi / Ascochyta pisi*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

wintertarwe (*Triticum aestivum*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 2de knoop minstens 2 cm boven eerste knoop - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 32-59)
Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici / Leptosphaeria nodorum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kafjesbruin (*Septoria nodorum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe graminis*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

zomertarwe (*Triticum aestivum*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 2de knoop minstens 2 cm boven eerste knoop - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 32-59)
Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici / Leptosphaeria nodorum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kafjesbruin (*Septoria nodorum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe graminis*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

wintergerst (*Hordeum vulgare*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - vlagblad volledig uitgegroeid, ligula zichtbaar (BBCH 31-39)
Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: netvlekkenziekte / strepenziekte (*Pyrenophora / Helminthosporium / Drechslera*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe graminis*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: dwergroest (*Puccinia hordei*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

zomergerst (*Hordeum vulgare*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - vlagblad volledig uitgegroeid, ligula zichtbaar (BBCH 31-39)
Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: netvlekkenziekte / strepenziekte (*Pyrenophora / Helminthosporium / Drechslera*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe graminis*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: dwergroest (*Puccinia hordei*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

winterrogge (*Secale cereale*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 2de knoop minstens 2 cm boven eerste knoop - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 32-59)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici / Leptosphaeria nodorum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kafjesbruin (*Septoria nodorum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe graminis*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

zomerrogge (*Secale cereale*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 2de knoop minstens 2 cm boven eerste knoop - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 32-59)
Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici / Leptosphaeria nodorum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kafjesbruin (*Septoria nodorum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe graminis*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

wintertriticale (*Triticosecale rimpaui*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 2de knoop minstens 2 cm boven eerste knoop - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 32-59)
Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici / Leptosphaeria nodorum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kafjesbruin (*Septoria nodorum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe graminis*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

zomertriticale (*Triticosecale rimpaui*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 2de knoop minstens 2 cm boven eerste knoop - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 32-59)
Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici / Leptosphaeria nodorum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kafjesbruin (*Septoria nodorum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe graminis*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

aardappelen (*Solanum tuberosum*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: alternariarot (*Alternaria solani*)
Dosis: 0,25 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

aardappelen (*Solanum tuberosum*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: tijdens het planten
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: lakschurft (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 22,5 ml/100 m
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting
Opmerking: rijbehandeling

aardappelen (*Solanum tuberosum*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor het planten
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: lakschurft (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 6 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting
Opmerking: volleveldsbehandeling, inwerken in de bodem

lupine (*Lupinus sp.*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 35 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: anthracnose (*Colletotrichum lupini*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 28 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

graszaadteelt (*Lolium sp./Phleum sp./ Poa sp./Festuca sp.*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: zaaizaadproductie

Toepassingsstadium: 2de knoop minstens 2 cm boven eerste knoop - halverwege aarvorming: helft van bloeiwijze verschenen (BBCH 32-55)
Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kafjesbruin (*Septoria nodorum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe graminis*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

aardappelpootgoedteelt (*Solanum tuberosum*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: alternariarot (*Alternaria solani*)
Dosis: 0,25 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 3
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

aardappelpootgoedteelt (*Solanum tuberosum*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: tijdens het planten
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: lakschurft (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 22,5 ml/100 m
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting
Opmerking: rijbehandeling

aardappelpootgoedteelt (*Solanum tuberosum*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor het planten
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: lakschurft (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 6 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting
Opmerking: volleveldsbehandeling, inwerken in de bodem

UITBREIDING VAN DE TOELATING VOOR KLEINE TOEPASSINGEN (in toepassing van Artikel 51 van Verordening (EG) nr. 1107/2009).

Voor deze uitbreidingen valt het gebruik van het product onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Omdat er slechts beperkte werkzaamheids- en fytotoxiciteitsgegevens werden geëvalueerd, wordt er aangeraden een test uit te voeren voordat het product wordt gebruikt.

aardbeiplanten (*Fragaria x ananassa*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: selectie- en vermeerderingsveld

Toepassingsstadium: verschijnen aanzet van bloeiwijze in centrum van rozet - belangrijkste oogst: meeste aardbeien hebben variëteitspecifieke kleur (BBCH 55-87)
Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Opmerking(en):

- Tijdens de toepassing, vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

- Om de gezondheid te beschermen, is het noodzakelijk om basisbeschermingskledij (die armen en benen bedekt) te dragen bij kortstondig (minder dan 2u per dag) en weinig intens contact met het gewas (bijv. tijdens inspectie of irrigatie).

- Om de gezondheid te beschermen, is het noodzakelijk om chemisch bestendige handschoenen en basisbeschermingskledij (die armen en benen bedekt) te dragen bij langdurig contact (meer dan 2u per dag) of bij intens contact met het gewas (bijv. bij onderhoud en/of oogst).

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Podosphaera aphanis*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 3
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

aardbeiplanten (*Fragaria x ananassa*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: selectie- en vermeerderingsveld

Toepassingsstadium: verschijnen aanzet van bloeiwijze in centrum van rozet - belangrijkste oogst: meeste aardbeien hebben variëteitspecifieke kleur (BBCH 55-87)
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Opmerking(en):

- Tijdens de toepassing, vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

- Om de gezondheid te beschermen, is het noodzakelijk om basisbeschermingskledij (die armen en benen bedekt) te dragen bij kortstondig (minder dan 2u per dag) en weinig intens contact met het gewas (bijv. tijdens inspectie of irrigatie).

- Om de gezondheid te beschermen, is het noodzakelijk om chemisch bestendige handschoenen en basisbeschermingskledij (die armen en benen bedekt) te dragen bij langdurig contact (meer dan 2u per dag) of bij intens contact met het gewas (bijv. bij onderhoud en/of oogst).

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Podosphaera aphanis*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 3
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

rode en gele biet (kroten) (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva/Beta vulgaris subsp. vulgaris var. lutea*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: cercospora-bladvlekkenziekte (*Cercospora beticola*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe betae / E. polygoni*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

radijs (*Raphanus sativus var. radicula*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 21 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: witte roest (*Albugo candida*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: spikkelziekte / alternaria (*Alternaria brassicae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

radijs (*Raphanus sativus var. radicula*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: witte roest (*Albugo candida*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: spikkelziekte / alternaria (*Alternaria brassicae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

rammenas en rettich (*Raphanus sativus*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 21 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: witte roest (*Albugo candida*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: spikkelziekte / alternaria (*Alternaria brassicae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

rammenas en rettich (*Raphanus sativus*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: witte roest (*Albugo candida*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: spikkelziekte / alternaria (*Alternaria brassicae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

mierikswortel (*Armoracia rusticana*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: spikkelziekte / alternaria (*Alternaria brassicae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

tomaten (*Solanum lycopersicum*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 1 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Leveillula taurica*)
Dosis: 0,8 l/ha
Andere uitdrukking: 0,32 l/ha haag
Aantal toepassingen: 1 tot 3
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternariarot (*Alternaria solani*)
Dosis: 0,8 l/ha
Andere uitdrukking: 0,32 l/ha haag
Aantal toepassingen: 1 tot 3
Toepassingstechniek: bespuiting

paprika / Spaanse peper (*Capsicum annuum*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Opmerking(en):
- Tijdens de toepassing, vloeistofdichte chemisch bestendige overall en chemisch bestendige handschoenen dragen.

- Om de gezondheid te beschermen, is het noodzakelijk om basisbeschermingskledij (die armen en benen bedekt) te dragen bij kortstondig (minder dan 2u per dag) en weinig intens contact met het gewas (bijv. tijdens inspectie of irrigatie) tot en met 21 dagen na behandeling.

- Om de gezondheid te beschermen, is het noodzakelijk om chemisch bestendige handschoenen envbasisbeschermingskledij (die armen en benen bedekt) te dragen bij langdurig contact (meer dan 2u pervdag) of bij intens contact met het gewas (bijv. bij onderhoud en/of oogst) tot en met 7 dagen navbehandeling.

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Leveillula taurica*)
Dosis: 0,4 l/ha haag
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

broccoli (*Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: witte roest (*Albugo candida*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: spikkelziekte / alternaria (*Alternaria brassicae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

bloemkool (witte en groene) (*Brassica oleracea var. botrytis subvar. cauliflora*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 28 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Opmerking(en):
Tijdens de manipulatie en de oogst van het behandelde gewas chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van: witte roest (*Albugo candida*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: spikkelziekte / alternaria (*Alternaria brassicae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

boerenkool (krulkool, palmboerenkool) (*Brassica oleracea var. sabellica; Brassica oleracea var. palmifolia*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: witte roest (*Albugo candida*)
Dosis: 1 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: spikkelziekte / alternaria (*Alternaria brassicae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

tuinkers en andere kiemen en scheuten (*Lepidium sativum*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 30 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

tuinkers en andere kiemen en scheuten (*Lepidium sativum*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

veldsla (*Valerianella locusta*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: kiembladeren ontvouwen; groeipunt of tip van eerste echte bladeren zichtbaar - 6 bladeren ontvouwen (BBCH 10-16)
Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

slasoorten (*Lactuca sp.*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 30 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Bremia lactucae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

slasoorten (*Lactuca sp.*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Bremia lactucae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

andijvie/radicchio rosso/suikerbrood (*Cichorium endivia/C. intybus var. foliosum*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 30 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

andijvie/radicchio rosso/suikerbrood (*Cichorium endivia/C. intybus var. foliosum*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha

Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

rucola (*Eruca vesicaria subsp. sativa/Diplotaxis tenuifolia*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Hyaloperonospora brassicae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

rucola (*Eruca vesicaria subsp. sativa/Diplotaxis tenuifolia*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Hyaloperonospora brassicae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

babyleaf (geoogst tot het stadium 8 bladeren) (*babyleaf (harvested before BBCH 18)*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 30 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

babyleaf (geoogst tot het stadium 8 bladeren) (*babyleaf (harvested before BBCH 18)*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul) (*Phaseolus vulgaris*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: brandvlekkenziekte / vlekziekte (*Colletotrichum lindemuthianum*)
Dosis: 0,8 - 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: roest (*Uromyces appendiculatus*)
Dosis: 0,8 - 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

soja (drooggeoogst) (*Glycine max*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste bloemen geopend (sporadisch in gewas) - ongeveer 40% van bloemen geopend (BBCH 60-64)
Wachttijd voor de oogst: 21 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor (S. sclerotiorum)*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

soja/edamame (groengeoogst, zonder peul) (*Glycine max*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste bloemen geopend (sporadisch in gewas) - einde bloei: eerste peulen zichtbaar (ongeveer 5 mm lang) (BBCH 60-69)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Opmerking(en):
- max. 1,6 l/ha/teelt

Ter bestrijding van: anthracnose (*Didymella pisi / Ascochyta pisi*)
Dosis: 0,8 - 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis fabae*)
Dosis: 0,8 - 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

soja/edamame (groengeoogst, zonder peul) (*Glycine max*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: drievoudig blad op 7de knoop ontvouwen - ongeveer 20% van peulen hebben finale lengte bereikt (15-20 mm); de zaden beginnen peulen op te vullen (BBCH 17-72)
Wachttijd voor de oogst: 35 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Opmerking(en):
- max. 1,6 l/ha/teelt

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor (S. sclerotiorum)*)
Dosis: 0,8 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

soja/edamame (groengeoogst, met peul) (*Glycine max*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Opmerking(en):
- max. 1,6 l/ha/teelt

Ter bestrijding van: anthracnose (*Didymella pisi / Ascochyta pisi*)
Dosis: 0,8 - 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis fabae*)
Dosis: 0,8 - 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

soja/edamame (groengeoogst, met peul) (*Glycine max*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: drievoudig blad op 7de knoop ontvouwen - ongeveer 20% van peulen hebben finale lengte bereikt (15-20 mm); de zaden beginnen peulen op te vullen (BBCH 17-72)
Wachttijd voor de oogst: 35 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Opmerking(en):
- max. 1,6 l/ha/teelt

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor (S. sclerotiorum)*)
Dosis: 0,8 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

kekererwten/kikkererwten (drooggeoogst) (*Cicer arietinum*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste bloemen geopend (sporadisch in gewas) - einde bloei: vruchtaanzet zichtbaar (BBCH 60-69)
Wachttijd voor de oogst: 36 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Opmerking(en):
- max. 1,6 l/ha/teelt

Ter bestrijding van: anthracnose (*Didymella pisi / Ascochyta pisi*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis fabae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

kekererwten/kikkererwten (drooggeoogst) (*Cicer arietinum*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: zeven echte bladeren ontvouwen - ongeveer 20% van peulen hebben finale lengte bereikt; de zaden beginnen peulen op te vullen (BBCH 17-72)
Wachttijd voor de oogst: 35 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Opmerking(en):
- max. 1,6 l/ha/teelt

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor (S. sclerotiorum)*)
Dosis: 0,8 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

knolvenkel (*Foeniculum vulgare*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Toepassingsstadium: preventief of bij het verschijnen van de eerste aantasting
Dosis: 0,8 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor (S. sclerotiorum)*)
Toepassingsstadium: preventief of bij het verschijnen van de eerste aantasting
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 3
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

knolvenkel (*Foeniculum vulgare*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Toepassingsstadium: preventief of bij het verschijnen van de eerste aantasting
Dosis: 0,8 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor (S. sclerotiorum)*)
Toepassingsstadium: preventief of bij het verschijnen van de eerste aantasting
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 3
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

prei (*Allium porrum*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: papiervlekkenziekte (*Phytophthora porri*)
Toepassingsstadium: preventief of bij het verschijnen van de eerste aantasting
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 4
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: purpervlekkenziekte (*Alternaria porri*)
Toepassingsstadium: preventief of bij het verschijnen van de eerste aantasting
Dosis: 1 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: roest (*Puccinia porri / P. allii*)
Toepassingsstadium: preventief of bij het verschijnen van de eerste aantasting
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 4
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

prei (*Allium porrum*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 21 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: papiervlekkenziekte (*Phytophthora porri*)
Toepassingsstadium: preventief of bij het verschijnen van de eerste aantasting
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 3
Minimum interval tussen twee toepassingen: 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: purpervlekkenziekte (*Alternaria porri*)
Toepassingsstadium: preventief of bij het verschijnen van de eerste aantasting
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 3
Minimum interval tussen twee toepassingen: 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: roest (*Puccinia porri / P. allii*)
Toepassingsstadium: preventief of bij het verschijnen van de eerste aantasting
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 3
Minimum interval tussen twee toepassingen: 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

rabarber (*Rheum rhabarbarum*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte / ramularia (*Ramularia rhei*)
Dosis: 0,8 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Toepassingstechniek: bespuiting

bieslook (consumptie bladeren) (*Allium schoenoprasum*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 30 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: septoria (*Septoria*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphaceae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria sp.*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

bieslook (consumptie bladeren) (*Allium schoenoprasum*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: septoria (*Septoria*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphaceae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria sp.*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

dille (consumptie bladeren) (*Anethum graveolens*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 30 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

dille (consumptie bladeren) (*Anethum graveolens*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

grote engelwortel (consumptie bladeren) (*Angelica archangelica*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 30 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Septoria apiicola*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

grote engelwortel (consumptie bladeren) (*Angelica archangelica*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Septoria apiicola*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)
Dosis: 1 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

kervel (consumptie bladeren) (*Anthriscus cerefolium*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 30 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

kervel (consumptie bladeren) (*Anthriscus cerefolium*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

snijselder (consumptie bladeren) (*Apium graveolens var. secalinum*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 30 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

snijselder (consumptie bladeren) (*Apium graveolens var. secalinum*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

karwij (consumptie bladeren) (*Carum carvi*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 30 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

karwij (consumptie bladeren) (*Carum carvi*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

koriander (consumptie bladeren) (*Coriandrum sativum*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 30 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

koriander (consumptie bladeren) (*Coriandrum sativum*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

lavas / maggiplant (consumptie bladeren) (*Levisticum officinale*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 30 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

lavas / maggiplant (consumptie bladeren) (*Levisticum officinale*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

roomse kervel (consumptie bladeren) (*Myrrhis odorata*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 30 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

roomse kervel (consumptie bladeren) (*Myrrhis odorata*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

peterselie (consumptie bladeren) (*Petroselinum crispum*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 30 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

peterselie (consumptie bladeren) (*Petroselinum crispum*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)
Dosis: 1 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

wortelpeterselie en wortelkervel (consumptie wortels) (*Petroselinum crispum var. tuberosum & Chaerophyllum bulbosum*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)
Dosis: 1 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

grote engelwortel (consumptie wortels) (*Angelica archangelica*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 10 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

dragon (consumptie bladeren) (*Artemisia dracunculus*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 30 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: septoria (*Septoria*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria sp.*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

dragon (consumptie bladeren) (*Artemisia dracunculus*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: septoria (*Septoria*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria sp.*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

rode amsoi (consumptie bladeren) (*Brassica juncea*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 30 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

rode amsoi (consumptie bladeren) (*Brassica juncea*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

citroenmelisse (consumptie bladeren) (*Melissa officinalis*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 30 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: septoria (*Septoria*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphaceae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria sp.*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

citroenmelisse (consumptie bladeren) (*Melissa officinalis*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: septoria (*Septoria*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphaceae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria sp.*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

munt (consumptie bladeren) (*Mentha sp.*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 30 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: septoria (*Septoria*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphaceae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria sp.*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

munt (consumptie bladeren) (*Mentha sp.*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: septoria (*Septoria*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphaceae*)
Dosis: 1 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria sp.*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

basilicum (consumptie bladeren) (*Ocimum basilicum*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 30 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: septoria (*Septoria*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphaceae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria sp.*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

basilicum (consumptie bladeren) (*Ocimum basilicum*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: septoria (*Septoria*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphaceae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria sp.*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

marjolein / oregano (consumptie bladeren) (*Origanum majorana*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 30 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: septoria (*Septoria*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria sp.*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

marjolein / oregano (consumptie bladeren) (*Origanum majorana*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: septoria (*Septoria*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphaceae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria sp.*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

salie (consumptie bladeren) (*Salvia officinalis*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 30 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: septoria (*Septoria*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria sp.*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

salie (consumptie bladeren) (*Salvia officinalis*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: septoria (*Septoria*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphaceae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria sp.*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

bonenkruid (consumptie bladeren) (*Satureja hortensis*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 30 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: septoria (*Septoria*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphaceae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria sp.*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

bonenkruid (consumptie bladeren) (*Satureja hortensis*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: septoria (*Septoria*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphaceae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria sp.*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

tijm (consumptie bladeren) (*Thymus sp.*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 30 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: septoria (*Septoria*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria sp.*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

tijm (consumptie bladeren) (*Thymus sp.*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: septoria (*Septoria*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphaceae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria sp.*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

rozemarijn (consumptie bladeren) (*Salvia rosmarinus*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 30 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: septoria (*Septoria*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria sp.*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

rozemarijn (consumptie bladeren) (*Salvia rosmarinus*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: septoria (*Septoria*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphaceae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria sp.*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

laurier (consumptie bladeren) (*Laurus nobilis*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 30 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: septoria (*Septoria*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphaceae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria sp.*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

laurier (consumptie bladeren) (*Laurus nobilis*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: septoria (*Septoria*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphaceae*)
Dosis: 1 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria sp.*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

zuring (consumptie bladeren) (*Rumex acetosa*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 30 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte / ramularia (*Ramularia pratensis*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

zuring (consumptie bladeren) (*Rumex acetosa*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte / ramularia (*Ramularia pratensis*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

eetbare bloemen (*Edible flowers*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 30 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: septoria (*Septoria*)
Dosis: 1 l/ha

Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphaceae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria sp.*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

eetbare bloemen (*Edible flowers*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):
max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: septoria (*Septoria*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphaceae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria sp.*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

rode en gele biet (kroten) (zaadproductie) (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva/Beta vulgaris subsp. vulgaris var. lutea*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: zaaizaadproductie

Toepassingsstadium: ≤ BBCH 59 (eerste kroonbladeren zichtbaar, bloemknoppen nog gesloten)
Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: cercospora-bladvlekkenziekte (*Cercospora beticola*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe betae / E. polygoni*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

wortelen (zaadproductie) (*Daucus carota*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: zaaizaadproductie

Toepassingsstadium: ≤ BBCH 59 (eerste kroonbladeren zichtbaar, bloemknoppen nog gesloten)
Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

radijs (zaadproductie) (*Raphanus sativus var. radicula*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: zaaizaadproductie

Toepassingsstadium: ≤ BBCH 59 (eerste kroonbladeren zichtbaar, bloemknoppen nog gesloten)
Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: witte roest (*Albugo candida*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: spikkelziekte / alternaria (*Alternaria brassicae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

peterselie (zaadproductie) (*Petroselinum crispum*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: zaaizaadproductie

Toepassingsstadium: ≤ BBCH 59 (eerste kroonbladeren zichtbaar, bloemknoppen nog gesloten)
Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Septoria petroselini / Cercosporidium punctum*)
Dosis: 1 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

erwten (zaadproductie) (*Pisum sativum*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: zaaizaadproductie

Toepassingsstadium: eerste bloemen geopend (sporadisch in gewas) - einde bloei (BBCH 60-69)
Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe pisi*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: anthracnose (*Didymella pisi / Ascochyta pisi*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis fabae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: roest (*Uromyces pisi*)
Dosis: 1 l/ha

Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

vicia-bonen (zaadproductie) (*Vicia faba*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: zaaizaadproductie

Toepassingsstadium: eerste bloemen geopend - einde bloei (BBCH 60-69)
Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Ascochyta fabae / Didymella fabae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis fabae*)
Dosis: 1 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

sierplanten (*ornamentals*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden
Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):

- Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort(en): /.
- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating/vergunning.
- Sierplanten mogen (binnen de 3 jaar na behandeling met gewasbeschermingsmiddelen) niet worden afgewisseld met volggewassen bestemd voor menselijke of dierlijke consumptie.

Ter bestrijding van: witte roest (*Albugo candida*)
Dosis: 100 ml/100 l
Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: blad-en takphytophthora en valse meeldauw (*Phytophthora spp. / Peronospora spp.*)
Dosis: 100 ml/100 l
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: cladosporium (Cladosporium spp.) (*Cladosporium*)
Dosis: 100 ml/100 l
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: Calonectria (Cylindrocladium) (*Calonectria spp.*)
Dosis: 100 ml/100 l
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: septoria (*Septoria*)
Dosis: 100 ml/100 l
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: stemphylium (*Stemphylium*)
Dosis: 100 ml/100 l
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphaceae*)
Dosis: 100 ml/100 l
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (*Sclerotinia spp.*)
Dosis: 100 ml/100 l
Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria sp.*)
Dosis: 100 ml/100 l
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: Ascochyta (*Ascochyta*)
Dosis: 100 ml/100 l
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)
Dosis: 100 ml/100 l
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: roest (*Puccinia / Uromyces / Phragmidium / ...*)
Toepassingsstadium: preventief
Dosis: 100 ml/100 l
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

sierplanten (*ornamentals*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: onmiddellijk na het planten of het stekken
Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden
Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):

- Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort(en): /
- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating/vergunning.

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 100 ml/100 l
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Toepassingstechniek: bespuiting

sierplanten (*ornamentals*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):

- Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort(en): Buxus, Viola x wittrockiana, Ranunculus, Prunus lauruceratus, Rosa hybrida, Kalanchoë en Aster.
- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating/vergunning.
- Sierplanten mogen (binnen de 3 jaar na behandeling met gewasbeschermingsmiddelen) niet worden afgewisseld met volggewassen bestemd voor menselijke of dierlijke consumptie.

Ter bestrijding van: witte roest (*Albugo candida*)
Dosis: 100 ml/100 l
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: blad-en takphytophthora en valse meeldauw (*Phytophthora spp. / Peronospora spp.*)
Dosis: 100 ml/100 l
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: cladosporium (Cladosporium spp.) (*Cladosporium*)
Dosis: 100 ml/100 l
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: Calonectria (Cylindrocladium) (*Calonectria spp.*)
Dosis: 100 ml/100 l
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: septoria (*Septoria*)
Dosis: 100 ml/100 l
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: stemphylium (*Stemphylium*)
Dosis: 100 ml/100 l
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphaceae*)
Dosis: 100 ml/100 l
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (*Sclerotinia spp.*)
Dosis: 100 ml/100 l
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria sp.*)
Dosis: 100 ml/100 l
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: Ascochyta (*Ascochyta*)
Dosis: 100 ml/100 l
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)
Dosis: 100 ml/100 l
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: roest (*Puccinia / Uromyces / Phragmidium / ...*)
Toepassingsstadium: preventief
Dosis: 100 ml/100 l
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

sierplanten (*ornamentals*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: onmiddellijk na het planten of het stekken
Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwing(en):
- Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort(en): /
- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating/vergunning.

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 100 ml/100 l
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Toepassingstechniek: bespuiting

gazons en grasvelden (behalve golfterreinen) (*Lolium sp./Phleum sp./ Poa sp./Festuca sp.*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/12 maanden
Risicobeperkende maatregelen:
- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: dollarspot (*Sclerotinia homoeocarpa*)
Dosis: 0,95 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 4
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: anthracnose (*Colletotrichum graminicola*)
Dosis: 0,95 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 4
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: sneeuwschimmel / fusariose (*Microdochium nivale / Fusarium sambucinum*)
Dosis: 0,95 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 4
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 0,95 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 4
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

golfterreinen (*Lolium sp./Phleum sp./ Poa sp./Festuca sp.*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/12 maanden
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Ter bestrijding van: dollarspot (*Sclerotinia homoeocarpa*)
Dosis: 0,95 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 4
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: anthracnose (*Colletotrichum graminicola*)
Dosis: 0,95 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 4

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: sneeuwschimmel / fusariose (*Microdochium nivale / Fusarium sambucinum*)
Dosis: 0,95 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 4
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)
Dosis: 0,95 l/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 4
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

VERPAKKINGEN

Dit product mag alleen op de markt worden gebracht in de volgende verpakkingen :

Type : jerrycan **Materiaal : HDPE**

Volume :	**5 l**	Inhoud :	**5 l**
Volume :	**10 l**	Inhoud :	**10 l**

OMSCHRIJVING VAN DE TEELTEN

aardbeiplanten (*Fragaria x ananassa*) : productieveld: aardbeien waarvan de oogst bestemd is voor consumptie, alle variëteiten; selectie- en vermeerderingsveld: gewas geteeld voor selectie of vermeerdering, alle variëteiten, de oogst mag niet gebruikt worden voor consumptie.

rode en gele biet (kroten) (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva/Beta vulgaris subsp. vulgaris var. lutea*) : alle variëteiten

radijs (*Raphanus sativus var. radicula*) : radijs met een overwegend rode of witte schil, weinig pikante smaak, alle variëteiten

rammenas en rettich (*Raphanus sativus*) : radijs met een overwegend rode, witte of zwarte schil, zeer pikante smaak, alle variëteiten (mierikswortel is niet inbegrepen)

koolraap (*Brassica napus subsp. rapifera*) : alle variëteiten

raap (stoppelraap, meiraap) (*Brassica rapa subsp. rapa*) : alle variëteiten

mierikswortel (*Armoracia rusticana*) : alle variëteiten

tomaten (*Solanum lycopersicum*) : alle varieteiten, inbegrepen de kerstomaten

paprika / Spaanse peper (*Capsicum annuum*) : alle variëteiten

broccoli (*Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa*) : alle variëteiten

bloemkool (witte en groene) (*Brassica oleracea var. botrytis subvar. cauliflora*) : alle variëteiten

boerenkool (krulkool, palmboerenkool) (*Brassica oleracea var. sabellica; Brassica oleracea var. palmifolia*) : alle variëteiten

tuinkers en andere kiemen en scheuten (*Lepidium sativum*) : alle variëteiten van scheutgroenten

veldsla (*Valerianella locusta*) : alle variëteiten

slasoorten (*Lactuca sp.*) : alle soorten en variëteiten

andijvie/radicchio rosso/suikerbrood (*Cichorium endivia/C. intybus var. foliosum*) : alle variëteiten

rucola (*Eruca vesicaria subsp. sativa/Diplotaxis tenuifolia*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

babyleaf (geoogst tot het stadium 8 bladeren) (*babyleaf (harvested before BBCH 18)*) : Elk gewas behorend tot de familie van de Brassicaceae, de Asteraceae of de Amaranthaceae (of een mengeling van deze) voor zover het geoogst wordt tot het stadium 8 echte bladeren.

stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul) (*Phaseolus vulgaris*) : alle variëteiten waarvan de peulen onrijp geoogst worden

drooggeoogste erwten (zonder peul) (*Pisum sativum*) : alle variëteiten waarvan de zaden drooggeoogst worden, zowel voor dierlijke als menselijke consumptie

vicia-bonen (paarden-, duiven, tuin-,...) (drooggeoogst) (*Vicia faba*) : alle variëteiten, drooggeoogst,

voornamelijk voor dierlijke consumptie

vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (groengeoogst, zonder peul) (*Vicia faba*) : alle variëteiten waarvan de onrijpe zaden geoogst worden

soja (drooggeoogst) (*Glycine max*) : alle variëteiten waarvan de zaden drooggeoogst worden

soja/edamame (groengeoogst, zonder peul) (*Glycine max*) : alle variëteiten waarvan de zaden onrijp geoogst worden

soja/edamame (groengeoogst, met peul) (*Glycine max*) : alle variëteiten waarvan de peulen onrijp geoogst worden

kekererwten/kikkererwten (drooggeoogst) (*Cicer arietinum*) : alle variëteiten

knolvenkel (*Foeniculum vulgare*) : alle variëteiten

prei (*Allium porrum*) : Alle variëteiten. Let op: Het aantal toepassingen wordt uitgedrukt als een aantal per teelt. Dit moet beschouwd worden als het aantal toepassingen die één preiplant mag ontvangen, ongeacht de plaats waar dit plantje staat. Dus zaaibed en productieveld worden beschouwd als één teelt.

rabarber (*Rheum rhabarbarum*) : alle variëteiten

bieslook (consumptie bladeren) (*Allium schoenoprasum*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

dille (consumptie bladeren) (*Anethum graveolens*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

grote engelwortel (consumptie bladeren) (*Angelica archangelica*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

kervel (consumptie bladeren) (*Anthriscus cerefolium*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

snijselder (consumptie bladeren) (*Apium graveolens var. secalinum*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

karwij (consumptie bladeren) (*Carum carvi*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

koriander (consumptie bladeren) (*Coriandrum sativum*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

lavas / maggiplant (consumptie bladeren) (*Levisticum officinale*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

roomse kervel (consumptie bladeren) (*Myrrhis odorata*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

peterselie (consumptie bladeren) (*Petroselinum crispum*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

wortelpeterselie en wortelkervel (consumptie wortels) (*Petroselinum crispum var. tuberosum & Chaerophyllum bulbosum*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

grote engelwortel (consumptie wortels) (*Angelica archangelica*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

dragon (consumptie bladeren) (*Artemisia dracunculus*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

rode amsoi (consumptie bladeren) (*Brassica juncea*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

citroenmelisse (consumptie bladeren) (*Melissa officinalis*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

munt (consumptie bladeren) (*Mentha sp.*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

basilicum (consumptie bladeren) (*Ocimum basilicum*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

marjolein / oregano (consumptie bladeren) (*Origanum majorana*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

salie (consumptie bladeren) (*Salvia officinalis*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

bonenkruid (consumptie bladeren) (*Satureja hortensis*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

tijm (consumptie bladeren) (*Thymus sp.*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

rozemarijn (consumptie bladeren) (*Salvia rosmarinus*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

laurier (consumptie bladeren) (*Laurus nobilis*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

zuring (consumptie bladeren) (*Rumex acetosa*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

eetbare bloemen (*Edible flowers*) : aromatische of medicinale plant, alle soorten en variëteiten, consumptie van versgeoogste bloemen

wintertarwe (*Triticum aestivum*) : alle variëteiten

zomertarwe (*Triticum aestivum*) : alle variëteiten

wintergerst (*Hordeum vulgare*) : alle variëteiten

zomergerst (*Hordeum vulgare*) : alle variëteiten

winterrogge (*Secale cereale*) : alle variëteiten

zomerrogge (*Secale cereale*) : alle variëteiten

wintertriticale (*Triticosecale rimpaui*) : alle variëteiten

zomertriticale (*Triticosecale rimpaui*) : alle variëteiten

aardappelen (*Solanum tuberosum*) : behandeling van de teelt vanaf het planten tot aan de oogst van de aardappelen (primeur- en bewaaraardappelen)

lupine (*Lupinus sp.*) : alle variëteiten

rode en gele biet (kroten) (zaadproductie) (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva/Beta vulgaris subsp. vulgaris var. lutea*) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten

wortelen (zaadproductie) (*Daucus carota*) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten

radijs (zaadproductie) (*Raphanus sativus var. radicula*) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten

peterselie (zaadproductie) (*Petroselinum crispum*) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten

erwten (zaadproductie) (*Pisum sativum*) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten

vicia-bonen (zaadproductie) (*Vicia faba*) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten

graszaadteelt (*Lolium sp./Phleum sp./ Poa sp./Festuca sp.*) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten

aardappelpootgoedteelt (*Solanum tuberosum*) : Aardappelen die gekweekt worden om als pootgoed te gebruiken, alle variëteiten. Bovenmaats pootgoed mag verkocht worden voor consumptie.

sierplanten (*ornamentals*) : Alle soorten en variëteiten, niet bestemd voor consumptie. Middelen toegelaten in deze teelt mogen ook gebruikt worden voor de opkweek van fruitbomen en -heesters voor zover deze nog niet op hun definitieve plaats staan en de vruchten niet geoogst worden.

gazons en grasvelden (behalve golfterreinen) (*Lolium sp./Phleum sp./ Poa sp./Festuca sp.*) : grasvlakte waarvan het gras niet mag gebruikt worden voor vervoedering. De productie van gazonrollen valt onder deze teelt.

golfterreinen (*Lolium sp./Phleum sp./ Poa sp./Festuca sp.*) : grasvlakte waarvan het gras niet mag gebruikt worden voor vervoedering