



Dossiernummer: 41324

Datum ondertekening: 04/03/2026

## TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL

**Betreft : corrigendum**

Handelsbenaming :

**DEFI**

Toelatingsnummer :

**7864P/B**

Gebruikerscategorie : **PROFESSIONEEL**

Toelatingshouder :

**Syngenta Crop Protection**

Naamloze vennootschap

Avenue Louise 489

1050 BRUXELLES

Belgique

Aard van het middel : **Herbicide**

Formuleringstype : **EC (Emulgeerbaar concentraat)**

Gewaarborgd gehalte van de werkzame stof(fen), synergist(en) en beschermstof(fen) :

- **prosulfocarb: 800 g/l (werkzame stof)**

Deze toelating is geldig van **09/03/2026** tot en met **31/01/2028** en vervangt elke eventuele voorafgaande toelatingsakte voor dit product.

Toegekende punten voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage (in toepassing van het koninklijk besluit



van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten) : **4,4**.

Het product, voor zover het voldoet aan alle voorwaarden vastgesteld in deze toelatingsakte en haar bijlage, is toegelaten in toepassing van:

- de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;
- het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma :  
de toelating is slechts geldig voor zover de namen en adressen van elke invoerder van dit product voorafgaandelijk meegedeeld worden aan de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

## **BIJLAGE**

### **INDELING EN ETIKETTERING VAN HET PRODUCT**

Onverminderd de bepalingen inzake indeling en/of etikettering van :

- de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006;
- de Verordening (EU) nr. 547/2011 van de Commissie van 08 juni 2011 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen;
- het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik;

moeten de volgende vermeldingen op het etiket van het product vermeld worden:

#### **Indeling en etikettering in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Op het etiket te vermelden formuleringshulpstoffen (Art. 18, punt 3b van Verordening (EG) 1272/2008) :

- koolwaterstoffen, C9, aromaten (CAS : 128601-23-0)

Gevarenklassen en -categorieën :

- Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4
- Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2
- Huidsensibilisatie, Categorie 1
- Aspiratiegevaar, Categorie 1
- Gevaar voor het aquatisch milieu - Acuut gevaar, Categorie 1
- Gevaar voor het aquatisch milieu - Chronisch gevaar, Categorie 1

Signaalwoord :

- GEVAAR

GHS-codes en gevarenpictogrammen :

- GHS07 : Schadelijk 
- GHS08 : Gezondheidsschadelijk op lange termijn 
- GHS09 : Milieugevaarlijk 

Gevarenaanduidingen (H zinnen) :

- H302 : Schadelijk bij inslikken.



- H304 : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
- H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (P zinnen) :

- P261 : Inademing van damp en spuitnevel vermijden.
- P280 : Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming dragen.
- P301 + P330 + P331 + P310 : NA INSLIKKEN: De mond spoelen, GEEN braken opwekken en onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
- P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.
- P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
- P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.
- P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.

Aanvullende gevareninformatie (EUH zinnen) :

- EUH401 : Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

**Zinnen volgens Verordening (EG) nr. 1107/2009 of (EU) nr. 547/2011**

Standaardzinnen voor veiligheidsadviezen (SP zinnen) :

- SP1 : Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPa1 : Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 15.
- SPe3 : Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
- SPo : Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

**Andere voorwaarden/nationale zinnen**

- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging



van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn (en) te verkorten.

- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.
- Aanbevelingen voor het toepassen van tankmengsels worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder/vergunningshouder. Raadpleeg eveneens het etiket van de mengpartner(s).
- Om omstaanders en omwonenden te beschermen dient u een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen (zie risicobeperkende maatregelen).
- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.
- Om omstaanders en omwonenden te beschermen mag dit product niet toegepast worden aan een druk hoger dan 3 bar. Het product niet toepassen bij windsnelheden hoger dan 10 km/u. De rijsnelheid van het spuittoestel mag maximaal 10 km/u bedragen.



## GEBRUIKEN

De toepassingen waarvoor het product is toegelaten en de specifieke voorwaarden waaronder het product gebruikt mag worden :

### **knolselder (*Apium graveolens* var. *rapaceum*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste blad ontvouwen - 2 bladeren ontvouwen (BBCH 11-12)

Wachttijd voor de oogst: 80 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Opmerking(en):

- max. 3 l/ha/teelt
- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.

### **Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae* (annual))**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt)

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

### **Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae* (annual))**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt)

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

### **wintertarwe (*Triticum aestivum*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: ≤ BBCH 12 (2 bladeren ontvouwen)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90%



driftreducerende techniek.

- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Opmerking(en):

- Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.
- Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte.
- Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.
- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten wanneer nog te oogsten groenten, aromatische kruiden of fruit aanwezig zijn op aangrenzende percelen.
- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten in West-Vlaanderen met uitzondering van de landbouwstreek de Polders.

**Ter bestrijding van: duist (*Alopecurus myosuroides*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: het product enkel gebruiken in een behandelingsschema met herbiciden tegen duist die een andere werkingwijze hebben

**Ter bestrijding van: windhalm (*Apera spica-venti*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**wintergerst (*Hordeum vulgare*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium:  $\leq$  BBCH 12 (2 bladeren ontvouwen)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Opmerking(en):

- Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.
- Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte.
- Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.
- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten wanneer nog te oogsten groenten, aromatische kruiden of fruit aanwezig zijn op aangrenzende percelen.



- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten in West-Vlaanderen met uitzondering van de landbouwstreek de Polders.

**Ter bestrijding van: duist (*Alopecurus myosuroides*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: het product enkel gebruiken in een behandelingsschema met herbiciden tegen duist die een andere werkingwijze hebben

**Ter bestrijding van: windhalm (*Apera spica-venti*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**winterrogge (*Secale cereale*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium:  $\leq$  BBCH 12 (2 bladeren ontvouwen)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Opmerking(en):

- Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.
- Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte.
- Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.
- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten wanneer nog te oogsten groenten, aromatische kruiden of fruit aanwezig zijn op aangrenzende percelen.
- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten in West-Vlaanderen met uitzondering van de landbouwstreek de Polders.

**Ter bestrijding van: duist (*Alopecurus myosuroides*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: het product enkel gebruiken in een behandelingsschema met herbiciden tegen duist die een andere werkingwijze hebben



**Ter bestrijding van: windhalm (*Apera spica-venti*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**wintertriticale (*Triticosecale rimpau*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium:  $\leq$  BBCH 12 (2 bladeren ontvouwen)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Opmerking(en):

- Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.
- Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte.
- Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.
- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten wanneer nog te oogsten groenten, aromatische kruiden of fruit aanwezig zijn op aangrenzende percelen.
- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten in West-Vlaanderen met uitzondering van de landbouwstreek de Polders.

**Ter bestrijding van: duist (*Alopecurus myosuroides*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: het product enkel gebruiken in een behandelingsschema met herbiciden tegen duist die een andere werkingswijze hebben

**Ter bestrijding van: windhalm (*Apera spica-venti*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting



### winterspelt (*Triticum spelta*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium:  $\leq$  BBCH 12 (2 bladeren ontvouwen)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Opmerking(en):

- Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.
- Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte.
- Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.
- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten wanneer nog te oogsten groenten, aromatische kruiden of fruit aanwezig zijn op aangrenzende percelen.
- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten in West-Vlaanderen met uitzondering van de landbouwstreek de Polders.

#### **Ter bestrijding van: duist (*Alopecurus myosuroides*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: het product enkel gebruiken in een behandelingsschema met herbiciden tegen duist die een andere werkingwijze hebben

#### **Ter bestrijding van: windhalm (*Apera spica-venti*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

### aardappelen (*Solanum tuberosum*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.



- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Opmerking(en):

Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**wintertarwe (zaadproductie) (*Triticum aestivum*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: zaaizaadproductie

Toepassingsstadium: ≤ BBCH 12 (2 bladeren ontvouwen)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Opmerking(en):

- Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.
- Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte.
- Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.
- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten wanneer nog te oogsten groenten, aromatische kruiden of fruit aanwezig zijn op aangrenzende percelen.
- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten in West-Vlaanderen met uitzondering van de landbouwstreek de Polders.

**Ter bestrijding van: duist (*Alopecurus myosuroides*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: het product enkel gebruiken in een behandelingsschema met herbiciden tegen duist die een andere werkingwijze hebben



**Ter bestrijding van: windhalm (*Apera spica-venti*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**wintergerst (zaadproductie) (*Hordeum vulgare*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: zaaizaadproductie

Toepassingsstadium:  $\leq$  BBCH 12 (2 bladeren ontvouwen)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Opmerking(en):

- Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.
- Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte.
- Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.
- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten wanneer nog te oogsten groenten, aromatische kruiden of fruit aanwezig zijn op aangrenzende percelen.
- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten in West-Vlaanderen met uitzondering van de landbouwstreek de Polders.

**Ter bestrijding van: duist (*Alopecurus myosuroides*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: het product enkel gebruiken in een behandelingsschema met herbiciden tegen duist die een andere werkingswijze hebben

**Ter bestrijding van: windhalm (*Apera spica-venti*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting



**winterrogge (zaadproductie) (*Secale cereale*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: zaaizaadproductie

Toepassingsstadium:  $\leq$  BBCH 12 (2 bladeren ontvouwen)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Opmerking(en):

- Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.
- Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte.
- Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.
- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten wanneer nog te oogsten groenten, aromatische kruiden of fruit aanwezig zijn op aangrenzende percelen.
- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten in West-Vlaanderen met uitzondering van de landbouwstreek de Polders.

**Ter bestrijding van: duist (*Alopecurus myosuroides*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: het product enkel gebruiken in een behandelingsschema met herbiciden tegen duist die een andere werkingwijze hebben

**Ter bestrijding van: windhalm (*Apera spica-venti*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**wintertriticale (zaadproductie) (*Triticosecale rimpau*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: zaaizaadproductie

Toepassingsstadium:  $\leq$  BBCH 12 (2 bladeren ontvouwen)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90%



driftreducerende techniek.

- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Opmerking(en):

- Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.
- Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte.
- Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.
- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten wanneer nog te oogsten groenten, aromatische kruiden of fruit aanwezig zijn op aangrenzende percelen.
- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten in West-Vlaanderen met uitzondering van de landbouwstreek de Polders.

**Ter bestrijding van: duist (*Alopecurus myosuroides*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: het product enkel gebruiken in een behandelingsschema met herbiciden tegen duist die een andere werkingwijze hebben

**Ter bestrijding van: windhalm (*Apera spica-venti*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**winterspelt (zaadproductie) (*Triticum spelta*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: zaaizaadproductie

Toepassingsstadium:  $\leq$  BBCH 12 (2 bladeren ontvouwen)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Opmerking(en):

- Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.
- Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte.
- Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.
- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten wanneer nog te oogsten groenten, aromatische kruiden of fruit aanwezig zijn op aangrenzende percelen.



- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten in West-Vlaanderen met uitzondering van de landbouwstreek de Polders.

**Ter bestrijding van: duist (*Alopecurus myosuroides*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: het product enkel gebruiken in een behandelingsschema met herbiciden tegen duist die een andere werkingwijze hebben

**Ter bestrijding van: windhalm (*Apera spica-venti*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**aardappelpootgoedteelt (*Solanum tuberosum*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Opmerking(en):

Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting



## UITBREIDING VAN DE TOELATING VOOR KLEINE TOEPASSINGEN (in toepassing van Artikel 51 van Verordening (EG) nr. 1107/2009).

Voor deze uitbreidingen valt het gebruik van het product onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Omdat er slechts beperkte werkzaamheids- en fytotoxiciteitsgegevens werden geëvalueerd, wordt er aangeraden een test uit te voeren voordat het product wordt gebruikt.

### wortelen (*Daucus carota*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste blad ontvouwen - 2 bladeren ontvouwen (BBCH 11-12)

Wachtijd voor de oogst: 80 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Opmerking(en):

- max. 3 l/ha/teelt
- Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.
- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

### **Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

(mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt)

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

### **Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

(mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt)

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting



**pastinaak (*Pastinaca sativa*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 2 bladeren ontvouwen (BBCH 12)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 75 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Opmerking(en):

- Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.
- Deze bespuiting moet worden gezien als noodmaatregel welke enig risico voor opbrengstderving inhoudt.
- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 2,5 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 2,5 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**schorseneer (*Scorzonera hispanica*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 2 bladeren ontvouwen (BBCH 12)

Wachttijd voor de oogst: 80 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Opmerking(en):

- max. 3 l/ha/teelt
- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.



**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

(mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt)

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt)

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**mierikswortel (*Armoracia rusticana*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 2 bladeren ontvouwen

Wachttijd voor de oogst: 80 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

- max. 3 l/ha/teelt
- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha



Aantal toepassingen: 1  
Toepassingstechniek: bespuiting

**mierikswortel (*Armoracia rusticana*)**

Locatie van de behandeling: open lucht  
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst  
Wachttijd voor de oogst: 80 dag(en)  
Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

- max. 3 l/ha/teelt
- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**knoflook (*Allium sativum*)**

Locatie van de behandeling: open lucht  
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: na opkomst  
Wachttijd voor de oogst: 75 dag(en)  
Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.



- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Opmerking(en):

- max. 3 l/ha/12 maanden
- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha gefractioneerd; in fracties van 1-3 l/ha met een interval van minstens 5 dagen, beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha gefractioneerd; in fracties van 1-3 l/ha met een interval van minstens 5 dagen, beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Toepassingstechniek: bespuiting

**uien (drooggeogoste) (*Allium cepa*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: na opkomst

Wachttijd voor de oogst: 75 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Opmerking(en):

- max. 3 l/ha/12 maanden
- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha gefractioneerd; in fracties van 1-3 l/ha met een interval van minstens 5 dagen, beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha gefractioneerd; in fracties van 1-3 l/ha met een interval van minstens 5 dagen, beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha



Toepassingstechniek: bespuiting

**bosuien (lente-ui) (*Allium fistulosum*/*A. cepa*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: na opkomst

Wachttijd voor de oogst: 70 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Opmerking(en):

- max. 3 l/ha/12 maanden
- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae* (annual))**

Dosis: 3 l/ha gefractioneerd; in fracties van 1-3 l/ha met een interval van minstens 5 dagen, beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae* (annual))**

Dosis: 3 l/ha gefractioneerd; in fracties van 1-3 l/ha met een interval van minstens 5 dagen, beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Toepassingstechniek: bespuiting

**sjalot (*Allium cepa* *Aggregatum* types)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: na opkomst

Wachttijd voor de oogst: 75 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Opmerking(en):

- max. 3 l/ha/12 maanden
- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart



- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha gefractioneerd; in fracties van 1-3 l/ha met een interval van minstens 5 dagen, beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha gefractioneerd; in fracties van 1-3 l/ha met een interval van minstens 5 dagen, beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Toepassingstechniek: bespuiting

**vicia-bonen (paarden-, duiven, tuin-,...) (drooggeogst) (*Vicia faba*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Opmerking(en):

- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting



**soja (drooggeoogst) (*Glycine max*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Opmerking(en):

- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**selderij (bleek-, groene en witte) (*Apium graveolens* var. *dulce*/*Apium graveolens*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste blad ontvouwen - 2 bladeren ontvouwen (BBCH 11-12)

Wachttijd voor de oogst: 70 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Opmerking(en):

- max. 3 l/ha/teelt
- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.



**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**prei (*Allium porrum*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: productieveld

Toepassingsstadium: 7-14 dagen na het planten

Wachttijd voor de oogst: 70 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Opmerking(en):

- max. 3 l/ha/teelt
- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

(mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt)

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

(mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt)

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting



**bieslook (consumptie bladeren) (*Allium schoenoprasum*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 75 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**dille (consumptie bladeren) (*Anethum graveolens*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 75 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.



Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**grote engelwortel (consumptie bladeren) (*Angelica archangelica*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 75 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting



**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**kervel (consumptie bladeren) (*Anthriscus cerefolium*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 75 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**snijselder (consumptie bladeren) (*Apium graveolens var. secalinum*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt



Wachttijd voor de oogst: 75 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**karwij (consumptie bladeren) (*Carum carvi*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 75 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.



**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**koriander (consumptie bladeren) (*Coriandrum sativum*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 75 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting



**lavas / maggiplant (consumptie bladeren) (*Levisticum officinale*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 75 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**roomse kervel (consumptie bladeren) (*Myrrhis odorata*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 75 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.



Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**peterselie (consumptie bladeren) (*Petroselinum crispum*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 75 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting



**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**wortelpeterselie en wortelkervel (consumptie wortels) (*Petroselinum crispum var. tuberosum & Chaerophyllum bulbosum*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 2 bladeren ontvouwen

Wachttijd voor de oogst: 80 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

- max. 3 l/ha/teelt
- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**wortelpeterselie en wortelkervel (consumptie wortels) (*Petroselinum crispum var. tuberosum & Chaerophyllum bulbosum*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst



Wachttijd voor de oogst: 80 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

- max. 3 l/ha/teelt
- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**dragon (consumptie bladeren) (*Artemisia dracunculus*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 75 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet



toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**hysop (consumptie bladeren) (*Hyssopus officinalis*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 75 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting



**citroenmelisse (consumptie bladeren) (*Melissa officinalis*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 75 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**munst (consumptie bladeren) (*Mentha sp.*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 75 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.



Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**basilicum (consumptie bladeren) (*Ocimum basilicum*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 75 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting



**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**marjolein / oregano (consumptie bladeren) (*Origanum majorana*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 75 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**salie (consumptie bladeren) (*Salvia officinalis*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt



Wachttijd voor de oogst: 75 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**bonenkruid (consumptie bladeren) (*Satureja hortensis*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 75 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.



**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**tijm (consumptie bladeren) (*Thymus sp.*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 75 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting



**rozemarijn (consumptie bladeren) (*Salvia rosmarinus*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 75 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**laurier (consumptie bladeren) (*Laurus nobilis*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 75 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.



Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**goudsbloem (niet voor consumptie) (*Calendula officinalis*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting



**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**eetbare bloemen (*Edible flowers*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 75 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Opmerking(en):

- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 2,5 - 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**lupine (*Lupinus sp.*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt



Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.
- Minimum 90% driftreductie door gebruik van anti-drift materiaal.

Opmerking(en):

- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart
- De toepassing met rugspuit en handgedragen drukspuit met spuitlans, of met lansspuit is niet toegelaten, omdat gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn bij deze toepassingswijze.

**Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 3 l/ha; beperking van het watervolume/ha tot 200-400l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

## VERPAKKINGEN

Dit product mag alleen op de markt worden gebracht in de volgende verpakkingen :

|               |             |                    |             |
|---------------|-------------|--------------------|-------------|
| <b>Type :</b> | <b>fles</b> | <b>Materiaal :</b> | <b>HDPE</b> |
|---------------|-------------|--------------------|-------------|

---

|                 |            |                 |            |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| <u>Volume :</u> | <b>1 l</b> | <u>Inhoud :</u> | <b>1 l</b> |
|-----------------|------------|-----------------|------------|

De verpakking kan een CTS sluitsysteem bevatten.

|               |                 |                    |               |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|
| <b>Type :</b> | <b>jerrycan</b> | <b>Materiaal :</b> | <b>f-HDPE</b> |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|

---

|                 |            |                 |            |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| <u>Volume :</u> | <b>3 l</b> | <u>Inhoud :</u> | <b>3 l</b> |
|-----------------|------------|-----------------|------------|

De verpakking kan een CTS sluitsysteem bevatten.

|                 |            |                 |            |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| <u>Volume :</u> | <b>5 l</b> | <u>Inhoud :</u> | <b>5 l</b> |
|-----------------|------------|-----------------|------------|

De verpakking kan een CTS sluitsysteem bevatten.

|                 |              |                 |              |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| <u>Volume :</u> | <b>7,5 l</b> | <u>Inhoud :</u> | <b>7,5 l</b> |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|

|                 |             |                 |             |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| <u>Volume :</u> | <b>10 l</b> | <u>Inhoud :</u> | <b>10 l</b> |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|

De verpakking kan een CTS sluitsysteem bevatten.

|                 |             |                 |             |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| <u>Volume :</u> | <b>20 l</b> | <u>Inhoud :</u> | <b>20 l</b> |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|

|               |             |                    |                |
|---------------|-------------|--------------------|----------------|
| <b>Type :</b> | <b>fles</b> | <b>Materiaal :</b> | <b>HDPE/PA</b> |
|---------------|-------------|--------------------|----------------|

---

|                 |            |                 |            |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| <u>Volume :</u> | <b>1 l</b> | <u>Inhoud :</u> | <b>1 l</b> |
|-----------------|------------|-----------------|------------|

De verpakking kan een CTS sluitsysteem bevatten.

|               |             |                    |                  |
|---------------|-------------|--------------------|------------------|
| <b>Type :</b> | <b>fles</b> | <b>Materiaal :</b> | <b>HDPE/EVOH</b> |
|---------------|-------------|--------------------|------------------|

---

|                 |            |                 |            |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| <u>Volume :</u> | <b>1 l</b> | <u>Inhoud :</u> | <b>1 l</b> |
|-----------------|------------|-----------------|------------|

De verpakking kan een CTS sluitsysteem bevatten.

|               |             |                    |               |
|---------------|-------------|--------------------|---------------|
| <b>Type :</b> | <b>fles</b> | <b>Materiaal :</b> | <b>f-HDPE</b> |
|---------------|-------------|--------------------|---------------|

---

|                 |            |                 |            |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| <u>Volume :</u> | <b>1 l</b> | <u>Inhoud :</u> | <b>1 l</b> |
|-----------------|------------|-----------------|------------|

De verpakking kan een CTS sluitsysteem bevatten.

|               |                 |                    |             |
|---------------|-----------------|--------------------|-------------|
| <b>Type :</b> | <b>jerrycan</b> | <b>Materiaal :</b> | <b>HDPE</b> |
|---------------|-----------------|--------------------|-------------|

---

|                 |            |                 |            |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| <u>Volume :</u> | <b>3 l</b> | <u>Inhoud :</u> | <b>3 l</b> |
|-----------------|------------|-----------------|------------|

De verpakking kan een CTS sluitsysteem bevatten.

|                 |            |                 |            |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| <u>Volume :</u> | <b>5 l</b> | <u>Inhoud :</u> | <b>5 l</b> |
|-----------------|------------|-----------------|------------|

De verpakking kan een CTS sluitsysteem bevatten.

|                 |              |                 |              |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| <u>Volume :</u> | <b>7,5 l</b> | <u>Inhoud :</u> | <b>7,5 l</b> |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|

|                 |             |                 |             |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| <u>Volume :</u> | <b>10 l</b> | <u>Inhoud :</u> | <b>10 l</b> |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|

De verpakking kan een CTS sluitsysteem bevatten.

|                 |             |                 |             |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| <u>Volume :</u> | <b>20 l</b> | <u>Inhoud :</u> | <b>20 l</b> |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|

|               |                 |                    |                |
|---------------|-----------------|--------------------|----------------|
| <b>Type :</b> | <b>jerrycan</b> | <b>Materiaal :</b> | <b>HDPE/PA</b> |
|---------------|-----------------|--------------------|----------------|

---

|                 |            |                 |            |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| <u>Volume :</u> | <b>3 l</b> | <u>Inhoud :</u> | <b>3 l</b> |
|-----------------|------------|-----------------|------------|

De verpakking kan een CTS sluitsysteem bevatten.

|                 |            |                 |            |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| <u>Volume :</u> | <b>5 l</b> | <u>Inhoud :</u> | <b>5 l</b> |
|-----------------|------------|-----------------|------------|

De verpakking kan een CTS sluitsysteem bevatten.

|                 |              |                 |              |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| <u>Volume :</u> | <b>7,5 l</b> | <u>Inhoud :</u> | <b>7,5 l</b> |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|

|                 |             |                 |             |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| <u>Volume :</u> | <b>10 l</b> | <u>Inhoud :</u> | <b>10 l</b> |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|

De verpakking kan een CTS sluitsysteem bevatten.

|               |                 |                    |                  |
|---------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>Type :</b> | <b>jerrycan</b> | <b>Materiaal :</b> | <b>HDPE/EVOH</b> |
|---------------|-----------------|--------------------|------------------|

---

|                 |            |                 |            |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| <u>Volume :</u> | <b>3 l</b> | <u>Inhoud :</u> | <b>3 l</b> |
|-----------------|------------|-----------------|------------|

De verpakking kan een CTS sluitsysteem bevatten.



|                                                  |              |                 |              |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| <u>Volume :</u>                                  | <b>5 l</b>   | <u>Inhoud :</u> | <b>5 l</b>   |
| De verpakking kan een CTS sluitsysteem bevatten. |              |                 |              |
| <u>Volume :</u>                                  | <b>7,5 l</b> | <u>Inhoud :</u> | <b>7,5 l</b> |
| <u>Volume :</u>                                  | <b>10 l</b>  | <u>Inhoud :</u> | <b>10 l</b>  |
| De verpakking kan een CTS sluitsysteem bevatten. |              |                 |              |

## OMSCHRIJVING VAN DE TEELTEN

- wortelen (*Daucus carota*) : alle variëteiten
- pastinaak (*Pastinaca sativa*) : alle variëteiten
- knolselder (*Apium graveolens var. rapaceum*) : alle variëteiten
- schorseneer (*Scorzonera hispanica*) : alle variëteiten
- mierikswortel (*Armoracia rusticana*) : alle variëteiten
- knoflook (*Allium sativum*) : alle variëteiten
- uien (drooggeogste) (*Allium cepa*) : alle variëteiten, zowel gezaaid als geplant, die rijp geoogst worden
- bosuien (lente-ui) (*Allium fistulosum* / *A. cepa*) : jong geoogste uien, alle variëteiten
- sjalot (*Allium cepa Aggregatum types*) : alle variëteiten
- vicia-bonen (paarden-, duiven, tuin-,...) (drooggeogst) (*Vicia faba*) : alle variëteiten, drooggeogst, voornamelijk voor dierlijke consumptie
- soja (drooggeogst) (*Glycine max*) : alle variëteiten waarvan de zaden drooggeogst worden
- selderij (bleek-, groene en witte) (*Apium graveolens var. dulce* / *Apium graveolens*) : alle variëteiten
- prei (*Allium porrum*) : Alle variëteiten. Let op: Het aantal toepassingen wordt uitgedrukt als een aantal per teelt. Dit moet beschouwd worden als het aantal toepassingen die één preiplant mag ontvangen, ongeacht de plaats waar dit plantje staat. Dus zaai- en productieveld worden beschouwd als één teelt.
- bieslook (consumptie bladeren) (*Allium schoenoprasum*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten
- dille (consumptie bladeren) (*Anethum graveolens*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten
- grote engelwortel (consumptie bladeren) (*Angelica archangelica*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten
- kervel (consumptie bladeren) (*Anthriscus cerefolium*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten
- snijselder (consumptie bladeren) (*Apium graveolens var. secalinum*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten
- karwij (consumptie bladeren) (*Carum carvi*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten
- koriander (consumptie bladeren) (*Coriandrum sativum*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten
- lavas / maggiplant (consumptie bladeren) (*Levisticum officinale*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten
- roomse kervel (consumptie bladeren) (*Myrrhis odorata*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten
- peterselie (consumptie bladeren) (*Petroselinum crispum*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten



wortelpeterselie en wortelkervel (consumptie wortels) (*Petroselinum crispum* var. *tuberosum* & *Chaerophyllum bulbosum*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

dragon (consumptie bladeren) (*Artemisia dracunculus*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

hysop (consumptie bladeren) (*Hyssopus officinalis*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

citroenmelisse (consumptie bladeren) (*Melissa officinalis*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

munt (consumptie bladeren) (*Mentha* sp.) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

basilicum (consumptie bladeren) (*Ocimum basilicum*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

marjolein / oregano (consumptie bladeren) (*Origanum majorana*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

salie (consumptie bladeren) (*Salvia officinalis*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

bonenkruid (consumptie bladeren) (*Satureja hortensis*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

tijm (consumptie bladeren) (*Thymus* sp.) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

rozemarijn (consumptie bladeren) (*Salvia rosmarinus*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

laurier (consumptie bladeren) (*Laurus nobilis*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

goudsbloem (niet voor consumptie) (*Calendula officinalis*) : Aromatische of medicinale plant, alle variëteiten, geteeld voor industriële doeleinden (bv. oliewinning). De planten mogen na de behandeling niet als diervoeder of levensmiddel worden gebruikt.

eetbare bloemen (*Edible flowers*) : aromatische of medicinale plant, alle soorten en variëteiten, consumptie van versgeogste bloemen

wintertarwe (*Triticum aestivum*) : alle variëteiten

wintergerst (*Hordeum vulgare*) : alle variëteiten

winterrogge (*Secale cereale*) : alle variëteiten

wintertriticale (*Triticosecale rimpaui*) : alle variëteiten

winterspelt (*Triticum spelta*) : alle variëteiten

aardappelen (*Solanum tuberosum*) : behandeling van de teelt vanaf het planten tot aan de oogst van de aardappelen (primeur- en bewaaraardappelen)

lupine (*Lupinus* sp.) : alle variëteiten

wintertarwe (zaadproductie) (*Triticum aestivum*) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten

wintergerst (zaadproductie) (*Hordeum vulgare*) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten

winterrogge (zaadproductie) (*Secale cereale*) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten



wintertriticale (zaadproductie) (*Triticosecale rimpaui*) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten

winterspelt (zaadproductie) (*Triticum spelta*) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten

aardappelpootgoedteelt (*Solanum tuberosum*) : Aardappelen die gekweekt worden om als pootgoed te gebruiken, alle variëteiten. Bovenmaats pootgoed mag verkocht worden voor consumptie.