



Dossiernummer: 22343

Datum: 05/10/2021

## TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL

**Betreft: Migratie**

Handelsbenaming:

**THIOVIT JET**

Toelatingsnummer:

**5700P/B**

Gebruikerscategorie: uitsluitend bestemd voor **PROFESSIONEEL** gebruik

Toelatingshouder:

**Syngenta Crop Protection**

Naamloze vennootschap

Louizalaan 489

1050 Brussel

BELGIË

Aard van het middel: **Fungicide**

Formuleringstype: **WG (Water dispergeerbaar granulaat)**

Gewaarborgde gehalten van de werkzame stoffen, synergisten en beschermstoffen:

- **zwavel: 800 g/kg (werkzame stof)**

Deze toelating is geldig van **05/10/2021** tot en met **31/12/2022** en vervangt elke voorafgaande toelatingsakte voor dit product.

De bijzondere voorwaarden voor de verlenging zijn de volgende: **evaluatie van de aanvraag tot hererkenning**.

Toegekende punten voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage in toepassing van het koninklijk besluit van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor

de grondstoffen en de producten: **1.**

Het product, voor zover het voldoet aan alle voorwaarden vastgesteld in deze toelatingsakte en haar bijlage, is toegelaten in toepassing van:

- de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21/10/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;
- het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:

De toelating is slechts geldig voor zover de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden aan de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

Dossierbeheerder: Bram Vancompernelle  
E-mail: [bram.vancompernelle@health.fgov.be](mailto:bram.vancompernelle@health.fgov.be)  
Tel: 02 524 73 88  
Fax: /  
Site: [www.fytoweb.be](http://www.fytoweb.be)

## BIJLAGE

### INDELING EN ETIKETTERING VAN HET PRODUCT

Onverminderd de bepalingen inzake indeling en/of etikettering van:

- de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006;
- de Verordening (EU) Nr. 547/2011 van de Commissie van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen;
- Het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik;

moeten de volgende vermeldingen op het etiket van het product vermeld worden:

#### Indeling en etikettering in overeenstemming met Verordening (EG) nr 1272/2008

Gevaarenklassen en -categorieën:

- Niet van toepassing

Signaalwoord :

- Niet van toepassing

GHS-codes en gevarenpictogrammen :

Niet van toepassing

Gevarenaanduidingen (H zinnen):

- Niet van toepassing

Veiligheidsaanbevelingen (P zinnen):

- P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Aanvullende gevareninformatie (EUH zinnen) :

- EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
- EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

#### Zinnen volgens Verordening (EG) nr. 1107/2009 of (EU) nr. 547/2011

Standaardzinnen voor veiligheidsadviezen (SP zinnen):

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC code voor het



- werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is M02.
- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
  - SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

#### **Andere voorwaarden/nationale zinnen**

- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn (en) te verkorten.
- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

## GEBRUIKEN

De toepassingen waarvoor het product is toegelaten en de specifieke voorwaarden waaronder het product gebruikt mag worden:

### **appelbomen (*Malus domestica*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 10 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 3 m ten opzichte van oppervlaktewater

#### **Ter bestrijding van: schurft (*Venturia inaequalis*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 3 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 10

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

#### **Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Podosphaera leucotricha*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 3 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 10

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

### **perenbomen (*Pyrus communis*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 10 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 3 m ten opzichte van oppervlaktewater

#### **Ter bestrijding van: schurft (*Venturia pirina*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 3 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 10

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Podosphaera leucotricha*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 3 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 10

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**kersen- en kriekenbomen (*Prunus avium et P. cerasus*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 3 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: hagelschotziekte (*Stigmina carpophila (Coryneum beijerinckii)*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 6,25 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 28 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Podosphaera clandestina*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 6,25 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 28 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**pruimenbomen (*Prunus domestica subsp. domestica*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 3 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: hagelschotziekte (*Stigmina carpophila (Coryneum beijerinckii)*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 6,25 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 28 dag(en)



Toepassingstechniek: Bespuiting

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Podosphaera clandestina*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 6,25 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 28 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**druivelaars (voor wijnproductie) (*Vitis vinifera*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: < BBCH 61 (begin bloei: 10% van kelkbladeren afgeworpen)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 3 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Uncinula necator*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 6 - 8 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Bespuiting

**druivelaars (voor wijnproductie) (*Vitis vinifera*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: > BBCH 69 (einde bloei)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 3 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Uncinula necator*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 3 - 5 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Bespuiting

**druivelaars (tafeldruiven) (*Vitis vinifera*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming  
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: > BBCH 69 (einde bloei)  
Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/12 maanden  
Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Uncinula necator*)**

Toepassingsstadium: preventief  
Dosis: 0,3 - 0,5 kg/100 l  
Aantal toepassingen: 1  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**druivelaars (tafeldruiven) (*Vitis vinifera*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming  
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: < BBCH 61 (begin bloei: 10% van kelkbladeren afgeworpen)  
Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/12 maanden  
Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Uncinula necator*)**

Toepassingsstadium: preventief  
Dosis: 0,6 - 0,8 kg/100 l  
Aantal toepassingen: 1  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**druivelaars (tafeldruiven) (*Vitis vinifera*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: > BBCH 69 (einde bloei)  
Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/12 maanden  
Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 3 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Uncinula necator*)**

Toepassingsstadium: preventief  
Dosis: 3 - 5 kg/ha haag





Aantal toepassingen: 1  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**druivelaars (tafeldruiven) (*Vitis vinifera*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: < BBCH 61 (begin bloei: 10% van kelkbladeren afgeworpen)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 3 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Uncinula necator*)**

Toepassingsstadium: preventief  
Dosis: 6 - 8 kg/ha haag  
Aantal toepassingen: 1  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**aardbeien (*Fragaria x ananassa*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming  
Gewastype: productieveld

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Podosphaera aphanis*)**

Toepassingsstadium: preventief  
Dosis: 5 kg/ha  
Aantal toepassingen: 1 tot 4  
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 10 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**aardbeien (*Fragaria x ananassa*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming  
Gewastype: selectie- en vermeerderingsveld

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Podosphaera aphanis*)**

Toepassingsstadium: preventief



Dosis: 5 kg/ha  
Aantal toepassingen: 1 tot 4  
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 10 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**aardbeien (*Fragaria x ananassa*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: productieveld

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt  
Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Podosphaera aphanis*)**

Toepassingsstadium: preventief  
Dosis: 5 kg/ha  
Aantal toepassingen: 1 tot 4  
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 10 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**aardbeien (*Fragaria x ananassa*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: selectie- en vermeerderingsveld

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt  
Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Podosphaera aphanis*)**

Toepassingsstadium: preventief  
Dosis: 5 kg/ha  
Aantal toepassingen: 1 tot 4  
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 10 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**braamstruiken (*Rubus fruticosus*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/12 maanden  
Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Podosphaera aphanis*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 3 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**braamstruiken (*Rubus fruticosus*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 3 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Podosphaera aphanis*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 3 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**frambozenstruiken (*Rubus idaeus*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Podosphaera aphanis*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 3 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**frambozenstruiken (*Rubus idaeus*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/12 maanden



Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 3 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Podosphaera aphanis*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 3 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**blauwe / rode bosbessen (*Vaccinium myrtillus & V. corymbosum*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Sphaerotheca mors-uvae*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 3 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**blauwe / rode bosbessen (*Vaccinium myrtillus & V. corymbosum*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 3 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Sphaerotheca mors-uvae*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 3 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**veenbessen (*Vaccinium vitis-idaea* & *V. macrocarpon*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Sphaerotheca mors-uvae*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 3 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**veenbessen (*Vaccinium vitis-idaea* & *V. macrocarpon*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 3 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Sphaerotheca mors-uvae*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 3 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**aalbessen (witte, rode, zwarte) (*Ribes spp.*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Sphaerotheca mors-uvae*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 3 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 4



Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**aalbessen (witte, rode, zwarte) (*Ribes spp.*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 3 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Sphaerotheca mors-uvae*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 3 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**stekelbes (kruisbes) en kruisingen (*Ribes uva-crispa*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Sphaerotheca mors-uvae*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 3 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**stekelbes (kruisbes) en kruisingen (*Ribes uva-crispa*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 3 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Sphaerotheca mors-uvae*)**

Toepassingsstadium: preventief



Dosis: 3 kg/ha haag  
Aantal toepassingen: 1 tot 4  
Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**rode biet (kroten) (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt  
Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe betae, E. polygoni*)**

Toepassingsstadium: preventief  
Dosis: 5 kg/ha  
Aantal toepassingen: 1 tot 4  
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**wortelen (*Daucus carota*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt  
Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)**

Toepassingsstadium: preventief  
Dosis: 5 kg/ha  
Aantal toepassingen: 1 tot 4  
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**pastinaak (*Pastinaca sativa*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt  
Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**radijs (*Raphanus sativus var. radicola*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Golovinomyces cichoracearum*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**radijs (*Raphanus sativus var. radicola*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Golovinomyces cichoracearum*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**rammenas en rettich (*Raphanus sativus var. niger*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt





Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Golovinomyces cichoracearum*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**rammenas en rettich (*Raphanus sativus var. niger*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Golovinomyces cichoracearum*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**schorseneren (*Scorzonera hispanica*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Golovinomyces cichoracearum*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**koolraap (*Brassica napus subsp. rapifera*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**raap (stoppelraap, meiraap) (*Brassica rapa subsp. rapa*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**mierikswortel (*Armoracia rusticana*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**aardpeer (*Helianthus tuberosus*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Golovinomyces cichoracearum*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**tomaten (*Solanum lycopersicum*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 6 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Leveillula taurica*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 6

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**paprika/Spaanse peper (*Capsicum annuum*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 6 toepassing(en)/teelt



Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Leveillula taurica*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 6

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**aubergine/ierplant en pepino (*Solanum melongena* - *Solanum muricatum*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 6 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Leveillula taurica*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 6

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**komkommer (*Cucumis sativus*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 6 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Golovinomyces orontii*, *Erysiphe polyphaga*, *E. orontii*, *Sphaerotheca fuliginea*, *Podosphaera xanthii*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 6

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**augurk (*Cucumis sativus*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 6 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Golovinomyces orontii*, *Erysiphe polyphaga*, *E. orontii*, *Sphaerotheca fuliginea*, *Podosphaera xanthii*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha haag

Andere uitdrukking: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 6

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**augurk (*Cucumis sativus*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 6 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Golovinomyces orontii*, *Erysiphe polyphaga*, *E. orontii*, *Sphaerotheca fuliginea*, *Podosphaera xanthii*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha haag

Andere uitdrukking: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 6

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**courgette/patisson (*Cucurbita pepo*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 6 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater



**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Golovinomyces orontii*, *Erysiphe polyphaga*, *E. orontii*, *Sphaerotheca fuliginea*, *Podosphaera xanthii*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha haag

Andere uitdrukking: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 6

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

### **courgette/patisson (*Cucurbita pepo*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 6 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Golovinomyces orontii*, *Erysiphe polyphaga*, *E. orontii*, *Sphaerotheca fuliginea*, *Podosphaera xanthii*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 6

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

### **meloen (*Cucumis melo*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 6 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Golovinomyces orontii*, *Erysiphe polyphaga*, *E. orontii*, *Sphaerotheca fuliginea*, *Podosphaera xanthii*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha haag

Andere uitdrukking: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 6

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting



**pompoen (*Cucurbita maxima* & *C. moschata*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 6 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Golovinomyces orontii*, *Erysiphe polyphaga*, *E. orontii*, *Sphaerotheca fuliginea*, *Podosphaera xanthii*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 6

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**pompoen (*Cucurbita maxima* & *C. moschata*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 6 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Golovinomyces orontii*, *Erysiphe polyphaga*, *E. orontii*, *Sphaerotheca fuliginea*, *Podosphaera xanthii*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 6

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**broccoli (*Brassica oleracea* var. *botrytis* subvar. *cymosa*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*)**

Toepassingsstadium: preventief



Dosis: 5 kg/ha  
Aantal toepassingen: 1 tot 4  
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**broccoli (*Brassica oleracea* var. *botrytis* subvar. *cymosa*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt  
Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*)**

Toepassingsstadium: preventief  
Dosis: 5 kg/ha  
Aantal toepassingen: 1 tot 4  
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**bloemkool (witte en groene) (*Brassica oleracea* var. *botrytis* subvar. *cauliflora*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt  
Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*)**

Toepassingsstadium: preventief  
Dosis: 5 kg/ha  
Aantal toepassingen: 1 tot 4  
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**bloemkool (witte en groene) (*Brassica oleracea* var. *botrytis* subvar. *cauliflora*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt  
Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater



**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**spruitkool (*Brassica oleracea var. gemmifera*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**spruitkool (*Brassica oleracea var. gemmifera*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (*Brassica oleracea var. capitata*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt



Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (*Brassica oleracea var. capitata*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**Chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna (*Brassica rapa chinensis* & *B. rapa pekinensis*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting



**Chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna (*Brassica rapa chinensis* & *B. rapa pekinensis*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**boerenkool (krulkool, palmboerenkool) (*Brassica oleracea* var. *sabellica*; *Brassica oleracea* var. *palmifolia*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**boerenkool (krulkool, palmboerenkool) (*Brassica oleracea* var. *sabellica*; *Brassica oleracea* var. *palmifolia*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*)**

Toepassingsstadium: preventief



Dosis: 5 kg/ha  
Aantal toepassingen: 1 tot 4  
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**koolrabi (koolraap-boven-de-grond) (*Brassica oleracea* var. *gongylodes*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt  
Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*)**

Toepassingsstadium: preventief  
Dosis: 5 kg/ha  
Aantal toepassingen: 1 tot 4  
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**koolrabi (koolraap-boven-de-grond) (*Brassica oleracea* var. *gongylodes*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt  
Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*)**

Toepassingsstadium: preventief  
Dosis: 5 kg/ha  
Aantal toepassingen: 1 tot 4  
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**tuinkers en andere kiemen en scheuten (*Lepidium sativum*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt  
Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):



- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**tuinkers en andere kiemen en scheuten (*Lepidium sativum*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**veldsla (*Valerianella locusta*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Golovinomyces orontii*, *Erysiphe polyphaga*, *E. orontii*, *Sphaerotheca fuliginea*, *Podosphaera xanthii*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**veldsla (*Valerianella locusta*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Golovinomyces orontii*, *Erysiphe polyphaga*, *E. orontii*, *Sphaerotheca fuliginea*, *Podosphaera xanthii*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**slasoorten (*Lactuca sp.*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Golovinomyces cichoracearum*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**slasoorten (*Lactuca sp.*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Golovinomyces cichoracearum*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha



Aantal toepassingen: 1 tot 4  
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**andijvie, radicchio rosso, suikerbrood (*Cichorium endivia var latifolia et crispum*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt  
Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Golovinomyces cichoracearum*)**

Toepassingsstadium: preventief  
Dosis: 5 kg/ha  
Aantal toepassingen: 1 tot 4  
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**andijvie, radicchio rosso, suikerbrood (*Cichorium endivia var latifolia et crispum*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt  
Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Golovinomyces cichoracearum*)**

Toepassingsstadium: preventief  
Dosis: 5 kg/ha  
Aantal toepassingen: 1 tot 4  
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**waterkers (*Nasturtium officinale*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt  
Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele



planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**waterkers (*Nasturtium officinale*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**witloofwortelteelt (*Cichorium intybus var. foliosum*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Golovinomyces cichoracearum*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting





**stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul) (*Phaseolus vulgaris*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe pisi*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Andere uitdrukking: 5 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul) (*Phaseolus vulgaris*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe pisi*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Andere uitdrukking: 5 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**drooggeoogste erwten (zonder peul) (*Pisum sativum*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe pisi*)**

Toepassingsstadium: preventief



Dosis: 5 kg/ha  
Aantal toepassingen: 1 tot 4  
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**groengeoogste erwten (zonder peul) (*Pisum sativum*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt  
Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe pisi*)**

Toepassingsstadium: preventief  
Dosis: 5 kg/ha  
Aantal toepassingen: 1 tot 4  
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**groengeoogste erwten (met peul) (*Pisum sativum*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt  
Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe pisi*)**

Toepassingsstadium: preventief  
Dosis: 5 kg/ha haag  
Aantal toepassingen: 1 tot 4  
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**groengeoogste erwten (met peul) (*Pisum sativum*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt  
Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe pisi*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**vicia-bonen (paarden-, duiven, tuin-,...) (drooggeogst) (*Vicia faba*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe pisi*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (groengeogst, zonder peul) (*Vicia faba*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe pisi*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**dille (consumptie bladeren) (*Anethum graveolens*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt



Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**dille (consumptie bladeren) (*Anethum graveolens*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**kervel (consumptie bladeren) (*Anthriscus cerefolium*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.



**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**kervel (consumptie bladeren) (*Anthriscus cerefolium*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**snijelder (consumptie bladeren) (*Apium graveolens var. secalinum*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**snijselder (consumptie bladeren) (*Apium graveolens var. secalinum*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**koriander (consumptie bladeren) (*Coriandrum sativum*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**koriander (consumptie bladeren) (*Coriandrum sativum*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:



- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**lavas, maggiplant (consumptie bladeren) (*Levisticum officinale*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**lavas, maggiplant (consumptie bladeren) (*Levisticum officinale*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)**

Toepassingsstadium: preventief



Dosis: 5 kg/ha  
Aantal toepassingen: 1 tot 4  
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**peterselie (consumptie bladeren) (*Petroselinum crispum*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt  
Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)**

Toepassingsstadium: preventief  
Dosis: 5 kg/ha  
Aantal toepassingen: 1 tot 4  
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**peterselie (consumptie bladeren) (*Petroselinum crispum*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt  
Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)**

Toepassingsstadium: preventief  
Dosis: 5 kg/ha  
Aantal toepassingen: 1 tot 4  
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting



**wortelpeterselie en wortelkervel (consumptie wortels) (*Petroselinum crispum var. tuberosum* & *Chaerophyllum bulbosum*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**wortelpeterselie en wortelkervel (consumptie wortels) (*Petroselinum crispum var. tuberosum* & *Chaerophyllum bulbosum*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**dragon (consumptie bladeren) (*Artemisia dracunculus*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**dragon (consumptie bladeren) (*Artemisia dracunculus*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**winterkers, barbarakruid (consumptie bladeren) (*Barbarea sp.*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:



- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**winterkers, barbarakruid (consumptie bladeren) (*Barbarea sp.*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**rode amsoi (consumptie bladeren) (*Brassica juncea*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*)**

Toepassingsstadium: preventief



Dosis: 5 kg/ha  
Aantal toepassingen: 1 tot 4  
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**rode amsoi (consumptie bladeren) (*Brassica juncea*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*)**

Toepassingsstadium: preventief  
Dosis: 5 kg/ha  
Aantal toepassingen: 1 tot 4  
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**rucola (*Eruca sativa/Diplotaxis spp.*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*)**

Toepassingsstadium: preventief  
Dosis: 5 kg/ha  
Aantal toepassingen: 1 tot 4  
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**rucola (*Eruca sativa/Diplotaxis spp.*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**munten (consumptie bladeren) (*Mentha sp.*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**munten (consumptie bladeren) (*Mentha sp.*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:



- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**salie (consumptie bladeren) (*Salvia officinalis*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**salie (consumptie bladeren) (*Salvia officinalis*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)**

Toepassingsstadium: preventief



Dosis: 5 kg/ha  
Aantal toepassingen: 1 tot 4  
Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**wintertarwe (*Triticum aestivum* (winter))**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe graminis*)**

Toepassingsstadium: preventief  
Dosis: 5 kg/ha  
Aantal toepassingen: 1 tot 2  
Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**zomertarwe (*Triticum aestivum* (spring))**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe graminis*)**

Toepassingsstadium: preventief  
Dosis: 5 kg/ha  
Aantal toepassingen: 1 tot 2  
Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**wintergerst (*Hordeum vulgare* (winter))**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe graminis*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**zomergerst (*Hordeum vulgare* (spring))**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe graminis*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**winterrogge (*Secale cereale* (winter))**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe graminis*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**zomerrogge (*Secale cereale* (spring))**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt





Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe graminis*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**winterhaver (*Avena sativa (winter)*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe graminis*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**zomerhaver (*Avena sativa (spring)*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe graminis*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**wintertriticale (*Triticale x Secale (winter)*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe graminis*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**zomertriticale (*Triticale x Secale (spring)*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe graminis*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**winterspelt (*Triticum spelta (winter)*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe graminis*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2



Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

**zomerspelt (*Triticum spelta* (spring))**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe graminis*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**suikerbieten (*Beta vulgaris* subsp. *vulgaris* var. *altissima*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe betae*, *E. polygoni*)**

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 7,5 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

**voederbieten (*Beta vulgaris* subsp. *vulgaris* var. *crassa*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

**Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphe betae*, *E. polygoni*)**

Toepassingsstadium: preventief



Dosis: 7,5 kg/ha  
Aantal toepassingen: 1 tot 2  
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 21 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

### **hop (*Humulus lupulus*)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 10 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 3 m ten opzichte van oppervlaktewater

#### **Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Podosphaera macularis/Podosphaera aphanis*)**

Toepassingsstadium: preventief  
Dosis: 5 kg/ha haag  
Aantal toepassingen: 1 tot 10  
Interval tussen twee toepassingen: 6 tot 8 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

### **sierplanten (*ornamentals*)**

Locatie van het gewas: onder bescherming  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort(en):
- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating/vergunning.

#### **Ter bestrijding van: hagelschotziekte (*Stigmina carpophila (Coryneum beijerinckii)*)**

Toepassingsstadium: preventief  
Dosis: 0,3 - 0,45 kg/100 l  
Aantal toepassingen: 1 tot 2  
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 28 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

#### **Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphaceae*)**

Toepassingsstadium: preventief



Dosis: 0,3 - 0,45 kg/100 l  
Aantal toepassingen: 1 tot 2  
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 28 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

### **sierplanten (ornamentals)**

Locatie van het gewas: open lucht  
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 3 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort(en):
- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating/vergunning.

#### **Ter bestrijding van: hagelshotziekte (*Stigmia carpophila* (*Coryneum beijerinckii*))**

Toepassingsstadium: preventief  
Dosis: 0,3 - 0,45 kg/100 l  
Aantal toepassingen: 1 tot 2  
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 28 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

#### **Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Erysiphaceae*)**

Toepassingsstadium: preventief  
Dosis: 0,3 - 0,45 kg/100 l  
Aantal toepassingen: 1 tot 2  
Interval tussen twee toepassingen: 14 tot 28 dag(en)  
Toepassingstechniek: Bespuiting

## VERPAKKINGEN

Dit product mag alleen op de markt worden gebracht in de volgende verpakkingen:

**Type:** zak **Materiaal:** papier/PE meerlagig

---

Volume van de verpakking: 10 l Inhoud van de verpakking: 10 kg

Volume van de verpakking: 20 l Inhoud van de verpakking: 20 kg

**Type:** zak **Materiaal:** papier/PE/EVOH meerlagig

---

Volume van de verpakking: 10 l Inhoud van de verpakking: 10 kg

Volume van de verpakking: 20 l Inhoud van de verpakking: 20 kg

## OMSCHRIJVING VAN DE TEELTEN

appelbomen (*Malus domestica*): alle variëteiten

perenbomen (*Pyrus communis*): alle variëteiten, inbegrepen Nashi (nashipeer)

kersen- en krieckenbomen (*Prunus avium* et *P. cerasus*): alle variëteiten

pruimenbomen (*Prunus domestica* subsp. *domestica*): alle variëteiten

druivelaars (voor wijnproductie) (*Vitis vinifera*): wijnstokken waarvan de oogst bestemd is voor wijnproductie, alle variëteiten

druivelaars (tafeldruiven) (*Vitis vinifera*): wijnstokken waarvan de oogst bestemd is voor consumptie, alle variëteiten

aardbeien (*Fragaria × ananassa*): productieveld: aardbeien waarvan de oogst bestemd is voor consumptie, alle variëteiten; selectie- en vermeerderingsveld: gewas geteeld voor selectie of vermeerdering, alle variëteiten, de oogst mag niet gebruikt worden voor consumptie.

braamstruiken (*Rubus fruticosus*): alle variëteiten

frambozenstruiken (*Rubus idaeus*): alle variëteiten

blauwe / rode bosbessen (*Vaccinium myrtillus* & *V. corymbosum*): alle variëteiten

veenbessen (*Vaccinium vitis-idaea* & *V. macrocarpon*): alle variëteiten

aalbessen (witte, rode, zwarte) (*Ribes spp.*): alle variëteiten

stekelbes (kruisbes) en kruisingen (*Ribes uva-crispa*): alle variëteiten

rode biet (kroten) (*Beta vulgaris* subsp. *vulgaris* var. *conditiva*): alle variëteiten

wortelen (*Daucus carota*): alle variëteiten

pastinaak (*Pastinaca sativa*): alle variëteiten

radijs (*Raphanus sativus* var. *radicula*): radijs met een overwegend rode of witte schil, weinig pikante smaak, alle variëteiten

rammenas en rettich (*Raphanus sativus* var. *niger*): radijs met een overwegend rode, witte of zwarte schil, zeer pikante smaak, alle variëteiten (mierikswortel is niet inbegrepen)

schorseneren (*Scorzonera hispanica*): alle variëteiten

koolraap (*Brassica napus* subsp. *rapifera*): alle variëteiten

raap (stoppelraap, meiraap) (*Brassica rapa* subsp. *rapa*): alle variëteiten

mierikswortel (*Armoracia rusticana*): alle variëteiten

aardpeer (*Helianthus tuberosus*): alle variëteiten

tomaten (*Solanum lycopersicum*): alle variëteiten, inbegrepen de kerstomaten

- paprika/Spaanse peper (*Capsicum annuum*): alle variëteiten
- aubergine/eierplant en pepino (*Solanum melongena* - *Solanum muricatum*): alle variëteiten
- komkommer (*Cucumis sativus*): alle variëteiten
- augurk (*Cucumis sativus*): alle variëteiten
- courgette/patisson (*Cucurbita pepo*): alle variëteiten van courgette en patisson die geoogst worden wanneer de schil nog eetbaar is en die volledig gegeten worden
- meloen (*Cucumis melo*): alle variëteiten, watermeloenen zijn niet inbegrepen
- pompoen (*Cucurbita maxima* & *C. moschata*): alle variëteiten die geschild worden voor consumptie
- broccoli (*Brassica oleracea* var. *botrytis* subvar. *cymosa*): alle variëteiten
- bloemkool (witte en groene) (*Brassica oleracea* var. *botrytis* subvar. *cauliflora*): alle variëteiten
- spruitkool (*Brassica oleracea* var. *gemmifera*): alle variëteiten
- sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (*Brassica oleracea* var. *capitata*): alle variëteiten
- Chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna (*Brassica rapa chinensis* & *B. rapa pekinensis*): alle variëteiten
- boerenkool (krulkool, palmboerenkool) (*Brassica oleracea* var. *sabellica*; *Brassica oleracea* var. *palmifolia*): alle variëteiten
- koolrabi (koolraap-boven-de-grond) (*Brassica oleracea* var. *gongylodes*): alle variëteiten
- tuinkers en andere kiemen en scheuten (*Lepidium sativum*): alle variëteiten van scheutgroenten
- veldsla (*Valerianella locusta*): alle variëteiten
- slasoorten (*Lactuca* sp.): alle soorten en variëteiten
- andijvie, radicchio rosso, suikerbrood (*Cichorium endivia* var. *latifolia* et *crispum*): alle variëteiten
- waterkers (*Nasturtium officinale*): alle variëteiten
- witloofwortelteelt (*Cichorium intybus* var. *foliosum*): Voor de behandeling van het gewas op het veld; alle variëteiten voor de productie van witloof en roodlof.
- stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul) (*Phaseolus vulgaris*): alle variëteiten, inbegrepen de 'flageolets', onrijp geoogst
- drooggeoogste erwten (zonder peul) (*Pisum sativum*): alle variëteiten waarvan de zaden drooggeoogst worden, zowel voor dierlijke als menselijke consumptie
- groengeoogste erwten (zonder peul) (*Pisum sativum*): alle variëteiten waarvan de zaden onrijp geoogst worden voor verwerking tot conserven, om in te vriezen of voor de verse markt
- groengeoogste erwten (met peul) (*Pisum sativum*): alle variëteiten waarvan de peulen onrijp geoogst worden voor verwerking tot conserven, om in te vriezen of voor de verse markt





vicia-bonen (paarden-, duiven, tuin-,...) (drooggeogst) (*Vicia faba*): alle variëteiten, drooggeogst, voornamelijk voor dierlijke consumptie

vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (groengeogst, zonder peul) (*Vicia faba*): alle variëteiten waarvan de onrijpe zaden geogst worden

dille (consumptie bladeren) (*Anethum graveolens*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

kervel (consumptie bladeren) (*Anthriscus cerefolium*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

snijselder (consumptie bladeren) (*Apium graveolens var. secalinum*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

koriander (consumptie bladeren) (*Coriandrum sativum*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

lavas, maggiplant (consumptie bladeren) (*Levisticum officinale*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

peterselie (consumptie bladeren) (*Petroselinum crispum*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

wortelpeterselie en wortelkervel (consumptie wortels) (*Petroselinum crispum var. tuberosum* & *Chaerophyllum bulbosum*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

dragon (consumptie bladeren) (*Artemisia dracunculus*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

winterkers, barbarakruid (consumptie bladeren) (*Barbarea sp.*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

rode amsoi (consumptie bladeren) (*Brassica juncea*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

rucola (*Eruca sativa/Diplotaxis spp.*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

munt (consumptie bladeren) (*Mentha sp.*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

salie (consumptie bladeren) (*Salvia officinalis*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

wintertarwe (*Triticum aestivum (winter)*): alle variëteiten

zomertarwe (*Triticum aestivum (spring)*): alle variëteiten

wintergerst (*Hordeum vulgare (winter)*): alle variëteiten

zomergerst (*Hordeum vulgare (spring)*): alle variëteiten

winterrogge (*Secale cereale (winter)*): alle variëteiten

zomerrogge (*Secale cereale (spring)*): alle variëteiten

winterhaver (*Avena sativa (winter)*): alle variëteiten

zomerhaver (*Avena sativa (spring)*): alle variëteiten

wintertriticale (*Triticale x Secale (winter)*): alle variëteiten

zomertriticale (*Triticale x Secale (spring)*): alle variëteiten

winterspelt (*Triticum spelta (winter)*): alle variëteiten



zomerspelt (*Triticum spelta (spring)*): alle variëteiten

suikerbieten (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima*): alle variëteiten

voederbieten (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa*): alle variëteiten

hop (*Humulus lupulus*): alle variëteiten

sierplanten (*ornamentals*): Alle soorten en variëteiten, niet bestemd voor consumptie. Middelen toegelaten in deze teelt mogen ook gebruikt worden voor de opkweek van fruitbomen en -heesters voor zover deze nog niet op hun definitieve plaats staan en de vruchten niet geoogst worden.