



FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DG Dier, Plant en Voeding (DG4)

DIENST
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN
MESTSTOFFEN

SYNGENTA CROP PROTECTION N.V.
POSTBUS 512
4600 AM BERGEN OP ZOOM
NEDERLAND

Correspondent :

PAULUS BENOIT
Attaché
02 524 7392

Onze referten :

Dossiernummer : 26778

Datum : 15/02/2018

1/22

Betreft : Uitbreiding in graangewassen (zaadproductie)

TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL OF TOEVOEGINGSSTOF

1. Algemene bepalingen van de toelating

In toepassing van de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21/10/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad, en het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, en overeenkomstig het advies van het Erkenningscomité, wordt het product :

SPOW

met de hieronder vermelde specificaties en voorwaarden toegelaten onder het

nummer : **10167P/B**

voor : **BEROEPSGEBRUIK**

als : Herbicide

op naam van : SYNGENTA CROP PROTECTION N.V.



2. Samenstelling en vorm2.1. Algemene bepalingen :

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening Nr. 1107/2009 moeten de samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de bij de aanvraag of later verstrekte gegevens.

2.2. Werkzame stof(fen) en gewaarborgde gehalte(n) :

PROSULFOCARB

800 g/l

Algemene opmerking

/

2.3. Formuleringstype : EC (Emulgeerbaar concentraat)3. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Zie bijlage

4. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen4.1. Gevarencategorie(ën) : irriterend, sensibiliserend en milieugevaarlijk

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) Nr. 547/2011 van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen en het KB van 28/02/1994 tot regeling van de indeling en de verpakking moeten de volgende vermeldingen op het etiket vermeld worden.

4.2. De volgende symbolen van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG of van de bijlage XIV van het KB van 28/02/1994 en het KB van 11/01/1193 tot regeling van de indeling en de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op de markt brengen of het gebruik ervan :

Xi, N

4.3. De volgende R en S zinnen van de bijlage XIII van het KB van 28/02/1994 :

4.3.1. R38-R43-R50/53

4.3.2. S2-S13-S20/21-S23-S24-S37-S35-S61

4.4. Aantal punten toegekend in toepassing van art. 2bis §1 van het KB van 14/01/2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten :

4

4.5. Andere vermeldingen :

- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.
- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

- SPE3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet behandelen (zie driftreducerende maatregelen).

Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2:

- Op het etiket te vermelden co-formulanten: lichte aromatische oplosmiddelnafta (aardolie), Index Nr. 649-356-00-4.
- P280: Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen.
- P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

5. Geldigheidsduur van de toelating

5.1. Geldigheidsduur : vanaf 15/02/2018 tot en met 31/10/2019

5.2. Bijzondere voorwaarden voor de verlenging :

Evaluatie van het dossier voor her-erkenning

Deze toelating vervangt elke voorgaande toelating betreffende dit product.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:

De toelating is slechts geldig voor zover mij de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

GUELTON O.
Celhoofd Toelatingen

Bijlage 1

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden :

Te behandelen	: aardappelen (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 4-5 l/ha, ter aanvulling van een herbicide op basis van linuron (500 g w.s./ha), metobromuron (1000 g w.s./ha) of metribuzin (350 g w.s./ha).
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 4-5 l/ha, ter aanvulling van een herbicide op basis van linuron (500 g w.s./ha), metobromuron (1000 g w.s./ha) of metribuzin (350 g w.s./ha).
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardappelpootgoedteelt (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 4-5 l/ha, ter aanvulling van een herbicide op basis van linuron (500 g w.s./ha), metobromuron (1000 g w.s./ha) of metribuzin (350 g w.s./ha).
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 4-5 l/ha, ter aanvulling van een herbicide op basis van linuron (500 g w.s./ha), metobromuron (1000 g w.s./ha) of metribuzin (350 g w.s./ha).
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wortelen (open lucht)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 4 bladeren (BBCH 12-14)
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 5 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: knolselder (open lucht)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 4 bladeren (BBCH 12-14)
Opmerking	: max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 5 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen	: selderij (bleek-, groene en witte) (open lucht)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 4 bladeren (BBCH 12-14)
Opmerking	: max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 70 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wintertriticale (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen. - Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte. - Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: - 4-5 l/ha, 1 toepassing - Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: - 4-5 l/ha, 1 toepassing - Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wintertriticale (zaadproductie)
Toepassingsstadium	: voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen. - Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte. - Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.

Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: - 4-5 l/ha, 1 toepassing - Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: - 4-5 l/ha, 1 toepassing - Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomertriticale (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen. - Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte. - Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: - 4-5 l/ha, 1 toepassing - Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: - 4-5 l/ha, 1 toepassing - Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomertriticale (zaadproductie)
Toepassingsstadium	: voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen. - Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte. - Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.

Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: - 4-5 l/ha, 1 toepassing - Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: - 4-5 l/ha, 1 toepassing - Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterrogge (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen. - Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte. - Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: - 4-5 l/ha, 1 toepassing - Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: - 4-5 l/ha, 1 toepassing - Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterrogge (zaadproductie)
Toepassingsstadium	: voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen. - Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte. - Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.

Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: - 4-5 l/ha, 1 toepassing - Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: - 4-5 l/ha, 1 toepassing - Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomerrogge (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen. - Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte. - Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: - 4-5 l/ha, 1 toepassing - Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: - 4-5 l/ha, 1 toepassing - Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomerrogge (zaadproductie)
Toepassingsstadium	: voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen. - Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte. - Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.

Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: - 4-5 l/ha, 1 toepassing - Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: - 4-5 l/ha, 1 toepassing - Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wintergerst (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen. - Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte. - Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: - 4-5 l/ha, 1 toepassing - Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: - 4-5 l/ha, 1 toepassing - Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wintergerst (zaadproductie)
Toepassingsstadium	: voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen. - Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte. - Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.

Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: - 4-5 l/ha, 1 toepassing - Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: - 4-5 l/ha, 1 toepassing - Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wintertarwe (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen. - Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte. - Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: - 4-5 l/ha, 1 toepassing - Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: - 4-5 l/ha, 1 toepassing - Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wintertarwe (zaadproductie)
Toepassingsstadium	: voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen. - Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte. - Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.

Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: - 4-5 l/ha, 1 toepassing - Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: - 4-5 l/ha, 1 toepassing - Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: spelt (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen. - Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte. - Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: - 4-5 l/ha, 1 toepassing - Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: - 4-5 l/ha, 1 toepassing - Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: spelt (zaadproductie)
Toepassingsstadium	: voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen. - Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte. - Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.

Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: - 4-5 l/ha, 1 toepassing - Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: - 4-5 l/ha, 1 toepassing - Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: pastinaak (open lucht)
Toepassingsstadium	: 3 bladeren - 4 bladeren (BBCH 13-14)
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen. - Deze bespuiting moet worden gezien als noodmaatregel welke enig risico voor opbrengstderving inhoudt.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 75 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: perei (productieveld) (open lucht)
Toepassingsstadium	: 7-14 dagen na uitplanten
Opmerking	: max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 5 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: peterselie (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 75 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wortelpeterselie (consumptie wortels) (open lucht)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 4 bladeren (BBCH 12-14)
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 5 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: mierikswortel (open lucht)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 4 bladeren (BBCH 12-14)
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 5 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: karwij (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 75 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen	: bieslook (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 75 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: dille (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 75 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: engelwortel (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 75 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: kervel (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 75 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: roomse kervel (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 75 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: snijselder (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 75 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: koriander (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing

Veiligheidstermijn	: 75 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: lavas, maggiplant (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 75 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: dragon (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 75 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: gewone bernagie (consumptie van de bloemen) (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 75 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen	: hysop (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 75 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: citroenmelisse (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 75 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: munt (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 75 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: basilicum (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 75 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: marjolein/oregano (consumptie bladeren en/of stengels)(open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 75 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: salie (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 75 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: bonenkruid (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing

Veiligheidstermijn	: 75 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: tijm (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 75 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: rozemarijn (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 75 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: laurier (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 2,5-3 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 75 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen	: engelwortel (consumptie wortels) (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor opkomst of voor het planten
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: engelwortel (consumptie wortels) (open lucht)
Toepassingsstadium	: na opkomst of na het planten
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: schorseneren (open lucht)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 4 bladeren (BBCH 12-14)
Opmerking	: max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 4 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 4 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 80 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: boomkwekerij (open lucht) (niet bestemd voor consumptie)
Toepassingsstadium	: vegetatieve rustperiode (BBCH 00)
Opmerking	: - max. 1 toepassing/12 maanden - Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Prunus avium, Carpinus betulus, Picea abies en Pinus nigra subsp. Nigra.
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledoneae (annual))
Dosis / Concentratie	: 5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 5 l/ha, 1 toepassing

Risicobeperkende maatregelen : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Algemene opmerking :

/

Bijlage 2

CLP-etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 en
Verordening (EG) Nr. 547/2011

Signaalwoorden :

Gevaar

Gevarenpictogrammen en hun GHS-code :



Gevarenaanduidingen (H-zinnen):

H304	H315	H317	H319
H410			

Aanvullende informatie(EUH-zinnen) :

EUH210	EUH401
--------	--------

Standaardzinnen bijzondere risico's (R SH-zinnen) :

Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) :

P102	P270	P273	P280
P331	P391	P301+P310	P302+P352
P305+P351+P338	P501		