



SYNGENTA CROP PROTECTION N.V.  
POSTBUS 512  
4600 AM BERGEN OP ZOOM  
NEDERLAND

02 524 7289

1/26


Betreft : nieuwe risicobeperkende maatregelen + administratieve verlenging

## 1. Algemene bepalingen van de toelating

In toepassing van de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21/10/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad, en het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, en overeenkomstig het advies van het Erkenningscomité, wordt het product :

met de hieronder vermelde specificaties en voorwaarden toegelaten onder het

op naam van : SYNGENTA CROP PROTECTION N.V.



2. Samenstelling en vorm2.1. Algemene bepalingen :

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening Nr. 1107/2009 moeten de samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de bij de aanvraag of later verstrekte gegevens.

2.2. Werkzame stof(fen) en gewaarborgde gehalte(n) :

PROSULFOCARB

800 g/l

Algemene opmerking

/

2.3. Formuleringstype : EC (Emulgeerbaar concentraat)3. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Zie bijlage

4. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen4.1. Gevarencategorie(ën) : /

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) Nr. 547/2011 van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen en het KB van 28/02/1994 tot regeling van de indeling en de verpakking moeten de volgende vermeldingen op het etiket vermeld worden.

4.2. De volgende symbolen van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG of van de bijlage XIV van het KB van 28/02/1994 en het KB van 11/01/1193 tot regeling van de indeling en de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op de markt brengen of het gebruik ervan :

/

4.3. De volgende R en S zinnen van de bijlage XIII van het KB van 28/02/1994 :

4.3.1. /

4.3.2. /

4.4. Aantal punten toegekend in toepassing van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten :

4,4

4.5. Andere vermeldingen :

- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.
- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
- SPE3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone

ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

- SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 15.

Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2:

- Op het etiket te vermelden co-formulanten: lichte aromatische oplosmiddelnaftha (aardolie), Index Nr. 649-356-00-4.  
- P280: Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen.

### 5. Geldigheidsduur van de toelating

5.1. Geldigheidsduur : vanaf 26/05/2021 tot en met 31/10/2022

5.2. Bijzondere voorwaarden voor de verlenging :

Evaluatie van de aanvraag tot her-erkenning

Deze toelating vervangt elke voorgaande toelating betreffende dit product.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:

De toelating is slechts geldig voor zover mij de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

GUELTON O.  
Celhoofd Toelatingen

## Bijlage 1

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden :

|                              |                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Te behandelen                | : <b>aardappelen (open lucht)</b>                                                                                                                        |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst                                                                                                                                           |
| Opmerking                    | : Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart                                                                                                             |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige<br>onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 4-5 l/ha                                                                                                                                               |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae<br>(annual))                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 4-5 l/ha                                                                                                                                               |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90%<br>driftreducerende techniek                                                                               |
| Te behandelen                | : <b>aardappelpootgoedteelt (open lucht)</b>                                                                                                             |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst                                                                                                                                           |
| Opmerking                    | : Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart                                                                                                             |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige<br>onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 4-5 l/ha                                                                                                                                               |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae<br>(annual))                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 4-5 l/ha                                                                                                                                               |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90%<br>driftreducerende techniek                                                                               |
| Te behandelen                | : <b>wortelen (open lucht)</b>                                                                                                                           |
| Toepassingsstadium           | : 1 blad - 5 bladeren (BBCH 11-15)                                                                                                                       |
| Opmerking                    | : - max. 5 l/ha/teelt.<br>- Het product mag in deze teelt niet worden<br>gemengd met ureumverbindingen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae<br>(annual))                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 5 l/ha, eventueel gefractioneerd                                                                                                                       |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige<br>onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 5 l/ha, eventueel gefractioneerd                                                                                                                       |
| Veiligheidstermijn           | : 80 dagen                                                                                                                                               |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90%<br>driftreducerende techniek                                                                               |
| Te behandelen                | : <b>knolselder (open lucht)</b>                                                                                                                         |
| Toepassingsstadium           | : 2 bladeren - 4 bladeren (BBCH 12-14)                                                                                                                   |
| Opmerking                    | : - max. 5 l/ha/teelt.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.                                                                                  |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae<br>(annual))                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 5 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                   |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige<br>onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 5 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                   |
| Veiligheidstermijn           | : 100 dagen                                                                                                                                              |

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek |
| Te behandelen                | : <b>knolselder (open lucht)</b>                                        |
| Toepassingsstadium           | : 7 dagen na het planten                                                |
| Opmerking                    | : - max. 5 l/ha/teelt.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                     |
| Dosis / Concentratie         | : 3 l/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 5 dagen                 |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))           |
| Dosis / Concentratie         | : 3 l/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 5 dagen                 |
| Veiligheidstermijn           | : 100 dagen                                                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek |
| Te behandelen                | : <b>selderij (bleek-, groene en witte) (open lucht)</b>                |
| Toepassingsstadium           | : 2 bladeren - 4 bladeren (BBCH 12-14)                                  |
| Opmerking                    | : - max. 5 l/ha/teelt.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                     |
| Dosis / Concentratie         | : 5 l/ha, 1 toepassing                                                  |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))           |
| Dosis / Concentratie         | : 5 l/ha, 1 toepassing                                                  |
| Veiligheidstermijn           | : 70 dagen                                                              |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek |
| Te behandelen                | : <b>selderij (bleek-, groene en witte) (open lucht)</b>                |
| Toepassingsstadium           | : 7 dagen na het planten                                                |
| Opmerking                    | : - max. 5 l/ha/teelt.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                     |
| Dosis / Concentratie         | : 1-3 l/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 5 dagen               |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))           |
| Dosis / Concentratie         | : 1-3 l/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 5 dagen               |
| Veiligheidstermijn           | : 60 dagen                                                              |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Te behandelen                               | : <b>wintertriticale (open lucht)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Toepassingsstadium                          | : voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opmerking                                   | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.<br>- Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte.<br>- Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.<br>- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten wanneer nog te oogsten groenten, aromatische kruiden of fruit aanwezig zijn op aangrenzende percelen.<br>- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten in West-Vlaanderen met uitzondering van de landbouwstreek de Polders. |
| Ter bestrijding van<br>Dosis / Concentratie | : duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )<br>: - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ter bestrijding van<br>Dosis / Concentratie | : windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )<br>: - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Risicobeperkende maatregelen                | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Te behandelen                               | : <b>wintertriticale (zaadproductie)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Toepassingsstadium                          | : voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opmerking                                   | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.<br>- Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte.<br>- Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.<br>- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten wanneer nog te oogsten groenten, aromatische kruiden of fruit aanwezig zijn op aangrenzende percelen.<br>- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten in West-Vlaanderen met uitzondering van de landbouwstreek de Polders. |
| Ter bestrijding van<br>Dosis / Concentratie | : duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )<br>: - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ter bestrijding van          | : windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dosis / Concentratie         | : - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                      |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Te behandelen                | : <b>zomertriticale (open lucht)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.<br>- Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte.<br>- Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden( <i>Dicotyledonae</i> (annual))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dosis / Concentratie         | : - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                      |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden( <i>Poaceae</i> (annual))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dosis / Concentratie         | : - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                      |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Te behandelen                | : <b>zomertriticale (zaadproductie)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.<br>- Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte.<br>- Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dosis / Concentratie         | : - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dosis / Concentratie         | : - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Te behandelen                | : <b>winterrogge (open lucht)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.<br>- Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte.<br>- Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.<br>- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten wanneer nog te oogsten groenten, aromatische kruiden of fruit aanwezig zijn op aangrenzende percelen.<br>- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten in West-Vlaanderen met uitzondering van de landbouwstreek de Polders. |
| Ter bestrijding van          | : duist(Alopecurus myosuroides)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dosis / Concentratie         | : - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ter bestrijding van          | : windhalm(Apera spica-venti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dosis / Concentratie         | : - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Te behandelen                | : <b>winterrogge (zaadproductie)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.<br>- Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte.<br>- Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.<br>- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten wanneer nog te oogsten groenten, aromatische kruiden of fruit aanwezig zijn op aangrenzende percelen.<br>- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten in West-Vlaanderen met uitzondering van de landbouwstreek de Polders. |
| Ter bestrijding van          | : windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dosis / Concentratie         | : - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ter bestrijding van          | : duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dosis / Concentratie         | : - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Te behandelen                | : <b>zomerrogge (open lucht)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.<br>- Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte.<br>- Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden( <i>Dicotyledonae</i> (annual))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dosis / Concentratie         | : - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dosis / Concentratie         | : - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Te behandelen                | : <b>zomerrogge (zaadproductie)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.<br>- Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte.<br>- Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dosis / Concentratie         | : - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dosis / Concentratie         | : - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Te behandelen                | : <b>wintergerst (open lucht)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.<br>- Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte.<br>- Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.<br>- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten wanneer nog te oogsten groenten, aromatische kruiden of fruit aanwezig zijn op aangrenzende percelen.<br>- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten in West-Vlaanderen met uitzondering van de landbouwstreek de Polders. |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ter bestrijding van<br>Dosis / Concentratie | : duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )<br>: - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ter bestrijding van<br>Dosis / Concentratie | : windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )<br>: - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Risicobeperkende maatregelen                | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Te behandelen                               | : <b>wintergerst (zaadproductie)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Toepassingsstadium                          | : voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opmerking                                   | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.<br>- Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte.<br>- Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.<br>- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten wanneer nog te oogsten groenten, aromatische kruiden of fruit aanwezig zijn op aangrenzende percelen.<br>- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten in West-Vlaanderen met uitzondering van de landbouwstreek de Polders. |
| Ter bestrijding van<br>Dosis / Concentratie | : duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )<br>: - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ter bestrijding van<br>Dosis / Concentratie | : windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )<br>: - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Risicobeperkende maatregelen                | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Te behandelen                               | : <b>wintertarwe (open lucht)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Toepassingsstadium                          | : voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opmerking                                   | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.<br>- Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte.<br>- Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.<br>- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten wanneer nog te oogsten groenten, aromatische kruiden of fruit aanwezig zijn op aangrenzende percelen.<br>- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten in West-Vlaanderen met uitzondering van de landbouwstreek de Polders. |
| Ter bestrijding van<br>Dosis / Concentratie | : windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )<br>: - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ter bestrijding van<br>Dosis / Concentratie | : duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )<br>: - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Risicobeperkende maatregelen                | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Te behandelen                               | : <b>wintertarwe (zaadproductie)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Toepassingsstadium                          | : voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opmerking                                   | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.<br>- Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte.<br>- Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.<br>- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten wanneer nog te oogsten groenten, aromatische kruiden of fruit aanwezig zijn op aangrenzende percelen.<br>- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten in West-Vlaanderen met uitzondering van de landbouwstreek de Polders. |
| Ter bestrijding van<br>Dosis / Concentratie | : duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )<br>: - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ter bestrijding van<br>Dosis / Concentratie | : windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )<br>: - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Risicobeperkende maatregelen                | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Te behandelen                               | : <b>winterspelt (open lucht)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Toepassingsstadium                          | : voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opmerking                                   | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.<br>- Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte.<br>- Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.<br>- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten wanneer nog te oogsten groenten, aromatische kruiden of fruit aanwezig zijn op aangrenzende percelen.<br>- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten in West-Vlaanderen met uitzondering van de landbouwstreek de Polders. |
| Ter bestrijding van<br>Dosis / Concentratie | : duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )<br>: - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ter bestrijding van<br>Dosis / Concentratie | : windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )<br>: - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Risicobeperkende maatregelen                | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Te behandelen                               | : <b>zomerspelt (open lucht)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Toepassingsstadium                          | : voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opmerking                                   | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.<br>- Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte.<br>- Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dosis / Concentratie         | : - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dosis / Concentratie         | : - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Te behandelen                | : <b>winterspelt (zaadproductie)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.<br>- Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte.<br>- Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.<br>- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten wanneer nog te oogsten groenten, aromatische kruiden of fruit aanwezig zijn op aangrenzende percelen.<br>- Tussen 1 september en 1 maart is geen gebruik toegelaten in West-Vlaanderen met uitzondering van de landbouwstreek de Polders. |
| Ter bestrijding van          | : duist(Alopecurus myosuroides)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dosis / Concentratie         | : - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ter bestrijding van          | : windhalm(Apera spica-venti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dosis / Concentratie         | : - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Te behandelen                | : <b>zomerspelt (zaadproductie)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst - 2-3 bladstadium (BBCH 12-13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.<br>- Het product slechts toepassen bij een regelmatige zaai van minstens 3 cm diepte.<br>- Op een minder goed klaargelegde grond (kluiterig), op een zandbodem of op een zeer zware of humusrijke bodem wordt een na-opkomstbehandeling aanbevolen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                      |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dosis / Concentratie         | : - 4-5 l/ha, 1 toepassing<br>- Om een betere nawerking van de behandeling en een betere doeltreffendheid tegen echte kamille en muur te bekomen, kan het product in combinatie met een herbicide op basis van isoxaben (50-75 g w.s./ha) worden gebruikt.                                                                                                                                                      |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Te behandelen                | : <b>pastinaak (open lucht)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren - 4 bladeren (BBCH 13-14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt<br>- Het product mag in deze teelt niet worden gemengd met ureumverbindingen.<br>- Deze bespuiting moet worden gezien als noodmaatregel welke enig risico voor opbrengstderving inhoudt.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.                                                                                                                                           |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Veiligheidstermijn           | : 75 dagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Te behandelen                | : <b>prei (productieveld) (open lucht)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Toepassingsstadium           | : 7-14 dagen na het planten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opmerking                    | : - max. 5 l/ha/teelt.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dosis / Concentratie         | : 5 l/ha, eventueel gefractioneerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                              |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 5 l/ha, eventueel gefractioneerd                                                                                                                                                                                    |
| Veiligheidstermijn           | : 70 dagen                                                                                                                                                                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                               |
| Te behandelen                | : <b>peterselie (consumptie bladeren) (open lucht)</b>                                                                                                                                                                |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst                                                                                                                                                                                                        |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Veiligheidstermijn           | : 75 dagen                                                                                                                                                                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                               |
| Te behandelen                | : <b>wortelpeterselie en wortelkervel (consumptie wortels) (open lucht)</b>                                                                                                                                           |
| Toepassingsstadium           | : 2 bladeren - 4 bladeren (BBCH 12-14)                                                                                                                                                                                |
| Opmerking                    | : - max. 5 l/ha/teelt.<br>- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.       |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                                |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                                |
| Veiligheidstermijn           | : 80 dagen                                                                                                                                                                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                               |
| Te behandelen                | : <b>wortelpeterselie en wortelkervel (consumptie wortels) (open lucht)</b>                                                                                                                                           |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst (BBCH 01-08)                                                                                                                                                                                           |
| Opmerking                    | : - max. 5 l/ha/teelt.<br>- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.       |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                                |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                                |

|                              |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veiligheidstermijn           | : 80 dagen                                                                                                                                                                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                               |
| Te behandelen                | : <b>mierikswortel (open lucht)</b>                                                                                                                                                                                   |
| Toepassingsstadium           | : 2 bladeren - 4 bladeren (BBCH 12-14)                                                                                                                                                                                |
| Opmerking                    | : - max. 5 l/ha/teelt.<br>- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.       |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                                |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                                |
| Veiligheidstermijn           | : 80 dagen                                                                                                                                                                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                               |
| Te behandelen                | : <b>mierikswortel (open lucht)</b>                                                                                                                                                                                   |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst (BBCH 01-08)                                                                                                                                                                                           |
| Opmerking                    | : - max. 5 l/ha/teelt.<br>- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.       |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                                |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                                |
| Veiligheidstermijn           | : 80 dagen                                                                                                                                                                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                               |
| Te behandelen                | : <b>karwij (consumptie bladeren) (open lucht)</b>                                                                                                                                                                    |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst                                                                                                                                                                                                        |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Veiligheidstermijn           | : 75 dagen                                                                                                                                                                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                               |

|                              |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Te behandelen                | : <b>bieslook (consumptie bladeren) (open lucht)</b>                                                                                                                                                                  |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst                                                                                                                                                                                                        |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Veiligheidstermijn           | : 75 dagen                                                                                                                                                                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                               |
| Te behandelen                | : <b>dille (consumptie bladeren) (open lucht)</b>                                                                                                                                                                     |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst                                                                                                                                                                                                        |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Veiligheidstermijn           | : 75 dagen                                                                                                                                                                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                               |
| Te behandelen                | : <b>engewortel (consumptie bladeren) (open lucht)</b>                                                                                                                                                                |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst                                                                                                                                                                                                        |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Veiligheidstermijn           | : 75 dagen                                                                                                                                                                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                               |

|                              |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Te behandelen                | : <b>kervel (consumptie bladeren) (open lucht)</b>                                                                                                                                                                    |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst                                                                                                                                                                                                        |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Veiligheidstermijn           | : 75 dagen                                                                                                                                                                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                               |
| Te behandelen                | : <b>roomse kervel (consumptie bladeren) (open lucht)</b>                                                                                                                                                             |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst                                                                                                                                                                                                        |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Veiligheidstermijn           | : 75 dagen                                                                                                                                                                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                               |
| Te behandelen                | : <b>snijselder (consumptie bladeren) (open lucht)</b>                                                                                                                                                                |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst                                                                                                                                                                                                        |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Veiligheidstermijn           | : 75 dagen                                                                                                                                                                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                               |

|                              |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Te behandelen                | : <b>koriander (consumptie bladeren) (open lucht)</b>                                                                                                                                                                 |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst                                                                                                                                                                                                        |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Veiligheidstermijn           | : 75 dagen                                                                                                                                                                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                               |
| Te behandelen                | : <b>lavas, maggiplant (consumptie bladeren) (open lucht)</b>                                                                                                                                                         |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst                                                                                                                                                                                                        |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Veiligheidstermijn           | : 75 dagen                                                                                                                                                                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                               |
| Te behandelen                | : <b>dragon (consumptie bladeren) (open lucht)</b>                                                                                                                                                                    |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst                                                                                                                                                                                                        |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Veiligheidstermijn           | : 75 dagen                                                                                                                                                                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                               |

|                              |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Te behandelen                | : <b>gewone bernagie (consumptie van de bloemen) (open lucht)</b>                                                                                                                                                     |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst                                                                                                                                                                                                        |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Veiligheidstermijn           | : 75 dagen                                                                                                                                                                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                               |
| Te behandelen                | : <b>hysop (consumptie bladeren) (open lucht)</b>                                                                                                                                                                     |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst                                                                                                                                                                                                        |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Veiligheidstermijn           | : 75 dagen                                                                                                                                                                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                               |
| Te behandelen                | : <b>citroenmelisse (consumptie bladeren) (open lucht)</b>                                                                                                                                                            |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst                                                                                                                                                                                                        |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Veiligheidstermijn           | : 75 dagen                                                                                                                                                                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                               |

|                              |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Te behandelen                | : <b>munt (consumptie bladeren) (open lucht)</b>                                                                                                                                                                      |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst                                                                                                                                                                                                        |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Veiligheidstermijn           | : 75 dagen                                                                                                                                                                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                               |
| Te behandelen                | : <b>basilicum (consumptie bladeren) en eetbare bloemen (consumptie bloemen) (open lucht)</b>                                                                                                                         |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst                                                                                                                                                                                                        |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Veiligheidstermijn           | : 75 dagen                                                                                                                                                                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                               |
| Te behandelen                | : <b>marjolein/oregano (consumptie bladeren)(open lucht)</b>                                                                                                                                                          |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst                                                                                                                                                                                                        |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Veiligheidstermijn           | : 75 dagen                                                                                                                                                                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                               |

|                              |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Te behandelen                | : <b>salie (consumptie bladeren) (open lucht)</b>                                                                                                                                                                     |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst                                                                                                                                                                                                        |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Veiligheidstermijn           | : 75 dagen                                                                                                                                                                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                               |
| Te behandelen                | : <b>bonenkruid (consumptie bladeren) (open lucht)</b>                                                                                                                                                                |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst                                                                                                                                                                                                        |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Veiligheidstermijn           | : 75 dagen                                                                                                                                                                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                               |
| Te behandelen                | : <b>tijm (consumptie bladeren) (open lucht)</b>                                                                                                                                                                      |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst                                                                                                                                                                                                        |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Veiligheidstermijn           | : 75 dagen                                                                                                                                                                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                               |

|                              |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Te behandelen                | : <b>rozemarijn (consumptie bladeren) (open lucht)</b>                                                                                                                                                                |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst                                                                                                                                                                                                        |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Veiligheidstermijn           | : 75 dagen                                                                                                                                                                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                               |
| Te behandelen                | : <b>laurier (consumptie bladeren) (open lucht)</b>                                                                                                                                                                   |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst                                                                                                                                                                                                        |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 2,5-3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                            |
| Veiligheidstermijn           | : 75 dagen                                                                                                                                                                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                               |
| Te behandelen                | : <b>engewortel (consumptie wortels) (open lucht)</b>                                                                                                                                                                 |
| Toepassingsstadium           | : voor opkomst of voor het planten                                                                                                                                                                                    |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                                |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                                |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                               |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Te behandelen                | : <b>engelwortel (consumptie wortels) (open lucht)</b>                                                                                                                                                                                                               |
| Toepassingsstadium           | : na opkomst of na het planten                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt.<br>- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.                                                |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                                                                  |
| Dosis / Concentratie         | : 3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                                                                        |
| Dosis / Concentratie         | : 3 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                                                                               |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                                                                              |
| Te behandelen                | : <b>schorseneren (open lucht)</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Toepassingsstadium           | : 2 bladeren - 4 bladeren (BBCH 12-14)                                                                                                                                                                                                                               |
| Opmerking                    | : - max. 4 l/ha/teelt.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart.                                                                                                                                                                                              |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                                                                        |
| Dosis / Concentratie         | : 4 l/ha, eventueel gefractioneerd                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                                                                  |
| Dosis / Concentratie         | : 4 l/ha, eventueel gefractioneerd                                                                                                                                                                                                                                   |
| Veiligheidstermijn           | : 80 dagen                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                                                                              |
| Te behandelen                | : <b>boomkwekerij (open lucht) (niet bestemd voor consumptie)</b>                                                                                                                                                                                                    |
| Toepassingsstadium           | : vegetatieve rustperiode (BBCH 00)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/12 maanden.<br>- Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Prunus avium, Carpinus betulus, Picea abies en Pinus nigra subsp. Nigra.<br>- Geen gebruik tussen 1 september en 1 maart. |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))                                                                                                                                                                                                        |
| Dosis / Concentratie         | : 5 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ter bestrijding van          | : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))                                                                                                                                                                                                                  |
| Dosis / Concentratie         | : 5 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                                                                               |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek                                                                                                                                                                                              |

Algemene opmerking :

/

Bijlage 2

CLP-etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 en  
Verordening (EG) Nr. 547/2011

Signaalwoorden :

Gevaar

Gevarenpictogrammen en hun GHS-code :



Gevarenaanduidingen (H-zinnen):

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| H304 | H315 | H317 | H319 |
| H410 |      |      |      |

Aanvullende informatie(EUH-zinnen) :

EUH401

Standaardzinnen bijzondere risico's (R SH-zinnen) :

Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) :

|           |                |      |           |
|-----------|----------------|------|-----------|
| P280      | P331           | P391 | P301+P310 |
| P302+P352 | P305+P351+P338 |      |           |