

2. Samenstelling en vorm2.1. Algemene bepalingen :

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening Nr. 1107/2009 moeten de samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de bij de aanvraag of later verstrekte gegevens.

2.2. Werkzame stof(fen) en gewaarborgde gehalte(n) :

DIFENOCONAZOOL	250 g/l
----------------	---------

MANDIPROPAMID	250 g/l
---------------	---------

Algemene opmerking

/

2.3. Formuleringstype : SC (Suspensie concentraat)3. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Zie bijlage

4. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen4.1. Gevarencategorie(ën) : /

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) Nr. 547/2011 van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen en het KB van 28/02/1994 tot regeling van de indeling en de verpakking moeten de volgende vermeldingen op het etiket vermeld worden.

4.2. De volgende symbolen van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG of van de bijlage XIV van het KB van 28/02/1994 en het KB van 11/01/1193 tot regeling van de indeling en de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op de markt brengen of het gebruik ervan :

/

4.3. De volgende R en S zinnen van de bijlage XIII van het KB van 28/02/1994 :

4.3.1. /

4.3.2. /

4.4. Aantal punten toegekend in toepassing van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten :

2

4.5. Andere vermeldingen :

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
- SPE2: Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk

erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan.

- SPE3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.
- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating.

Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2:

- Op het etiket te vermelden co-formulanten: /
- EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
- P280: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

5. Geldigheidsduur van de toelating

5.1. Geldigheidsduur : vanaf 01/04/2021 tot en met 31/12/2022

5.2. Bijzondere voorwaarden voor de verlenging :

Evaluatie van de aanvraag tot her-erkenning

Deze toelating vervangt elke voorgaande toelating betreffende dit product.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:

De toelating is slechts geldig voor zover mij de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

GUELTON O.
Celhoofd Toelatingen

Bijlage 1

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden :

Te behandelen	: aardappelen (open lucht)
Opmerking	: max. 3 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: phytophthora(Phytophthora infestans)
Toepassingsstadium	: Preventief of volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,6 L/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: alternariarot(Alternaria solani)
Toepassingsstadium	: Preventief of volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,6 L/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardappelpootgoedteelt (open lucht)
Opmerking	: max. 3 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: phytophthora(Phytophthora infestans)
Toepassingsstadium	: Preventief of volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,6 L/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: alternariarot(Alternaria solani)
Toepassingsstadium	: Preventief of volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,6 L/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/12 maanden - Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Azalea en Chamaecyparis. - Tijdens de manipulatie van het behandelde gewas chemisch bestendige handschoenen dragen.
Ter bestrijding van	: Mycosphaerella(Mycosphaerella spp.)
Dosis / Concentratie	: 60 ml/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen
Ter bestrijding van	: septoria(Septoria)
Dosis / Concentratie	: 60 ml/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen
Ter bestrijding van	: stemphylium(Stemphylium)
Dosis / Concentratie	: 60 ml/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen
Ter bestrijding van	: ascochyta(Ascochyta)
Dosis / Concentratie	: 60 ml/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen
Ter bestrijding van	: alternaria(Alternaria)
Dosis / Concentratie	: 60 ml/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen
Ter bestrijding van	: blad-en takphytophthora en valse meeldauw(Phytophthora spp. / Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 60 ml/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen

Ter bestrijding van : cladosporium (Cladosporium spp.)(Cladosporium)
 Dosis / Concentratie : 60 ml/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen

Risicobeperkende maatregelen : /

Te behandelen : **sierplanten (eenjarige) (niet bestemd voor consumptie)(onder bescherming)**

Opmerking : - max. 2 toepassingen/teelt
 - Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort: Pelargonium.
 - Tijdens de manipulatie van het behandelde gewas chemisch bestendige handschoenen dragen.

Ter bestrijding van : Mycosphaerella(Mycosphaerella spp.)
 Dosis / Concentratie : 60 ml/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen

Ter bestrijding van : septoria(Septoria)
 Dosis / Concentratie : 60 ml/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen

Ter bestrijding van : stemphylium(Stemphylium)
 Dosis / Concentratie : 60 ml/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen

Ter bestrijding van : ascochyta(Ascochyta)
 Dosis / Concentratie : 60 ml/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen

Ter bestrijding van : alternaria(Alternaria)
 Dosis / Concentratie : 60 ml/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen

Ter bestrijding van : blad-en takphytophthora en valse meeldauw(Phytophthora spp. / Peronospora spp.)
 Dosis / Concentratie : 60 ml/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen

Ter bestrijding van : cladosporium (Cladosporium spp.)(Cladosporium)
 Dosis / Concentratie : 60 ml/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen

Risicobeperkende maatregelen : /

Algemene opmerking :

/

Bijlage 2

CLP-etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 en
Verordening (EG) Nr. 547/2011

Signaalwoorden :

Waarschuwing

Gevarenpictogrammen en hun GHS-code :

GHS09



Gevarenaanduidingen (H-zinnen):

H410

Aanvullende informatie(EUH-zinnen) :

EUH208

EUH401

Standaardzinnen bijzondere risico's (R SH-zinnen) :

Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) :

P280

P391