



FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DG Dier, Plant en Voeding (DG4)

DIENST
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN
MESTSTOFFEN

SYNGENTA CROP PROTECTION N.V.
POSTBUS 512
4600 AM BERGEN OP ZOOM
NEDERLAND

Correspondent :

NADIN PIERRE
Attaché
02 524 72 55

Onze referten :

Dossiernummer : 28605

Datum : 01/06/2015

1/8

Betreft : Corrigendum etikettering

TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL OF TOEVOEGINGSSTOF

1. Algemene bepalingen van de toelating

In toepassing van de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21/10/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad, en het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, en overeenkomstig het advies van het Erkenningscomité, wordt het product :

SEGURIS

met de hieronder vermelde specificaties en voorwaarden toegelaten onder het

nummer : **10368P/B**

voor : **BEROEPSGEBRUIK**

als : Fungicide

op naam van : SYNGENTA CROP PROTECTION N.V.



2. Samenstelling en vorm2.1. Algemene bepalingen :

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening Nr. 1107/2009 moeten de samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de bij de aanvraag of later verstrekte gegevens.

2.2. Werkzame stof(fen) en gewaarborgde gehalte(n) :

EPOXYCONAZOOL	90 g/l
ISOPYRAZAM	125 g/l

Algemene opmerking

/

2.3. Formuleringstype : SC (Suspensie concentraat)3. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Zie bijlage

4. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen4.1. Gevarencategorie(ën) : Sensibiliserend, schadelijk, giftig en milieugevaarlijk

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) Nr. 547/2011 van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen en het KB van 28/02/1994 tot regeling van de indeling en de verpakking moeten de volgende vermeldingen op het etiket vermeld worden.

4.2. De volgende symbolen van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG of van de bijlage XIV van het KB van 28/02/1994 en het KB van 11/01/1193 tot regeling van de indeling en de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op de markt brengen of het gebruik ervan :

T, N

4.3. De volgende R en S zinnen van de bijlage XIII van het KB van 28/02/1994 :

4.3.1. R61-R20-R40-R43-R62-R50/53

4.3.2. S2-S13-S20/21-S23-S25-S26-S36/37-S53-S42-S35-S61

4.4. Aantal punten toegekend in toepassing van art. 2bis §1 van het KB van 14/01/2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten :

8

4.5. Andere vermeldingen :

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPe2: Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen

geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan.

- SPE3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
- SPo2: Was alle beschermende kleding na gebruik.
- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.
- Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2:
 - P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
 - P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen.
 - P261: Inademing van nevel vermijden.
 - H360Df: Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.

5. Geldigheidsduur van de toelating

5.1. Geldigheidsduur : vanaf 01/06/2015 tot en met 30/04/2020

5.2. Bijzondere voorwaarden voor de verlenging :

Zie begeleidende brief bij de akte van 04/05/15

Deze toelating vervangt elke voorgaande toelating betreffende dit product.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:

De toelating is slechts geldig voor zover mij de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

GUELTON O.
Celhoofd Toelatingen

Bijlage 1

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden :

Te behandelen	: wintertarwe
Toepassingsstadium	: begin oprichten - einde bloei (BBCH 30-69)
Opmerking	: Max. 250 g isopyrazam/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: netvlekkenziekte/strepenziekte(Pyrenophora, Helminthosporium, Drechslera)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van	: bruine roest(Puccinia recondita)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van	: gele roest(Puccinia striiformis)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe graminis)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van	: bladvlekkenziekte/septoriose(Septoria tritici, Leptosphaeria nodorum))
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van	: kafjesbruin(Septoria nodorum)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 35 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomertarwe
Toepassingsstadium	: begin oprichten - einde bloei (BBCH 30-69)
Opmerking	: Max. 250 g isopyrazam/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: netvlekkenziekte/strepenziekte(Pyrenophora, Helminthosporium, Drechslera)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van	: bruine roest(Puccinia recondita)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van	: gele roest(Puccinia striiformis)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe graminis)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van	: bladvlekkenziekte/septoriose(Septoria tritici, Leptosphaeria nodorum))
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van	: kafjesbruin(Septoria nodorum)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 35 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

Te behandelen	: spelt
Toepassingsstadium	: begin oprichten - einde bloei (BBCH 30-69)
Opmerking	: Max. 250 g isopyrazam/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: netvlekkenziekte/strepenziekte(Pyrenophora, Helminthosporium, Drechslera)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van	: bruine roest(Puccinia recondita)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van	: gele roest(Puccinia striiformis)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe graminis)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van	: bladvlekkenziekte/septoriose(Septoria tritici, Leptosphaeria nodorum))
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van	: kafjesbruin(Septoria nodorum)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 35 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: triticale
Toepassingsstadium	: begin oprichten - einde bloei (BBCH 30-69)
Opmerking	: Max. 250 g isopyrazam/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: netvlekkenziekte/strepenziekte(Pyrenophora, Helminthosporium, Drechslera)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van	: bruine roest(Puccinia recondita)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van	: gele roest(Puccinia striiformis)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe graminis)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van	: bladvlekkenziekte/septoriose(Septoria tritici, Leptosphaeria nodorum))
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van	: kafjesbruin(Septoria nodorum)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 35 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

Te behandelen	: wintergerst
Toepassingsstadium	: begin oprichten - einde aarvorming (BBCH 30-59)
Opmerking	: Max. 250 g isopyrazam/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: netvlekkenziekte/strepenziekte(Pyrenophora, Helminthosporium, Drechslera)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van	: bladvlekkenziekte(Rhynchosporium secalis)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van	: bladvlekkenziekte/ramularia(Ramularia collo-cygni)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe graminis)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 35 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomergerst
Toepassingsstadium	: begin oprichten - einde aarvorming (BBCH 30-59)
Opmerking	: Max. 250 g isopyrazam/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: netvlekkenziekte/strepenziekte(Pyrenophora, Helminthosporium, Drechslera)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van	: bladvlekkenziekte(Rhynchosporium secalis)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van	: bladvlekkenziekte/ramularia(Ramularia collo-cygni)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe graminis)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 35 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterrogge
Toepassingsstadium	: begin oprichten - einde bloei (BBCH 30-69)
Opmerking	: Max. 250 g isopyrazam/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: bruine roest(Puccinia recondita)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van	: bladvlekkenziekte(Rhynchosporium secalis)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 35 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

Te behandelen	: zomerrogge
Toepassingsstadium	: begin oprichten - einde bloei (BBCH 30-69)
Opmerking	: Max. 250 g isopyrazam/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: bruine roest(<i>Puccinia recondita</i>)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van	: bladvlekkenziekte(<i>Rhynchosporium secalis</i>)
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 35 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

Algemene opmerking :

/

Bijlage 2

CLP-etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 en
Verordening (EG) Nr. 547/2011

Signaalwoorden :

Gevaar

Gevarenpictogrammen en hun GHS-code :



Gevarenaanduidingen (H-zinnen):

H317	H319	H332	H351
H360	H410		

Aanvullende informatie(EUH-zinnen) :

EUH210	EUH401
--------	--------

Standaardzinnen bijzondere risico's (R SH-zinnen) :

Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) :

P102	P201	P261	P263
P270	P272	P273	P280
P363	P391	P302+P352	P305+P351+P338
P308+P313	P501		