



FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DG Dier, Plant en Voeding (DG4)

DIENST
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN
MESTSTOFFEN

ADAMA REGISTRATIONS B.V
POSTBUS 355
NL-3830 AK LEUSDEN
NEDERLAND

Correspondent :

PAULUS BENOIT
Attaché
02 524 7392

Onze referten :

Dossiernummer : 29963

Datum : 22/02/2021

1/15

Betreft : Uitbreiding in verschillende teelten

TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL OF TOEVOEGINGSSTOF

1. Algemene bepalingen van de toelating

In toepassing van de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21/10/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad, en het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, en overeenkomstig het advies van het Erkenningscomité, wordt het product :

EVURE

met de hieronder vermelde specificaties en voorwaarden toegelaten onder het

nummer : **10728P/B**

voor : **BEROEPSGEBRUIK**

als : Insecticide / Acaricide

op naam van : ADAMA REGISTRATIONS B.V.



2. Samenstelling en vorm2.1. Algemene bepalingen :

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening Nr. 1107/2009 moeten de samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de bij de aanvraag of later verstrekte gegevens.

2.2. Werkzame stof(fen) en gewaarborgde gehalte(n) :

TAU-FLUVALINAAT

240 g/l

Algemene opmerking

/

2.3. Formuleringstype : EW (Emulsie, olie in water)3. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Zie bijlage

4. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen4.1. Gevarencategorie(ën) : /

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) Nr. 547/2011 van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen en het KB van 28/02/1994 tot regeling van de indeling en de verpakking moeten de volgende vermeldingen op het etiket vermeld worden.

4.2. De volgende symbolen van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG of van de bijlage XIV van het KB van 28/02/1994 en het KB van 11/01/1193 tot regeling van de indeling en de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op de markt brengen of het gebruik ervan :

/

4.3. De volgende R en S zinnen van de bijlage XIII van het KB van 28/02/1994 :

4.3.1. /

4.3.2. /

4.4. Aantal punten toegekend in toepassing van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten :

2

4.5. Andere vermeldingen :

- Dit product behoort tot de pyrethroïden. Bij toepassing kunnen deze, naast mogelijke irriterende en allergische effecten op de huid, specifieke reacties uitlokken (voornamelijk aan het gelaat). Deze beginnen meestal 1/2 uur tot 1 uur na de blootstelling en omvatten tintelingen, branderig gevoel of gevoelloosheid (voosheid). Laattijdige kortademigheid, koorts, hoesten zijn in zeer zeldzame gevallen mogelijk. Dit verschijnsel is van voorbijgaande aard en vereist geen verdere behandeling.

- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt

gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2:

- Op het etiket te vermelden co-formulanten: /
- P280: Beschermende handschoenen dragen.

5. Geldigheidsduur van de toelating

5.1. Geldigheidsduur : vanaf 22/02/2021 tot en met 31/05/2022

5.2. Bijzondere voorwaarden voor de verlenging :

/

Deze toelating vervangt elke voorgaande toelating betreffende dit product.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:

De toelating is slechts geldig voor zover mij de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

GUELTON O.
Celhoofd Toelatingen

Bijlage 1

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden :

Te behandelen	: winterrogge (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin oprichting - aarvorming (BBCH 30-59)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: galmuggen(Cecidomyiidae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minimum 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterhaver (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin oprichting - aarvorming (BBCH 30-59)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: galmuggen(Cecidomyiidae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minimum 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wintergerst (open lucht)
Toepassingsstadium	: in de herfst
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Toepassingsstadium	: vanaf het verschijnen van de bladluizen of volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1-2 toepassingen, ter bestrijding van bladluizen die de dwergvergelingsziekte overdragen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wintergerst (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin oprichting - aarvorming (BBCH 30-59)
Ter bestrijding van	: galmuggen(Cecidomyiidae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minimum 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterrogge (open lucht)
Toepassingsstadium	: in de herfst
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Toepassingsstadium	: vanaf het verschijnen van de bladluizen of volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1-2 toepassingen, ter bestrijding van bladluizen die de dwergvergelingsziekte overdragen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wintertriticale (open lucht)
Toepassingsstadium	: in de herfst

Ter bestrijding van Toepassingsstadium	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae) : vanaf het verschijnen van de bladluizen of volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1-2 toepassingen, ter bestrijding van bladluizen die de dwergvergelingsziekte overdragen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wintertriticale (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin oprichting - aarvorming (BBCH 30-59)
Ter bestrijding van Toepassingsstadium	: galmuggen(Cecidomyiidae) : volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minimum 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomertriticale (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin oprichting - aarvorming (BBCH 30-59)
Ter bestrijding van Toepassingsstadium	: galmuggen(Cecidomyiidae) : volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minimum 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterhaver (open lucht)
Toepassingsstadium	: in de herfst
Ter bestrijding van Toepassingsstadium	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae) : vanaf het verschijnen van de bladluizen of volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1-2 toepassingen, ter bestrijding van bladluizen die de dwergvergelingsziekte overdragen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterspelt (open lucht)
Toepassingsstadium	: in de herfst
Ter bestrijding van Toepassingsstadium	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae) : vanaf het verschijnen van de bladluizen of volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1-2 toepassingen, ter bestrijding van bladluizen die de dwergvergelingsziekte overdragen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterspelt (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin oprichting - aarvorming (BBCH 30-59)
Ter bestrijding van Toepassingsstadium	: galmuggen(Cecidomyiidae) : volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minimum 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

Te behandelen	: zomerspelt (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin oprichting - aarvorming (BBCH 30-59)
Ter bestrijding van	: galmuggen(Cecidomyiidae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minimum 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wintertarwe (open lucht)
Toepassingsstadium	: in de herfst
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Toepassingsstadium	: vanaf het verschijnen van de bladluizen of volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1-2 toepassingen, ter bestrijding van bladluizen die de dwergvergelingsziekte overdragen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wintertarwe (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin oprichting - aarvorming (BBCH 30-59)
Ter bestrijding van	: galmuggen(Cecidomyiidae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minimum 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomertarwe (open lucht)
Toepassingsstadium	: na de aarvorming
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,15 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 42 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomerspelt (open lucht)
Toepassingsstadium	: na de aarvorming
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,15 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 42 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomertriticale (open lucht)
Toepassingsstadium	: na de aarvorming
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,15 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 42 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

Te behandelen	: wintertarwe (open lucht)
Toepassingsstadium	: na de aarvorming
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,15 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 42 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wintertriticale (open lucht)
Toepassingsstadium	: na de aarvorming
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,15 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 42 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterspelt (open lucht)
Toepassingsstadium	: na de aarvorming
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,15 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 42 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomertarwe (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin oprichting - aarvorming (BBCH 30-59)
Ter bestrijding van	: galmuggen(Cecidomyiidae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minimum 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: kerstsparren (open lucht) (niet bestemd voor consumptie)
Toepassingsstadium	: in het begin van de lente
Opmerking	: max. 1 toepassing/12 maanden
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 40 ml/hl, 1 toepassing. De behandeling dient uitgevoerd te worden aan een hoog volume (ten minste 1000 l/ha) en in combinatie met een uitvloeier.
Ter bestrijding van	: galluizen (chermes-, sparappel-, dennewolluis)(Adelgidae)
Dosis / Concentratie	: 40 ml/hl, 1 toepassing. De behandeling dient uitgevoerd te worden aan een hoog volume (ten minste 1000 l/ha) en in combinatie met een uitvloeier.
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met 75% driftreducerende techniek

Te behandelen	: aardappelen (open lucht)
Toepassingsstadium	: 30% van de omringende lijnen raken elkaar - bessen van de eerste vruchten zijn okerkleurig of bruin (BBCH 33-85)
Opmerking	: Het product is weinig doeltreffend tegen Aphis nasturtii
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Toepassingsstadium	: vanaf het verschijnen van de bladluizen of volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,3 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardappelpootgoedteelt (open lucht)
Toepassingsstadium	: 30% van de omringende lijnen raken elkaar - bessen van de eerste vruchten zijn okerkleurig of bruin (BBCH 33-85)
Opmerking	: Het product is weinig doeltreffend tegen Aphis nasturtii
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Toepassingsstadium	: vanaf het verschijnen van de bladluizen of volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,3 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterkoolzaad (open lucht)
Toepassingsstadium	: Ontwikkeling van de bloemknoppen (BBCH 50-59)
Ter bestrijding van	: koolzaadglanskever(Meligethes aeneus, M. viridescens)
Toepassingsstadium	: vanaf het verschijnen van de insecten of volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterdurum (open lucht)
Toepassingsstadium	: in het najaar
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Toepassingsstadium	: volgens waarschuwingen of bij het verschijnen van de eerste symptomen
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winteremmer (open lucht)
Toepassingsstadium	: in het najaar
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Toepassingsstadium	: volgens waarschuwingen of bij het verschijnen van de eerste symptomen
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1-2 toepassingen

Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wintereenkoorn (open lucht)
Toepassingsstadium	: in het najaar
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Toepassingsstadium	: volgens waarschuwingen of bij het verschijnen van de eerste symptomen
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterkhorasan (open lucht)
Toepassingsstadium	: in het najaar
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Toepassingsstadium	: volgens waarschuwingen of bij het verschijnen van de eerste symptomen
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterdurum (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 30-59)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: galmuggen(Cecidomyiidae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van min. 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winteremmer (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 30-59)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: galmuggen(Cecidomyiidae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van min. 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wintereenkoorn (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 30-59)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt

Ter bestrijding van	: galmuggen(Cecidomyiidae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van min. 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterkhorasan (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 30-59)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: galmuggen(Cecidomyiidae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van min. 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterdurum (open lucht)
Toepassingsstadium	: na de aarvorming (> BBCH 50)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,15 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 42 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winteremmer (open lucht)
Toepassingsstadium	: na de aarvorming (> BBCH 50)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,15 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 42 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wintereenkoorn (open lucht)
Toepassingsstadium	: na de aarvorming (> BBCH 50)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,15 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 42 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterkhorasan (open lucht)
Toepassingsstadium	: na de aarvorming (> BBCH 50)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt

Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,15 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 42 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomerdurum (open lucht)
Toepassingsstadium	: na de aarvorming (> BBCH 50)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,15 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 42 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomeremmer (open lucht)
Toepassingsstadium	: na de aarvorming (> BBCH 50)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,15 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 42 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomereenkoorn (open lucht)
Toepassingsstadium	: na de aarvorming (> BBCH 50)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,15 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 42 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomerkhorasan (open lucht)
Toepassingsstadium	: na de aarvorming (> BBCH 50)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,15 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 42 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomerdurum (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 30-59)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt

Ter bestrijding van	: galmuggen(Cecidomyiidae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van min. 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomeremmer (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 30-59)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: galmuggen(Cecidomyiidae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van min. 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomereenkoorn (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 30-59)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: galmuggen(Cecidomyiidae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van min. 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomerkhorasan (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 30-59)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: galmuggen(Cecidomyiidae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van min. 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: bataat (zoete aardappel) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: rode biet (kroten) (open lucht)

Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: knolselder (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: mierikswortel (open lucht)
Opmerking	: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardpeer (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: pastinaak (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wortelpeterselie en wortelkervel (consumptie wortels) (open lucht)
Opmerking	: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: radijs (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: rammenas en rettich (open lucht)

Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: schorseneren (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: koolraap (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: raap (stoppelraap, meiraap) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: witloofwortelteelt (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae, Lachnidae, Callaphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardbeien (productieveld) (open lucht)
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van min. 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht)
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van min. 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

Algemene opmerking :

/

Bijlage 2

CLP-etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 en
Verordening (EG) Nr. 547/2011

Signaalwoorden :

Waarschuwing

Gevarenpictogrammen en hun GHS-code :

GHS09



Gevarenaanduidingen (H-zinnen):

H410

Aanvullende informatie(EUH-zinnen) :

EUH401

Standaardzinnen bijzondere risico's (R SH-zinnen) :

Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) :

P280

P391