

2. Samenstelling en vorm2.1. Algemene bepalingen :

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening Nr. 1107/2009 moeten de samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de bij de aanvraag of later verstrekte gegevens.

2.2. Werkzame stof(fen) en gewaarborgde gehalte(n) :

MANDIPROPAMID

250 g/l

Algemene opmerking

/

2.3. Formuleringstype : SC (Suspensie concentraat)3. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Zie bijlage

4. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen4.1. Gevarencategorie(ën) : /

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) Nr. 547/2011 van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen en het KB van 28/02/1994 tot regeling van de indeling en de verpakking moeten de volgende vermeldingen op het etiket vermeld worden.

4.2. De volgende symbolen van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG of van de bijlage XIV van het KB van 28/02/1994 en het KB van 11/01/1193 tot regeling van de indeling en de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op de markt brengen of het gebruik ervan :

/

4.3. De volgende R en S zinnen van de bijlage XIII van het KB van 28/02/1994 :

4.3.1. /

4.3.2. /

4.4. Aantal punten toegekend in toepassing van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten :

2

4.5. Andere vermeldingen :

- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.
- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
- SPE3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2:

- Op het etiket te vermelden co-formulanten: /

5. Geldigheidsduur van de toelating

5.1. Geldigheidsduur : vanaf 30/10/2020 tot en met 31/07/2024

5.2. Bijzondere voorwaarden voor de verlenging :

/

Deze toelating vervangt elke voorgaande toelating betreffende dit product.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:

De toelating is slechts geldig voor zover mij de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

GUELTON O.
Celhoofd Toelatingen

Bijlage 1

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden :

Te behandelen	: hop (open lucht)
Toepassingsstadium	: vanaf het einde van de oprichting (> BBCH 40)
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Pseudoperonospora humuli)
Dosis / Concentratie	: 0,34 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 10-21 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: kervel (consumptie bladeren) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snedes
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: snijzelder (consumptie bladeren) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snedes
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: koriander (consumptie bladeren) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snedes
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: kervel (consumptie bladeren) (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snedes
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /

Te behandelen	: koriander (consumptie bladeren) (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: karwij (consumptie bladeren) (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: lavas, maggiplant (consumptie bladeren) (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: dille (consumptie bladeren) (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: snijselder (consumptie bladeren) (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /

Te behandelen	: lavas, maggiplant (consumptie bladeren) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: karwij (consumptie bladeren) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: dille (consumptie bladeren) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardappelen (open lucht)
Ter bestrijding van	: phytophthora(Phytophthora infestans)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-6 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardappelpootgoedteelt (open lucht)
Ter bestrijding van	: phytophthora(Phytophthora infestans)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-6 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: slasoorten (open lucht)
Opmerking	: max. 6 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Bremia lactucae</i>)
Toepassingsstadium	: preventief of bij het waarnemen van de eerste symptomen
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: slasoorten (onder bescherming)
Opmerking	: max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Bremia lactucae</i>)
Toepassingsstadium	: preventief of bij het waarnemen van de eerste symptomen
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: slasoorten (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/teelt - Het gebruik is enkel toegelaten in gesloten waterrecirculatiesystemen. Het door het product gecontamineerde water mag in geen enkel geval in contact komen met het oppervlaktewater.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Bremia lactucae</i>)
Toepassingsstadium	: preventief of bij het waarnemen van de eerste symptomen
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: rucola (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Hyaloperonospora brassicae</i>)
Toepassingsstadium	: preventief of bij het waarnemen van de eerste symptomen
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: rucola (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Hyaloperonospora brassicae</i>)
Toepassingsstadium	: preventief of bij het waarnemen van de eerste symptomen
Dosis / Concentratie	: 0,6l/ha, 1-2 toepassingen/snede met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen	: peterselie (consumptie bladeren) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Peronospora</i> spp.)
Toepassingsstadium	: preventief of bij het waarnemen van de eerste symptomen
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: peterselie (consumptie bladeren) (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Peronospora</i> spp.)
Toepassingsstadium	: preventief of bij het waarnemen van de eerste symptomen
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: babyleaf (geoogst tot het stadium 8 bladeren) (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Bremia lactucae</i>)
Toepassingsstadium	: preventief of bij het waarnemen van de eerste symptomen
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: babyleaf (geoogst tot het stadium 8 bladeren) (open lucht)
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Bremia lactucae</i>)
Toepassingsstadium	: preventief of bij het waarnemen van de eerste symptomen
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen	: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht)
Opmerking	: Het gebruik in sierplanten werd toegelaten op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Viola, Chamaecyparis, Hedera en Azalea. Niet-grondgebonden teelt.
Ter bestrijding van	: blad-en takphytophthora en valse meeldauw(Phytophthora spp. / Peronospora spp.)
Toepassingsstadium	: preventief of bij het waarnemen van de eerste symptomen
Dosis / Concentratie	: 0,06 l/100 l, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming)
Opmerking	: Het gebruik in sierplanten werd toegelaten op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Viola, Chamaecyparis, Hedera en Azalea. Niet-grondgebonden teelt.
Ter bestrijding van	: blad-en takphytophthora en valse meeldauw(Phytophthora spp. / Peronospora spp.)
Toepassingsstadium	: preventief of bij het waarnemen van de eerste symptomen
Dosis / Concentratie	: 0,06 l/100 l, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht)
Toepassingsstadium	: vanaf volledige ontwikkeling van de planten (> BBCH 49)
Opmerking	: Het gebruik in sierplanten werd toegelaten op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Viola, Chamaecyparis, Hedera en Azalea.
Ter bestrijding van	: blad-en takphytophthora en valse meeldauw(Phytophthora spp. / Peronospora spp.)
Toepassingsstadium	: preventief of bij het waarnemen van de eerste symptomen
Dosis / Concentratie	: 0,06 l/100 l, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: tomaten (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: phytophthora(Phytophthora infestans)
Dosis / Concentratie	: 0,24 l/ha haag, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: aubergine/eierplant en pepino (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: phytophthora(Phytophthora infestans)
Dosis / Concentratie	: 0,24 l/ha haag, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /

Te behandelen	: spinazie (open lucht)
Toepassingsstadium	: 5 bladeren ontvouwen - typische grootte van de bladmassa bereikt (BBCH 15-49)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: valse meeldauw (wolf)(<i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>spinaciae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 -2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: spinazie (onder bescherming)
Opmerking	: max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: valse meeldauw (wolf)(<i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>spinaciae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: warmoes (snijbiet) (open lucht)
Toepassingsstadium	: 5 bladeren ontvouwen - typische grootte van de bladmassa bereikt (BBCH 15-49)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: valse meeldauw (wolf)(<i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>spinaciae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: basilicum (consumptie bladeren) en eetbare bloemen (consumptie bloemen) (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Peronospora</i> spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: salie (consumptie bladeren) (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Peronospora</i> spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /

Te behandelen	: rozemarijn (consumptie bladeren) (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: munt (consumptie bladeren)(onder bescherming)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: basilicum (consumptie bladeren) en eetbare bloemen (consumptie bloemen) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: salie (consumptie bladeren) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: rozemarijn (consumptie bladeren) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen	: munt (consumptie bladeren) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Peronospora</i> spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snedes
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: broccoli (open lucht)
Toepassingsstadium	: 6 bladeren ontvouwen - de roosjes hebben hun typische grootte en vorm bereikt en zijn gesloten (BBCH 16-49)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Hyaloperonospora brassicae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: spruitkool (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Hyaloperonospora brassicae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: bloemkool (witte en groene) (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Hyaloperonospora brassicae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: radijs (open lucht)
Opmerking	: max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Hyaloperonospora brassicae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: groengeoogste erwten (zonder peul) (open lucht)
Toepassingsstadium	: 5 tussenknopen gevormd - de eerste bloembladen zijn zichtbaar, de bloemknoppen zijn talrijk maar nog steeds gesloten (BBCH 35-59)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Peronospora viciae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: witloof en roodloof (forcerie hydrocultuur)
Toepassingsstadium	: onmiddelijk na het intafelen
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Aanbevelingen voor goede landbouwpraktijk voor naooogst behandelingen zijn beschikbaar op www.fytoweb.be/nl/witloofwortels .
Ter bestrijding van	: <i>phytophthora cryptogea</i> (<i>Phytophthora cryptogea</i> , <i>P. erythroseptica</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,5 ml/m ² , kraagbehandeling, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 21 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: witloof en roodloof (forcerie hydrocultuur)
Toepassingsstadium	: begin van de forcerie
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Aanbevelingen voor goede landbouwpraktijk voor naooogst behandelingen zijn beschikbaar op www.fytoweb.be/nl/witloofwortels .
Ter bestrijding van	: <i>phytophthora cryptogea</i> (<i>Phytophthora cryptogea</i> , <i>P. erythroseptica</i>)
Toepassingsstadium	: 0,75 ml/100l voedingsoplossing, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 21 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: druivelaars (voor wijnproductie) (open lucht)
Toepassingsstadium	: tros (bloeiwijze) duidelijk zichtbaar - begin rijping: begin lichter worden en/of verkleuren bessen (BBCH 53-81)
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Plasmopara viticola</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,33 l/ha haag, 1-4 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 21 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Te behandelen	: druivelaars (tafeldruiven) (open lucht)
Toepassingsstadium	: tros (bloeiwijze) duidelijk zichtbaar - begin rijping: begin lichter worden en/of verkleuren bessen (BBCH 53-81)
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Plasmopara viticola</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,33 l/ha haag, 1-4 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 21 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek

Te behandelen	: rode biet (kroten) (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin sluiten rijen: 10% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bietenwortel heeft oogstgrootte bereikt (BBCH 31-49)
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>betae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,15 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: komkommer (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,24 l/ha haag, 1-4 toepassingen met een interval 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: courgette/patisson (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Dosis / Concentratie	: - Horizontale teelt : 0,6 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen - Verticale teelt : 0,32 l/ha haag, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: meloen (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Dosis / Concentratie	: - Horizontale teelt: 0,6 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen - Verticale teelt: 0,24 l/ha haag, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: pompoen (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Dosis / Concentratie	: - Horizontale teelt: 0,6 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen - Verticale teelt: 0,24 l/ha haag, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: watermeloen (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)
Dosis / Concentratie	: - Horizontale teelt: 0,6 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen - Verticale teelt: 0,24 l/ha haag, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /

Te behandelen	: andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (open lucht)
Opmerking	: max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Bremia lactucae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (onder bescherming)
Opmerking	: max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Bremia lactucae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: postelein (consumptie bladeren) (open lucht)
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw (wolf)(<i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>spinaciae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snede met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zeekraal (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw (wolf)(<i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>spinaciae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snede met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: postelein (consumptie bladeren) (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw (wolf)(<i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>spinaciae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /

Te behandelen	: zeekraal (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw (wolf)(<i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>spinaciae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snedes
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: warmoes (snijbiet) (onder bescherming)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: valse meeldauw (wolf)(<i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>spinaciae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: veldsla (onder bescherming)
Opmerking	: max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Peronospora valerianellae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: veldsla (open lucht)
Opmerking	: max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Peronospora valerianellae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: tuinkers en andere kiemen en scheuten (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Hyaloperonospora brassicae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snedes met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterkers, barbakruid (consumptie bladeren) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Hyaloperonospora brassicae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snede met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: rode amsoi (consumptie bladeren) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Hyaloperonospora brassicae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: bieslook (consumptie bladeren) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Peronospora spp.</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snede met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: engelwortel (consumptie bladeren) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Peronospora spp.</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snede met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: roomse kervel (consumptie bladeren) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Peronospora spp.</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snede met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zuring (consumptie bladeren) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snede met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: gewone bernagie (consumptie van de bloemen) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: tijm (consumptie bladeren) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snede met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: marjolein/oregano (consumptie bladeren)(open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snede met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: bonenkruid (consumptie bladeren) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen	: citroenmelisse (consumptie bladeren) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Peronospora</i> spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snede met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: laurier (consumptie bladeren) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Peronospora</i> spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: dragon (consumptie bladeren) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Peronospora</i> spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snede met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: hysop (consumptie bladeren) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Peronospora</i> spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: tuinkers en andere kiemen en scheuten (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Hyaloperonospora brassicae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /

Te behandelen : **winterkers, barbarakruid (consumptie bladeren) (onder bescherming)**

Opmerking : - max. 6 toepassingen/12 maanden
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van : valse meeldauw(*Hyaloperonospora brassicae*)

Dosis / Concentratie : 0,6 l/ha, 1 toepassing/snedes

Veiligheidstermijn : 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen : /

Te behandelen : **rode amsoi (consumptie bladeren) (onder bescherming)**

Opmerking : - max. 6 toepassingen/12 maanden
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van : valse meeldauw(*Hyaloperonospora brassicae*)

Dosis / Concentratie : 0,6 l/ha, 1 toepassing

Veiligheidstermijn : 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen : /

Te behandelen : **witloof en roodloof (forcerie grondteelt)**

Toepassingsstadium : onmiddellijk na het intafelen

Opmerking : Aanbevelingen voor goede landbouwpraktijk voor naoogst behandelingen zijn beschikbaar op www.fytoweb.be/nl/witloofwortels

Ter bestrijding van : *phytophthora cryptogea*(*Phytophthora cryptogea*, *P. erythrosetica*)

Dosis / Concentratie : 0,5 ml/m², kraagbehandeling, 1 toepassing

Veiligheidstermijn : 21 dagen

Risicobeperkende maatregelen : /

Te behandelen : **witloofwortels (bewaring, na-oogst)**

Opmerking : Aanbevelingen voor goede landbouwpraktijk voor naoogst behandelingen zijn beschikbaar op www.fytoweb.be/nl/witloofwortels

Ter bestrijding van : *phytophthora cryptogea*(*Phytophthora cryptogea*, *P. erythrosetica*)

Dosis / Concentratie : 5 ml/100 l, 1 toepassing, dompelbehandeling

Veiligheidstermijn : 21 dagen

Risicobeperkende maatregelen : /

Algemene opmerking :

/

Bijlage 2

CLP-etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 en
Verordening (EG) Nr. 547/2011

Signaalwoorden :

Gevarenpictogrammen en hun GHS-code :

GHS09



Gevarenaanduidingen (H-zinnen):

H411

Aanvullende informatie(EUH-zinnen) :

EUH401

Standaardzinnen bijzondere risico's (R SH-zinnen) :

Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) :

P391