



FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DG Dier, Plant en Voeding (DG4)

DIENST
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN
MESTSTOFFEN

SYNGENTA CROP PROTECTION N.V.
POSTBUS 512
4600 AM BERGEN OP ZOOM
NEDERLAND

Correspondent :

VALÉRIE SEUTIN
Attaché
02 524 7282

Onze referten :

Dossiernummer : 2552

Datum : 17/11/2015

1/23

Betreft : Aanpassing van de etikettering aan de CLP-Verordening

TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL OF TOEVOEGINGSSTOF

1. Algemene bepalingen van de toelating

In toepassing van de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21/10/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad, en het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, en overeenkomstig het advies van het Erkenningscomité, wordt het product :

THIOVIT JET

met de hieronder vermelde specificaties en voorwaarden toegelaten onder het

nummer : **5700P/B**

voor : **BEROEPSGEBRUIK**

als : Fungicide

op naam van : SYNGENTA CROP PROTECTION N.V.



2. Samenstelling en vorm2.1. Algemene bepalingen :

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening Nr. 1107/2009 moeten de samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de bij de aanvraag of later verstrekte gegevens.

2.2. Werkzame stof(fen) en gewaarborgde gehalte(n) :

ZWAVEL

80 %

Algemene opmerking

/

2.3. Formuleringstype : WG (Water dispergeerbaar granulaat)3. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Zie bijlage

4. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen4.1. Gevarencategorie(ën) :

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) Nr. 547/2011 van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen en het KB van 28/02/1994 tot regeling van de indeling en de verpakking moeten de volgende vermeldingen op het etiket vermeld worden.

4.2. De volgende symbolen van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG of van de bijlage XIV van het KB van 28/02/1994 en het KB van 11/01/1193 tot regeling van de indeling en de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op de markt brengen of het gebruik ervan :

/

4.3. De volgende R en S zinnen van de bijlage XIII van het KB van 28/02/1994 :

4.3.1. /

4.3.2. S2-S13-S16-S20/21

4.4. Aantal punten toegekend in toepassing van art. 2bis §1 van het KB van 14/01/2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten :

0

4.5. Andere vermeldingen :

- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.
- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in de gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen

te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
- SPE3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2:

- Op het etiket te vermelden co-formulanten: /
- P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

5. Geldigheidsduur van de toelating

5.1. Geldigheidsduur : vanaf 17/11/2015 tot en met 30/12/2020

5.2. Bijzondere voorwaarden voor de verlenging :

Evaluatie van het dossier voor her-erkenning

Deze toelating vervangt elke voorgaande toelating betreffende dit product.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:

De toelating is slechts geldig voor zover mij de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

GUELTON O.
Celhoofd Toelatingen

Bijlage 1

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden :

Te behandelen	: groengeoogste erwten (zonder peul) (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe pisi)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: drooggeoogste erwten (zonder peul) (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe pisi)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: slasoorten (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cichoracearum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: slasoorten (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cichoracearum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cichoracearum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cichoracearum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: appelbomen (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Podosphaera leucotricha)
Dosis / Concentratie	: 3 kg/ha haag, met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: schurft(Venturia inaequalis)
Dosis / Concentratie	: 3 kg/ha haag, met een interval van 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: perenbomen (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling

Ter bestrijding van	: schurft(<i>Venturia pirina</i>)
Dosis / Concentratie	: 3 kg/ha haag, met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(<i>Podosphaera leucotricha</i>)
Dosis / Concentratie	: 3 kg/ha haag, met een interval van 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: kersen- en kriekenbomen (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(<i>Podosphaera clandestina</i>)
Dosis / Concentratie	: 6,25 kg/ha haag, 1-2 behandelingen met een interval van 14-28 dagen
Ter bestrijding van	: hagelschotziekte(<i>Stigmata carpophila</i> (<i>Coryneum beijerinckii</i>))
Dosis / Concentratie	: 6,25 kg/ha haag, 1-2 behandelingen met een interval van 14-28 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: pruimenbomen (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(<i>Podosphaera clandestina</i>)
Dosis / Concentratie	: 6,25 kg/ha haag, 1-2 behandelingen met een interval van 14-28 dagen
Ter bestrijding van	: hagelschotziekte(<i>Stigmata carpophila</i> (<i>Coryneum beijerinckii</i>))
Dosis / Concentratie	: 6,25 kg/ha haag, 1-2 behandelingen met een interval van 14-28 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: druivelaars (voor wijnproductie) (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(<i>Uncinula necator</i>)
Toepassingsstadium	: Voor de bloei (BBCH 61)
Dosis / Concentratie	: 6 - 8 kg/ha haag
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(<i>Uncinula necator</i>)
Toepassingsstadium	: Na de bloei (BBCH 69)
Dosis / Concentratie	: 3 - 5 kg/ha haag
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: druivelaars (tafeldruiven) (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(<i>Uncinula necator</i>)
Toepassingsstadium	: Voor de bloei (BBCH 61)
Dosis / Concentratie	: 6 - 8 kg/ha haag
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(<i>Uncinula necator</i>)
Toepassingsstadium	: Na de bloei (BBCH 69)
Dosis / Concentratie	: 3 - 5 kg/ha haag
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: druivelaars (tafeldruiven) (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling

Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Uncinula necator)
Toepassingsstadium	: Voor de bloei (BBCH 61)
Dosis / Concentratie	: 0,6 - 0,8 kg/100l
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Uncinula necator)
Toepassingsstadium	: Na de bloei (BBCH 61)
Dosis / Concentratie	: 0,3 - 0,5 kg/100l
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: aardbeien (productieveld) (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Podosphaera aphanis)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Podosphaera aphanis)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardbeien (productieveld) (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Podosphaera aphanis)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Podosphaera aphanis)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: braamstruiken (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Podosphaera aphanis)
Dosis / Concentratie	: 3 kg/ha haag
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: braamstruiken (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Podosphaera aphanis)
Dosis / Concentratie	: 3 kg/ha haag
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: frambozenstruiken (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling

Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Podosphaera aphanis)
Dosis / Concentratie	: 3 kg/ha haag
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: frambozenstruiken (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Podosphaera aphanis)
Dosis / Concentratie	: 3 kg/ha haag
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: blauwe / rode bosbessen (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Sphaerotheca mors-uvae)
Dosis / Concentratie	: 3 kg/ha haag
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: blauwe / rode bosbessen (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Sphaerotheca mors-uvae)
Dosis / Concentratie	: 3 kg/ha haag
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: veenbessen (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Sphaerotheca mors-uvae)
Dosis / Concentratie	: 3 kg/ha haag
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: veenbessen (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Sphaerotheca mors-uvae)
Dosis / Concentratie	: 3 kg/ha haag
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: aalbessen (witte, rode, zwarte) (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Sphaerotheca mors-uvae)
Dosis / Concentratie	: 3 kg/ha haag
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aalbessen (witte, rode, zwarte) (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Sphaerotheca mors-uvae)
Dosis / Concentratie	: 3 kg/ha haag
Risicobeperkende maatregelen	: /

Te behandelen	: stekelbes (kruisbes) en kruisingen (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Sphaerotheca mors-uvae)
Dosis / Concentratie	: 3 kg/ha haag
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: stekelbes (kruisbes) en kruisingen (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Sphaerotheca mors-uvae)
Dosis / Concentratie	: 3 kg/ha haag
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: rode biet (kroten) (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe betae, E. polygoni)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wortelen (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe heraclei)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: pastinaak (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe heraclei)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: radijs (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cichoracearum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: radijs (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cichoracearum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: rammenas en rettich (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cichoracearum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha

Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: rammenas en rettich (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cichoracearum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: schorseneren (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cichoracearum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: koolraap (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cruciferarum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: raap (stoppelraap, meiraap) (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cruciferarum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: mierikswortel (open lucht)
Opmerking	: - preventieve behandeling - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cruciferarum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardpeer (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cichoracearum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: tomaten (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Leveillula taurica)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha haag
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: paprika/spaanse peper (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling

Ter bestrijding van	: echte meeldauw(<i>Leveillula taurica</i>)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha haag
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: aubergine/eierplant en pepino (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(<i>Leveillula taurica</i>)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha haag
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: komkommer (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(<i>Erysiphe polyphaga</i> , <i>E. fuliginea</i> , <i>E. oronti</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha haag
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: augurk (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(<i>Erysiphe polyphaga</i> , <i>E. fuliginea</i> , <i>E. oronti</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha haag (verticale teelt) of 5 kg/ha (horizontale teelt)
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: augurk (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(<i>Erysiphe polyphaga</i> , <i>E. fuliginea</i> , <i>E. oronti</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha haag (verticale teelt) of 5 kg/ha (horizontale teelt)
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: courgette/patisson (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(<i>Erysiphe polyphaga</i> , <i>E. fuliginea</i> , <i>E. oronti</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: courgette/patisson (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(<i>Erysiphe polyphaga</i> , <i>E. fuliginea</i> , <i>E. oronti</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha haag (verticale teelt) of 5 kg/ha (horizontale teelt)
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: meloen (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling

Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe polyphaga, E. fuliginea, E. oronti, Sphaerotheca fuliginea)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha haag (verticale teelt) of 5 kg/ha (horizontale teelt)
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: pompoen (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe polyphaga, E. fuliginea, E. oronti, Sphaerotheca fuliginea)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: pompoen (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe polyphaga, E. fuliginea, E. oronti, Sphaerotheca fuliginea)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: broccoli (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cruciferarum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: broccoli (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cruciferarum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: bloemkool (witte en groene) (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cruciferarum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: bloemkool (witte en groene) (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cruciferarum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: spruitkool (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cruciferarum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha

Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: spruitkool (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cruciferarum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cruciferarum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cruciferarum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: Chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cruciferarum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: Chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cruciferarum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: boerenkool (krulkool, palmboerenkool) (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cruciferarum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: boerenkool (krulkool, palmboerenkool) (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cruciferarum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /

Te behandelen	: koolrabi (koolraap-boven-de-grond) (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cruciferarum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: koolrabi (koolraap-boven-de-grond) (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cruciferarum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: tuinkers en andere kiemen en scheuten (open lucht)
Opmerking	: - preventieve behandeling - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cruciferarum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: tuinkers en andere kiemen en scheuten (onder bescherming)
Opmerking	: - preventieve behandeling - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cruciferarum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: veldsla (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe polyphaga, E. fuliginea, E. oronti, Sphaerotheca fuliginea)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: veldsla (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe polyphaga, E. fuliginea, E. oronti, Sphaerotheca fuliginea)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: waterkers (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cruciferarum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha

Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: waterkers (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cruciferarum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: witloofwortelteelt (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cichoracearum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul) (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe pisi)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha haag (verticale teelt) of 5 kg/ha (horizontale teelt)
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: stamslabonen (prinsessen-, snijbonen) (groengeoogst, met peul) (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe pisi)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha haag (verticale teelt) of 5 kg/ha (horizontale teelt)
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: groengeoogste erwten (met peul) (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe pisi)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: groengeoogste erwten (met peul) (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe pisi)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha haag
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (drooggeoogst) (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe pisi)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen	: vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (groengeoogst, zonder peul) (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe pisi)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: peterselie (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - preventieve behandeling - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe heraclei)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: peterselie (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - preventieve behandeling - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe heraclei)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: wortelpeterselie (consumptie wortels) (open lucht)
Opmerking	: - preventieve behandeling - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe heraclei)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wortelpeterselie (consumptie wortels) (onder bescherming)
Opmerking	: - preventieve behandeling - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe heraclei)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: dille (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - preventieve behandeling - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe heraclei)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha

Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: dille (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - preventieve behandeling - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe heraclei)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: kervel (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - preventieve behandeling - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe heraclei)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: kervel (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - preventieve behandeling - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe heraclei)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: koriander (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - preventieve behandeling - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe heraclei)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: koriander (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - preventieve behandeling - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe heraclei)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /

Te behandelen	: winterkers, barbarakruid (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - preventieve behandeling - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cruciferarum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterkers, barbarakruid (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - preventieve behandeling - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cruciferarum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: rode amsoi (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - preventieve behandeling - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cruciferarum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: rode amsoi (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - preventieve behandeling - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cruciferarum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: rucola (open lucht)
Opmerking	: - preventieve behandeling - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cruciferarum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen	: rucola (onder bescherming)
Opmerking	: - preventieve behandeling - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe cruciferarum)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: dragon (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - preventieve behandeling - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe heraclei)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: dragon (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - preventieve behandeling - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe heraclei)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: munt (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - preventieve behandeling - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe heraclei)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: munt (consumptie bladeren en/of stengels)(onder bescherming)
Opmerking	: - preventieve behandeling - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe heraclei)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: salie (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - preventieve behandeling - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe heraclei)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: salie (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - preventieve behandeling - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe heraclei)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: lavas, maggiplant (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - preventieve behandeling - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe heraclei)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: lavas, maggiplant (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - preventieve behandeling - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe heraclei)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: snijselder (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - preventieve behandeling - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe heraclei)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: snijselder (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - preventieve behandeling - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe heraclei)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen	: voederbieten (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe betae, E. polygoni)
Dosis / Concentratie	: 7,5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: suikerbieten (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe betae, E. polygoni)
Dosis / Concentratie	: 7,5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphaceae)
Dosis / Concentratie	: 0,3 - 0,45 kg/ 100 l water
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphaceae)
Dosis / Concentratie	: 0,3 - 0,45 kg/ 100 l water
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: hop (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Podosphaera macularis/Podosphaera aphanis)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha haag
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomertarwe (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe graminis)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wintertarwe (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe graminis)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomergerst (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling

Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe graminis)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wintergerst (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe graminis)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomerrogge (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe graminis)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterrogge (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe graminis)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomerhaver (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe graminis)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterhaver (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe graminis)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: triticale (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe graminis)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: spelt (open lucht)
Opmerking	: preventieve behandeling
Ter bestrijding van	: echte meeldauw(Erysiphe graminis)
Dosis / Concentratie	: 5 kg/ha
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Algemene opmerking :

/

Bijlage 2

CLP-etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 en
Verordening (EG) Nr. 547/2011

Signaalwoorden :

Gevarenpictogrammen en hun GHS-code :

Gevarenaanduidingen (H-zinnen):

Aanvullende informatie(EUH-zinnen) :

EUH210

EUH401

Standaardzinnen bijzondere risico's (R SH-zinnen) :

Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) :

P102

P210

P270

P501