

Dossiernummer: 25845

Datum: 25/04/2022

TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL

Betreft: administratieve verlenging

Handelsbenaming:

EVURE

Toelatingsnummer:

10728P/B

Gebruikerscategorie: uitsluitend bestemd voor **PROFESSIONEEL** gebruik

Toelatingshouder:

ADAMA REGISTRATIONS B.V.

Postbus 355
3830AK Leusden
NEDERLAND

Aard van het middel: **Insecticide / Acaricide**

Formuleringstype: **EW (Emulsie, olie in water)**

Referentieproduct: **7535P/B**

Gewaarborgde gehalten van de werkzame stoffen, synergisten en beschermstoffen:

- **tau-fluvalinaat: 240 g/l (werkzame stof)**

Deze toelating is geldig van **25/04/2022** tot en met **31/08/2025** en vervangt elke voorafgaande toelatingsakte voor dit product.

Toegekende punten voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage in toepassing van het koninklijk besluit van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten: **2**.

Het product, voor zover het voldoet aan alle voorwaarden vastgesteld in deze toelatingsakte en haar bijlage,

is toegelaten in toepassing van:

- de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;
- het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:
De toelating is slechts geldig voor zover de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden aan de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

Dossierbeheerder: Dana Vanderpoorten
E-mail: dana.vanderpoorten@health.fgov.be
Tel: +3225247231
Site: www.fytoweb.be

BIJLAGE

INDELING EN ETIKETTERING VAN HET PRODUCT

Onverminderd de bepalingen inzake indeling en/of etikettering van:

- de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006;
- de Verordening (EU) Nr. 547/2011 van de Commissie van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen;
- Het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik;

moeten de volgende vermeldingen op het etiket van het product vermeld worden:

Indeling en etikettering in overeenstemming met Verordening (EG) nr 1272/2008

Gevarenklassen en -categorieën:

- Niet van toepassing

Signaalwoord :

- WAARSCHUWING

GHS-codes en gevarenpictogrammen :

- GHS09: Milieugevaarlijk



Gevarenaanduidingen (H zinnen):

- H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (P zinnen):

- P280: Draag beschermende handschoenen.
- P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.

Aanvullende gevareninformatie (EUH zinnen) :

- EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Zinnen volgens Verordening (EG) nr. 1107/2009 of (EU) nr. 547/2011

Standaardzinnen voor veiligheidsadviezen (SP zinnen):

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De IRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 3A.



- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Andere voorwaarden/nationale zinnen

- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn (en) te verkorten.
- Dit product behoort tot de pyrethroïden. Bij toepassing kunnen deze, naast mogelijke irriterende en allergische effecten op de huid, specifieke reacties uitlokken (voornamelijk aan het gelaat). Deze beginnen meestal 0,5 uur tot 1 uur na de blootstelling en omvatten tintelingen, branderig gevoel of gevoelloosheid (voosheid). Laattijdige kortademigheid, koorts en hoesten zijn in zeer zeldzame gevallen mogelijk. Deze verschijnselen zijn van voorbijgaande aard en vereisen geen verdere behandeling.
- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

GEBRUIKEN

De toepassingen waarvoor het product is toegelaten en de specifieke voorwaarden waaronder het product gebruikt mag worden:

druivelaars (voor wijnproductie) (*Vitis vinifera*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: tros (bloeiwijze) duidelijk zichtbaar - 'veraison': zacht worden van bessen (BBCH 53-85)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Wachttijd voor de oogst: 21 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met 75% driftreducerende techniek

Ter bestrijding van: cicaden (*Cicadellidae*)

Toepassingsstadium: /

Dosis: 0,11 l/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

druivelaars (tafeldruiven) (*Vitis vinifera*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: tros (bloeiwijze) duidelijk zichtbaar - 'veraison': zacht worden van bessen (BBCH 53-85)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Wachttijd voor de oogst: 21 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met 75% driftreducerende techniek

Ter bestrijding van: cicaden (*Cicadellidae*)

Toepassingsstadium: /

Dosis: 0,11 l/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting



wintertarwe (*Triticum aestivum* (winter))

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 30-59)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: galmuggen (*Cecidomyiidae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

wintertarwe (*Triticum aestivum* (winter))

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: $\geq$ BBCH 61 (begin bloei: eerste helmknoppen zichtbaar)

Wachttijd voor de oogst: 42 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,15 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

wintertarwe (*Triticum aestivum* (winter))

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsseizoen: najaar

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek



Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Toepassingsstadium: volgens waarschuwingen of bij het verschijnen van de eerste symptomen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: ter bestrijding van bladluizen die de dwergvergelingsziekte overdragen

zomertarwe (*Triticum aestivum* (spring))

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 30-59)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: galmuggen (*Cecidomyiidae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

zomertarwe (*Triticum aestivum* (spring))

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: $\geq$ BBCH 61 (begin bloei: eerste helmknoppen zichtbaar)

Wachttijd voor de oogst: 42 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,15 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting



wintergerst (*Hordeum vulgare* (winter))

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 30-59)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: galmuggen (*Cecidomyiidae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

wintergerst (*Hordeum vulgare* (winter))

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsseizoen: najaar

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Toepassingsstadium: volgens waarschuwingen of bij het verschijnen van de eerste symptomen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: ter bestrijding van bladluizen die de dwergvergelingsziekte overdragen

winterrogge (*Secale cereale* (winter))

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 30-59)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: galmuggen (*Cecidomyiidae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

winterrogge (*Secale cereale (winter)*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsseizoen: najaar

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae, Lachnidae, Callaphididae*)

Toepassingsstadium: volgens waarschuwingen of bij het verschijnen van de eerste symptomen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: ter bestrijding van bladluizen die de dwergvergelingsziekte overdragen

winterhaver (*Avena sativa (winter)*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 30-59)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: galmuggen (*Cecidomyiidae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting



winterhaver (*Avena sativa* (winter))

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsseizoen: najaar

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Toepassingsstadium: volgens waarschuwingen of bij het verschijnen van de eerste symptomen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: ter bestrijding van bladluizen die de dwergvergelingsziekte overdragen

wintertriticale (*Triticale x Secale* (winter))

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstotelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 30-59)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: galmuggen (*Cecidomyiidae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

wintertriticale (*Triticale x Secale* (winter))

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: $\geq$ BBCH 61 (begin bloei: eerste helmknoppen zichtbaar)

Wachttijd voor de oogst: 42 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek



Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,15 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

wintertriticale (*Triticale* x *Secale* (winter))

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsseizoen: najaar

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Toepassingsstadium: volgens waarschuwingen of bij het verschijnen van de eerste symptomen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: ter bestrijding van bladluizen die de dwergvergelingsziekte overdragen

zomertriticale (*Triticale* x *Secale* (spring))

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 30-59)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: galmuggen (*Cecidomyiidae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting



zomertriticale (*Triticale x Secale (spring)*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: $\geq$ BBCH 61 (begin bloei: eerste helmknoppen zichtbaar)

Wachttijd voor de oogst: 42 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,15 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

winterspelt (*Triticum spelta (winter)*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoeingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 30-59)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: galmuggen (*Cecidomyiidae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

winterspelt (*Triticum spelta (winter)*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: $\geq$ BBCH 61 (begin bloei: eerste helmknoppen zichtbaar)

Wachttijd voor de oogst: 42 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek



Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,15 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

winterspelt (*Triticum spelta* (winter))

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsseizoen: najaar

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Toepassingsstadium: volgens waarschuwingen of bij het verschijnen van de eerste symptomen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: ter bestrijding van bladluizen die de dwergvergelingsziekte overdragen

zomerspelt (*Triticum spelta* (spring))

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 30-59)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: galmuggen (*Cecidomyiidae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting



zomerspelt (*Triticum spelta* (spring))

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: $\geq$ BBCH 61 (begin bloei: eerste helmknoppen zichtbaar)

Wachttijd voor de oogst: 42 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,15 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

aardappelen (*Solanum tuberosum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 30% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bessen van eerste vruchtgestel nog oker tot bruinachtig gekleurd (BBCH 33-85)

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Toepassingsstadium: volgens waarschuwingen of bij het verschijnen van de eerste symptomen

Dosis: 0,3 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: Het product is weinig doeltreffend tegen *Aphis nasturtii*.

winterkoolzaad (*Brassica napus* ssp.)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: bloemknoppen gevormd, nog omhuld door bladeren - eerste kroonbladeren zichtbaar, bloemknoppen nog gesloten ('gele knop') (BBCH 50-59)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: koolzaadglanskever (*Meligethes aeneus*, *M. viridescens*)

Toepassingsstadium: volgens waarschuwingen of bij het verschijnen van de eerste symptomen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

aardappelpootgoedteelt (*Solanum tuberosum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: zaaizaadproductie

Toepassingsstadium: 30% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bessen van eerste vruchtgestel nog oker tot bruinachtig gekleurd (BBCH 33-85)

Wachtijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Toepassingsstadium: volgens waarschuwingen of bij het verschijnen van de eerste symptomen

Dosis: 0,3 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: Het product is weinig doeltreffend tegen *Aphis nasturtii*.

kerstsparren (niet bestemd voor consumptie) (*Picea et Abies*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsseizoen: voorjaar

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met 75% driftreducerende techniek

Ter bestrijding van: galluizen (chermes-, sparappel-, dennewolluis) (*Adelgidae*)

Dosis: 40 ml/100 l

Aantal toepassingen: 1

In menging met: uitvloeier

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: De vermelde dosis verdunnen naar ten minste 1000 l/ha.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Dosis: 40 ml/100 l

Aantal toepassingen: 1

In menging met: uitvloeier

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: De vermelde dosis verdunnen naar ten minste 1000 l/ha.

UITBREIDING VAN DE TOELATING VOOR KLEINE TOEPASSINGEN (in toepassing van Artikel 51 van Verordening (EG) nr. 1107/2009).

Voor deze uitbreidingen valt het gebruik van het product onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Omdat er slechts beperkte werkzaamheid- en fytotoxiciteitsgegevens werden geëvalueerd, wordt er aangeraden een test uit te voeren voordat het product wordt gebruikt.

aardbeien (*Fragaria x ananassa*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: productieveld

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: trips (*Thysanoptera*)

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

aardbeien (*Fragaria x ananassa*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: selectie- en vermeerderingsveld

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: trips (*Thysanoptera*)

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

rode biet (kroten) (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

pastinaak (*Pastinaca sativa*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

knolselder (*Apium graveolens* var. *rapaceum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

radijs (*Raphanus sativus* var. *radicula*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1



Toepassingstechniek: bespuiting

rammenas en rettich (*Raphanus sativus* var. *niger*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

schorseneren (*Scorzonera hispanica*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

koolrapen (*Brassica napus* subsp. *rapifera*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting



raap (stoppelraap, meiraap) (*Brassica rapa subsp. rapa*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

mierikswortel (*Armoracia rusticana*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

aardpeer (*Helianthus tuberosus*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting



witloofwortelteelt (*Cichorium intybus* var. *foliosum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

wortelpeterselie en wortelkervel (consumptie wortels) (*Petroselinum crispum* var. *tuberosum* & *Chaerophyllum bulbosum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

winteremmer (*Triticum turgidum* subsp. *dicoccon*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 30-59)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: galmuggen (*Cecidomyiidae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

winterremmer (*Triticum turgidum subsp. dicoccon*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsseizoen: najaar

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Toepassingsstadium: volgens waarschuwingen of bij het verschijnen van de eerste symptomen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

winterremmer (*Triticum turgidum subsp. dicoccon*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: $\geq$ BBCH 61 (begin bloei: eerste helmknoppen zichtbaar)

Wachttijd voor de oogst: 42 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,15 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

zomerremmer (*Triticum turgidum subsp. dicoccon*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste



internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit
schede tevoorschijn (BBCH 30-59)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: galmuggen (*Cecidomyiidae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

zomeremmer (*Triticum turgidum* subsp. *dicoccon*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: $\geq$ BBCH 61 (begin bloei: eerste helmknoppen zichtbaar)

Wachttijd voor de oogst: 42 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,15 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

wintereenkoorn (*Triticum monococcum* subsp. *monococcum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste
internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit
schede tevoorschijn (BBCH 30-59)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: galmuggen (*Cecidomyiidae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2



Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

wintereenkoorn (*Triticum monococcum subsp. monococcum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsseizoen: najaar

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Toepassingsstadium: volgens waarschuwingen of bij het verschijnen van de eerste symptomen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

wintereenkoorn (*Triticum monococcum subsp. monococcum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: $\geq$ BBCH 61 (begin bloei: eerste helmknoppen zichtbaar)

Wachttijd voor de oogst: 42 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,15 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

zomereenkoorn (*Triticum monococcum subsp. monococcum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoeingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 30-59)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek



Ter bestrijding van: galmuggen (*Cecidomyiidae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

zomereenkoorn (*Triticum monococcum subsp. monococcum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: $\geq$ BBCH 61 (begin bloei: eerste helmknoppen zichtbaar)

Wachtijd voor de oogst: 42 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,15 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

winterkhorasan (*Triticum turgidum subsp. turanicum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoeingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 30-59)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: galmuggen (*Cecidomyiidae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting



winterkhorasan (*Triticum turgidum subsp. turanicum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsseizoen: najaar

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Toepassingsstadium: volgens waarschuwingen of bij het verschijnen van de eerste symptomen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

winterkhorasan (*Triticum turgidum subsp. turanicum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: $\geq$ BBCH 61 (begin bloei: eerste helmknoppen zichtbaar)

Wachttijd voor de oogst: 42 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,15 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

zomerkhorasan (*Triticum turgidum subsp. turanicum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 30-59)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek



Ter bestrijding van: galmuggen (*Cecidomyiidae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

zomerkhorasan (*Triticum turgidum subsp. turanicum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: $\geq$ BBCH 61 (begin bloei: eerste helmknoppen zichtbaar)

Wachtijd voor de oogst: 42 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,15 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

winterdurum (*Triticum durum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 30-59)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: galmuggen (*Cecidomyiidae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting



winterdurum (*Triticum durum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsseizoen: najaar

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Toepassingsstadium: volgens waarschuwingen of bij het verschijnen van de eerste symptomen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

winterdurum (*Triticum durum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: $\geq$ BBCH 61 (begin bloei: eerste helmknoppen zichtbaar)

Wachttijd voor de oogst: 42 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,15 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

zomerdurum (*Triticum durum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 30-59)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: galmuggen (*Cecidomyiidae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

zomerdurum (*Triticum durum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: $\geq$ BBCH 61 (begin bloei: eerste helmknoppen zichtbaar)

Wachttijd voor de oogst: 42 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 0,15 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

bataat (zoete aardappel) (*Ipomoea batatas* var. *edulis*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

VERPAKKINGEN

Dit product mag alleen op de markt worden gebracht in de volgende verpakkingen:

Type: fles	Materiaal: HDPE/EVOH
-------------------	-----------------------------

<u>Volume van de verpakking:</u> 1 l	<u>Inhoud van de verpakking:</u> 1 l
--------------------------------------	--------------------------------------

<u>Volume van de verpakking:</u> 5 l	<u>Inhoud van de verpakking:</u> 5 l
--------------------------------------	--------------------------------------

Type: fles	Materiaal: HDPE/PA
-------------------	---------------------------

<u>Volume van de verpakking:</u> 1 l	<u>Inhoud van de verpakking:</u> 1 l
--------------------------------------	--------------------------------------

Type: fles	Materiaal: f-HDPE
-------------------	--------------------------

<u>Volume van de verpakking:</u> 1 l	<u>Inhoud van de verpakking:</u> 1 l
--------------------------------------	--------------------------------------

<u>Volume van de verpakking:</u> 5 l	<u>Inhoud van de verpakking:</u> 5 l
--------------------------------------	--------------------------------------

OMSCHRIJVING VAN DE TEELTEN

druivelaars (voor wijnproductie) (*Vitis vinifera*): wijnstokken waarvan de oogst bestemd is voor wijnproductie, alle variëteiten

druivelaars (tafeldruiven) (*Vitis vinifera*): wijnstokken waarvan de oogst bestemd is voor consumptie, alle variëteiten

aardbeien (*Fragaria × ananassa*): productieveld: aardbeien waarvan de oogst bestemd is voor consumptie, alle variëteiten; selectie- en vermeerderingsveld: gewas geteeld voor selectie of vermeerdering, alle variëteiten, de oogst mag niet gebruikt worden voor consumptie.

rode biet (kroten) (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva*): alle variëteiten

pastinaak (*Pastinaca sativa*): alle variëteiten

knolselder (*Apium graveolens var. rapaceum*): alle variëteiten

radijs (*Raphanus sativus var. radicola*): radijs met een overwegend rode of witte schil, weinig pikante smaak, alle variëteiten

rammenas en rettich (*Raphanus sativus var. niger*): radijs met een overwegend rode, witte of zwarte schil, zeer pikante smaak, alle variëteiten (mierikswortel is niet inbegrepen)

schorseneren (*Scorzonera hispanica*): alle variëteiten

koolrapen (*Brassica napus subsp. rapifera*): alle variëteiten

raap (stoppelraap, meiraap) (*Brassica rapa subsp. rapa*): alle variëteiten

mierikswortel (*Armoracia rusticana*): alle variëteiten

aardpeer (*Helianthus tuberosus*): alle variëteiten

witloofwortelteelt (*Cichorium intybus var. foliosum*): Voor de behandeling van het gewas op het veld; alle variëteiten voor de productie van witloof en roodlof.

wortelpeterselie en wortelkervel (consumptie wortels) (*Petroselinum crispum var. tuberosum* & *Chaerophyllum bulbosum*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

wintertarwe (*Triticum aestivum (winter)*): alle variëteiten

zomertarwe (*Triticum aestivum (spring)*): alle variëteiten

wintergerst (*Hordeum vulgare (winter)*): alle variëteiten

winterrogge (*Secale cereale (winter)*): alle variëteiten

winterhaver (*Avena sativa (winter)*): alle variëteiten

wintertriticale (*Triticale × Secale (winter)*): alle variëteiten

zomertriticale (*Triticale × Secale (spring)*): alle variëteiten



winterspelt (*Triticum spelta* (*winter*)): alle variëteiten

zomerspelt (*Triticum spelta* (*spring*)): alle variëteiten

winteremmer (*Triticum turgidum* subsp. *dicoccon*): alle variëteiten

zomeremmer (*Triticum turgidum* subsp. *dicoccon*): alle variëteiten

wintereenkoorn (*Triticum monococcum* subsp. *monococcum*): alle variëteiten

zomereenkoorn (*Triticum monococcum* subsp. *monococcum*): alle variëteiten

winterkhorasan (*Triticum turgidum* subsp. *turanicum*): alle variëteiten

zomerkhorasan (*Triticum turgidum* subsp. *turanicum*): alle variëteiten

winterdurum (*Triticum durum*): alle variëteiten

zomerdurum (*Triticum durum*): alle variëteiten

aardappelen (*Solanum tuberosum*): primeur- en bewaaraardappelen

bataat (zoete aardappel) (*Ipomoea batatas* var. *edulis*): alle variëteiten

winterkoolzaad (*Brassica napus* ssp.): alle variëteiten

aardappelpootgoedteelt (*Solanum tuberosum*): Aardappelen die gekweekt worden om als pootgoed te gebruiken, alle variëteiten. Bovenmaats pootgoed mag verkocht worden voor consumptie.

kerstsparren (niet bestemd voor consumptie) (*Picea et Abies*): alle soorten en variëteiten, niet bestemd voor consumptie