

2. Samenstelling en vorm2.1. Algemene bepalingen :

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening Nr. 1107/2009 moeten de samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de bij de aanvraag of later verstrekte gegevens.

2.2. Werkzame stof(fen) en gewaarborgde gehalte(n) :

ABAMECTINE

18 g/l

Algemene opmerking

/

2.3. Formuleringstype : EC (Emulgeerbaar concentraat)3. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Zie bijlage

4. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen4.1. Gevarencategorie(ën) : schadelijk, irriterend, sensibiliserend, en milieugevaarlijk

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) Nr. 547/2011 van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen en het KB van 28/02/1994 tot regeling van de indeling en de verpakking moeten de volgende vermeldingen op het etiket vermeld worden.

4.2. De volgende symbolen van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG of van de bijlage XIV van het KB van 28/02/1994 en het KB van 11/01/1193 tot regeling van de indeling en de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op de markt brengen of het gebruik ervan :

Xn, N

4.3. De volgende R en S zinnen van de bijlage XIII van het KB van 28/02/1994 :

4.3.1. R22-R43-R48/22-R50/53

4.3.2. S2-S13-S20/21-S23-S36/37-S46-S35-S61

4.4. Aantal punten toegekend in toepassing van art. 2bis §1 van het KB van 14/01/2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten :

5

4.5. Andere vermeldingen :

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
- SPo2: Was alle beschermende kleding na gebruik.
- SPe8: Gevaarlijk voor bijen en hommels. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande

gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen of hommels. Gebruik dit product ook niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. U dient een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen (zie risicobeperkende maatregelen).

- De code voor de werkwijze van abamectine is 6.
- SPa1 : Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product of elk ander product met eenzelfde code afwisselen met producten die uitsluitend een andere code dragen.
- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.
- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.
- SPE3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie risicobeperkende maatregelen).
- SPE3: Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten te beschermen, dient u een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen (zie risicobeperkende maatregelen).

5. Geldigheidsduur van de toelating

5.1. Geldigheidsduur : vanaf 19/10/2017 tot en met 30/04/2020

5.2. Bijzondere voorwaarden voor de verlenging :

/

Deze toelating vervangt elke voorgaande toelating betreffende dit product.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:

De toelating is slechts geldig voor zover mij de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

GUELTON O.
Celhoofd Toelatingen

Bijlage 1

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden :

Te behandelen	: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht)
Opmerking	: - Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort: Hedera en Cornus - max. 1 toepassing/12 maanden
Ter bestrijding van	: weekhuidmijten(Tarsonemidae)
Dosis / Concentratie	: 50 ml/100 l, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: galmijten en roestmijten(Eriophyidae)
Dosis / Concentratie	: 50 ml/100 l, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 50 ml/100 l, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 50 ml/100 l, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 50 ml/100 l, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Te behandelen	: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming)
Opmerking	: - Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort: Hedera en Cornus - max. 3 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: weekhuidmijten(Tarsonemidae)
Dosis / Concentratie	: 50 ml/100 l, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: galmijten en roestmijten(Eriophyidae)
Dosis / Concentratie	: 50 ml/100 l, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 50 ml/100 l, 1-3 toepassingen in blok met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 50 ml/100 l, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 50 ml/100 l, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie) (open lucht)
Opmerking	: Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort: Hedera en Cornus
Ter bestrijding van	: bladvlooiën(Psyllidae)
Dosis / Concentratie	: 50 ml/100 l, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met minimum 90% driftreducerende techniek

Te behandelen	: sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming)
Opmerking	: Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort: Hedera en Cornus
Ter bestrijding van	: bladvlooiën(Psyllidae)
Dosis / Concentratie	: 50 ml/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: perenbomen (open lucht)
Toepassingsstadium	: niet tijdens de bloei (< BBCH 60 of > BBCH 70)
Opmerking	: - max. 1 toepassing/12 maanden - De maximale boomhoogte die behandeld mag worden is 2 meter.
Ter bestrijding van	: perenbladvlo(Psylla pyricola + P. piri)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha haag, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 28 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met minimum 99% driftreducerende techniek
Te behandelen	: aardbeien (productieveld) (open lucht)
Opmerking	: max. 1 toepassing/12 maanden
Ter bestrijding van	: aardbeimijt(Tarsonemus fragariae (Tarsonemus pallidus))
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Toepassingsstadium	: larve
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek
Te behandelen	: aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht)
Opmerking	: max. 1 toepassing/12 maanden
Ter bestrijding van	: aardbeimijt(Tarsonemus fragariae (Tarsonemus pallidus))
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Toepassingsstadium	: larve
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek
Te behandelen	: aardbeien (productieveld) (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: max. 3 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-3 toepassingen in blok met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: aardbeimijt(Tarsonemus fragariae (Tarsonemus pallidus))
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: max. 3 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: aardbeimijt(Tarsonemus fragariae (Tarsonemus pallidus))
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-3 toepassingen in blok met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: frambozenstruiken (open lucht)
Opmerking	: max. 1 toepassing/12 maanden
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,23 l/ha haag, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: galmpjes en roestmijten(Eriophyidae)
Dosis / Concentratie	: 0,23 l/ha haag, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,23 l/ha haag, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Te behandelen	: braamstruiken (open lucht)
Opmerking	: max. 1 toepassing/12 maanden
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,23 l/ha haag, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: galmpjes en roestmijten(Eriophyidae)
Dosis / Concentratie	: 0,23 l/ha haag, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,23 l/ha haag, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met minimum 90% driftreducerende techniek

Te behandelen : **augurk (onder bescherming)**
 Toepassingsstadium : 1 maart tot en met 31 oktober
 Opmerking : max. 3 toepassingen/teelt

Ter bestrijding van : mineervliegen(Agromyzidae)
 Dosis / Concentratie : 0,3 l/ha haag (verticale teelt) of 0,75 l/ha (horizontale teelt), 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen

Ter bestrijding van : spintmijten(Tetranychidae)
 Dosis / Concentratie : 0,3 l/ha haag (verticale teelt) of 0,75 l/ha (horizontale teelt), 1-3 toepassingen in blok met een interval van 7 dagen

Ter bestrijding van : trips(Thysanoptera)
 Dosis / Concentratie : 0,3 l/ha haag (verticale teelt) of 0,75 l/ha (horizontale teelt), 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen

Veiligheidstermijn : 3 dagen
 Risicobeperkende maatregelen : /

Te behandelen : **courgette/patisson (onder bescherming)**
 Toepassingsstadium : 1 maart tot en met 31 oktober
 Opmerking : max. 3 toepassingen/teelt

Ter bestrijding van : mineervliegen(Agromyzidae)
 Dosis / Concentratie : 0,3 l/ha haag (verticale teelt) of 0,75 l/ha (horizontale teelt), 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen

Ter bestrijding van : spintmijten(Tetranychidae)
 Dosis / Concentratie : 0,3 l/ha haag (verticale teelt) of 0,75 l/ha (horizontale teelt), 1-3 toepassingen in blok met een interval van 7 dagen

Ter bestrijding van : trips(Thysanoptera)
 Dosis / Concentratie : 0,3 l/ha haag (verticale teelt) of 0,75 l/ha (horizontale teelt), 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen

Veiligheidstermijn : 3 dagen
 Risicobeperkende maatregelen : /

Te behandelen : **aubergine/eierplant en pepino (onder bescherming)**
 Opmerking : max. 3 toepassingen/teelt

Ter bestrijding van : spintmijten(Tetranychidae)
 Dosis / Concentratie : 0,3 l/ha haag, 1-3 toepassingen in blok met een interval van 7 dagen

Ter bestrijding van : mineervliegen(Agromyzidae)
 Dosis / Concentratie : 0,3 l/ha haag, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen

Ter bestrijding van : trips(Thysanoptera)
 Dosis / Concentratie : 0,3 l/ha haag, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen

Veiligheidstermijn : 3 dagen
 Risicobeperkende maatregelen : /

Te behandelen	: komkommer (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: max. 3 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,3 l/ha haag, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,3 l/ha haag, 1-3 toepassingen in blok met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,3 l/ha haag, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: paprika/spaanse peper (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: max. 3 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha haag, 1-3 toepassingen in blok met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha haag, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,2 l/ha haag, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: tomaten (onder bescherming)
Opmerking	: max. 3 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,3 l/ha haag, 1-3 toepassingen in blok met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,3 l/ha haag, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,3 l/ha haag, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: slasoorten (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: max. 3 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen

Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: veldsla (open lucht)
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek
Te behandelen	: veldsla (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: prei (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek
Te behandelen	: uien (drooggeogste) (open lucht)
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek
Te behandelen	: sjalot (open lucht)
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek
Te behandelen	: knoflook (open lucht)
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek
Te behandelen	: radijs (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: rammenas en rettich (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: stamslabonen (prinsessen-, snijbonen) (groengeogst, met peul) (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha (horizontale teelt) of 0,3 l/ha haag (verticale teelt), 1-2 toepassingen in blok met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha (horizontale teelt) of 0,3 l/ha haag (verticale teelt), 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha (horizontale teelt) of 0,3 l/ha haag (verticale teelt), 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: babyleaf (geogst tot het stadium 8 bladeren) (onder bescherming)
Opmerking	: om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing/snedes
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: babyleaf (geogst tot het stadium 8 bladeren) (open lucht)
Opmerking	: om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen

Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing/snedes
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek
Te behandelen	: pompoen (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: max. 3 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-3 toepassingen in blok met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: meloen (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: max. 3 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha (horizontale teelt) of 0,3 l/ha haag (verticale teelt), 1-3 toepassingen in blok met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha (horizontale teelt) of 0,3 l/ha haag (verticale teelt), 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha (horizontale teelt) of 0,3 l/ha haag (verticale teelt), 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: selderij (bleek-, groene en witte) (open lucht)
Opmerking	: max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek

Te behandelen	: knolvenkel (open lucht)
Opmerking	: max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek
Te behandelen	: engelwortel (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: engelwortel (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek
Te behandelen	: lavas, maggiplant (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 4 toepassingen/teelt

Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: lavas, maggiplant (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek
Te behandelen	: dille (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: dille (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek
Te behandelen	: koriander (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: koriander (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek
Te behandelen	: snijselder (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen

Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: snijselder (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek
Te behandelen	: kervel (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: kervel (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek
Te behandelen	: peterselie (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: peterselie (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek
Te behandelen	: dragon (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen

Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: dragon (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek
Te behandelen	: citroenmelisse (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: citroenmelisse (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen

Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek
Te behandelen	: rozemarijn (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: rozemarijn (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek
Te behandelen	: laurier (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen

Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: laurier (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek
Te behandelen	: karwij (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: karwij (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek

Te behandelen	: zuring (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: zuring (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek
Te behandelen	: gewone bernagie (consumptie van de bloemen) (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /

Te behandelen	: gewone bernagie (consumptie van de bloemen) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek
Te behandelen	: bieslook (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: bieslook (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek

Te behandelen	: basilicum (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: basilicum (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek
Te behandelen	: munt (consumptie bladeren en/of stengels)(onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /

Te behandelen	: munt (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek
Te behandelen	: marjolein/oregano (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: marjolein/oregano (consumptie bladeren en/of stengels)(open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek

Te behandelen	: salie (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: salie (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek
Te behandelen	: tijm (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /

Te behandelen	: tijm (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek
Te behandelen	: tuinkers en andere kiemen en scheuten (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: tuinkers en andere kiemen en scheuten (open lucht)
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek
Te behandelen	: rucola (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen

Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: rucola (open lucht)
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek
Te behandelen	: rode amsoi (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: rode amsoi (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek
Te behandelen	: aalbessen (witte, rode, zwarte) (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor de vruchtvorming (< BBCH 70)
Opmerking	: max. 1 toepassing/12 maanden

Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,23 l/ha haag, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: bessenrondknopmijt(Eriophyes ribis)
Dosis / Concentratie	: 0,23 l/ha haag, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 28 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Te behandelen	: stekelbes (kruisbes) en kruisingen (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor de vruchtvorming (< BBCH 70)
Opmerking	: max. 1 toepassing/12 maanden
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,23 l/ha haag, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: bessenrondknopmijt(Eriophyes ribis)
Dosis / Concentratie	: 0,23 l/ha haag, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 28 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Te behandelen	: blauwe / rode bosbessen (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor de vruchtvorming (< BBCH 70)
Opmerking	: max. 1 toepassing/12 maanden
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,23 l/ha haag, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: bessenrondknopmijt(Eriophyes ribis)
Dosis / Concentratie	: 0,23 l/ha haag, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 28 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Te behandelen	: veenbessen (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor de vruchtvorming (< BBCH 70)
Opmerking	: max. 1 toepassing/12 maanden
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,23 l/ha haag, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: bessenrondknopmijt(Eriophyes ribis)
Dosis / Concentratie	: 0,23 l/ha haag, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 28 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met minimum 90% driftreducerende techniek
Te behandelen	: frambozenstruiken (onder bescherming)
Opmerking	: max. 2 toepassing/12 maanden
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,23 l/ha haag, 1-2 toepassing met een interval van 14 dagen
Ter bestrijding van	: frambozengalmijt(Aceria gracilis (Phyllocoptes gracilis))
Dosis / Concentratie	: 0,23 l/ha haag, 1-2 toepassing met een interval van 14 dagen

Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: braamstruiken (onder bescherming)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: spintmijten(Tetranychidae)
Dosis / Concentratie	: 0,23 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen
Ter bestrijding van	: frambozengalmijt(Aceria gracilis (Phyllocoptes gracilis))
Dosis / Concentratie	: 0,23 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: Chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: 1 maart tot en met 31 oktober
Opmerking	: max. 3 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 21 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: Chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna (open lucht)
Opmerking	: max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: mineervliegen(Agromyzidae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 21 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 2 m met minimum 75% driftreducerende techniek

Algemene opmerking :

Een ha standaardboomgaard is een boomgaard van een ha grondoppervlakte, beplant met bomen in productie (behalve op de rijuiteinden, de zgn. wendakkers) van 3 m hoog in enkele rijen op een onderlinge afstand van 3,5 m die aan beide zijden worden bespoten.

Bijlage 2

CLP-etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 en
Verordening (EG) Nr. 547/2011

Signaalwoorden :

Waarschuwing

Gevarenpictogrammen en hun GHS-code :Gevarenaanduidingen (H-zinnen):

H302	H317	H319	H373
H410			

Aanvullende informatie(EUH-zinnen) :

EUH210	EUH401
--------	--------

Standaardzinnen bijzondere risico's (R SH-zinnen) :Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) :

P102	P261	P270	P272
P280	P301	P330	P363
P391	P302+P352	P305+P351+P338	P308-P311
P501			