

Dossiernummer: 23325

Datum: 06/08/2021

TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL

Betreft: Migratie (corrigendum dosis)

Handelsbenaming:

TOPAZ

Toelatingsnummer:

7579P/B

Gebruikerscategorie: uitsluitend bestemd voor **PROFESSIONEEL** gebruik

Toelatingshouder:

Syngenta Crop Protection

Naamloze vennootschap

Louizalaan 489

1050 Brussel

BELGIË

Aard van het middel: **Fungicide**

Formuleringstype: **EC (Emulgeerbaar concentraat)**

Gewaarborgde gehalten van de werkzame stoffen, synergisten en beschermstoffen:

- **penconazool: 100 g/l (werkzame stof)**

Deze toelating is geldig van **05/08/2021** tot en met **31/12/2022** en vervangt elke voorafgaande toelatingsakte voor dit product.

Toegekende punten voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage in toepassing van het koninklijk besluit van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten: **4,4**.

Het product, voor zover het voldoet aan alle voorwaarden vastgesteld in deze toelatingsakte en haar bijlage, is toegelaten in toepassing van:

- de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21/10/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;
- het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:
De toelating is slechts geldig voor zover de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden aan de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

Dossierbeheerder: Sara Debecker
E-mail: Sara.Debecker@health.fgov.be
Tel: 02 524 73 89
Fax: /
Site: www.fytoweb.be

BIJLAGE

INDELING EN ETIKETTERING VAN HET PRODUCT

Onverminderd de bepalingen inzake indeling en/of etikettering van:

- de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006;
- de Verordening (EU) Nr. 547/2011 van de Commissie van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen;
- Het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik;

moeten de volgende vermeldingen op het etiket van het product vermeld worden:

Indeling en etikettering in overeenstemming met Verordening (EG) nr 1272/2008

Gevarenklassen en -categoriecën:

- Niet van toepassing

Signaalwoord :

- WAARSCHUWING

GHS-codes en gevarenpictogrammen :

- GHS07: Schadelijk 
- GHS08: Gezondheidsschadelijk op lange termijn 
- GHS09: Milieugevaarlijk 

Gevarenaanduidingen (H zinnen):

- H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
- H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (P zinnen):

- P263: Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.
- P280: Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming.
- P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
- P308 + P311: NA (mogelijke) blootstelling: Het ANTIGIFCENTRUM of een arts



- raadplegen.
- P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.

Aanvullende gevareninformatie (EUH zinnen) :

- EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Zinnen volgens Verordening (EG) nr. 1107/2009 of (EU) nr. 547/2011

Standaardzinnen voor veiligheidsadviezen (SP zinnen):

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 3.
- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Andere voorwaarden/nationale zinnen

- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn (en) te verkorten.
- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

GEBRUIKEN

De toepassingen waarvoor het product is toegelaten en de specifieke voorwaarden waaronder het product gebruikt mag worden:

appelbomen (*Malus domestica*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 3 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Podosphaera leucotricha*)

Dosis: 0,17 l/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

druivelaars (voor wijnproductie) (*Vitis vinifera*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 35 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 3 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Uncinula necator*)

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 0,14 l/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Toepassingstechniek: Bespuiting

druivelaars (tafeldruiven) (*Vitis vinifera*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 35 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 3 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Uncinula necator*)

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 0,14 l/ha haag
Aantal toepassingen: 1 tot 3
Toepassingstechniek: Bespuiting

aardbeien (*Fragaria x ananassa*)

Locatie van het gewas: onder bescherming
Gewastype: productieveld

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/12 maanden

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Podosphaera aphanis*)

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 ml/10 l/100 m²

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

Ter bestrijding van: rode vlekkenziekte (*Diplocarpon earlianum*)

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 ml/10 l/100 m²

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

aardbeien (*Fragaria x ananassa*)

Locatie van het gewas: onder bescherming
Gewastype: productieveld

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Opmerking:

Het gebruik is enkel toegelaten in gesloten waterrecirculatiesystemen. Het door het product gecontamineerde water mag in geen enkel geval in contact komen met het oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Podosphaera aphanis*)

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 ml/10 l/100 m²

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

Ter bestrijding van: rode vlekkenziekte (*Diplocarpon earlianum*)

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 ml/10 l/100 m²

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

aardbeien (*Fragaria x ananassa*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: selectie- en vermeerderingsveld

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Podosphaera aphanis*)

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 ml/10 l/100 m²

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

Ter bestrijding van: rode vlekkenziekte (*Diplocarpon earlianum*)

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 ml/10 l/100 m²

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

aardbeien (*Fragaria x ananassa*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: productieveld

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/12 maanden

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Podosphaera aphanis*)

Toepassingsstadium: preventief



Dosis: 5 ml/10 l/100 m²

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

Ter bestrijding van: rode vlekkenziekte (*Diplocarpon earlianum*)

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 ml/10 l/100 m²

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

aardbeien (*Fragaria x ananassa*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: selectie- en vermeerderingsveld

Maximaal aantal toepassingen: 4 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Podosphaera aphanis*)

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 ml/10 l/100 m²

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

Ter bestrijding van: rode vlekkenziekte (*Diplocarpon earlianum*)

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 5 ml/10 l/100 m²

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

tomaten (*Solanum lycopersicum*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Leveillula taurica*)

Dosis: 0,2 l/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

aubergine/eierplant en pepino (*Solanum melongena* - *Solanum muricatum*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Leveillula taurica*)

Dosis: 0,2 l/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

komkommer (*Cucumis sativus*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Golovinomyces orontii*, *Erysiphe polyphaga*, *E. orontii*, *Sphaerotheca fuliginea*, *Podosphaera xanthii*)

Dosis: 0,2 l/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

augurk (*Cucumis sativus*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Golovinomyces orontii*, *Erysiphe polyphaga*, *E. orontii*, *Sphaerotheca fuliginea*, *Podosphaera xanthii*)

Dosis: 0,2 l/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

courgette/patisson (*Cucurbita pepo*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Golovinomyces orontii*, *Erysiphe polyphaga*, *E. orontii*, *Sphaerotheca fuliginea*, *Podosphaera xanthii*)

Dosis: 0,2 l/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 4

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

courgette/patisson (*Cucurbita pepo*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: echte meeldauw (*Golovinomyces orontii*, *Erysiphe polyphaga*, *E. orontii*, *Sphaerotheca fuliginea*, *Podosphaera xanthii*)

Dosis: 0,5 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: Bespuiting

VERPAKKINGEN

Dit product mag alleen op de markt worden gebracht in de volgende verpakkingen:

Type: bus

Materiaal: PET

Volume van de verpakking: 0,25 l

Inhoud van de verpakking: 0,25 l

Volume van de verpakking: 0,5 l

Inhoud van de verpakking: 0,5 l

Volume van de verpakking: 1 l

Inhoud van de verpakking: 1 l

Type: bus

Materiaal: HDPE/PA

Volume van de verpakking: 0,25 l

Inhoud van de verpakking: 0,25 l

Volume van de verpakking: 0,5 l

Inhoud van de verpakking: 0,5 l

Volume van de verpakking: 1 l

Inhoud van de verpakking: 1 l

Type: bus

Materiaal: f-HDPE

Volume van de verpakking: 5 l

Inhoud van de verpakking: 5 l

OMSCHRIJVING VAN DE TEELTEN

appelbomen (*Malus domestica*): alle variëteiten

druivelaars (voor wijnproductie) (*Vitis vinifera*): wijnstokken waarvan de oogst bestemd is voor wijnproductie, alle variëteiten

druivelaars (tafeldruiven) (*Vitis vinifera*): wijnstokken waarvan de oogst bestemd is voor consumptie, alle variëteiten

aardbeien (*Fragaria × ananassa*): productieveld: aardbeien waarvan de oogst bestemd is voor consumptie, alle variëteiten; selectie- en vermeerderingsveld: gewas geteeld voor selectie of vermeerdering, alle variëteiten, de oogst mag niet gebruikt worden voor consumptie.

tomaten (*Solanum lycopersicum*): alle variëteiten, inbegrepen de kerstomaten

aubergine/eierplant en pepino (*Solanum melongena* - *Solanum muricatum*): alle variëteiten

komkommer (*Cucumis sativus*): alle variëteiten

augurk (*Cucumis sativus*): alle variëteiten

courgette/patisson (*Cucurbita pepo*): alle variëteiten van courgette en patisson die geoogst worden wanneer de schil nog eetbaar is en die volledig gegeten worden