



FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DG Dier, Plant en Voeding (DG4)

DIENST
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN
MESTSTOFFEN

SYNGENTA CROP PROTECTION N.V.
POSTBUS 512
4600 AM BERGEN OP ZOOM
NEDERLAND

Correspondent :

DUCHATEAU LAURENCE
Attaché
02 524 7391

Onze referten :

Dossiernummer : 12415

Datum : 15/01/2018

1/66

Betreft : Aanpassing van de etikettering + administratieve verlenging

TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL OF TOEVOEGINGSSTOF

1. Algemene bepalingen van de toelating

In toepassing van de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21/10/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad, en het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, en overeenkomstig het advies van het Erkenningscomité, wordt het product :

KARATE ZEON

met de hieronder vermelde specificaties en voorwaarden toegelaten onder het

nummer : **9231P/B**

voor : **BEROEPSGEBRUIK**

als : Insecticide

op naam van : SYNGENTA CROP PROTECTION N.V.



2. Samenstelling en vorm2.1. Algemene bepalingen :

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening Nr. 1107/2009 moeten de samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de bij de aanvraag of later verstrekte gegevens.

2.2. Werkzame stof(fen) en gewaarborgde gehalte(n) :

LAMBDA-CYHALOTHRIN

100 g/l

Algemene opmerking

/

2.3. Formuleringstype : CS (Capsule suspensie)3. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Zie bijlage

4. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen4.1. Gevarencategorie(ën) : schadelijk, sensibiliserend en milieugevaarlijk

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) Nr. 547/2011 van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen en het KB van 28/02/1994 tot regeling van de indeling en de verpakking moeten de volgende vermeldingen op het etiket vermeld worden.

4.2. De volgende symbolen van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG of van de bijlage XIV van het KB van 28/02/1994 en het KB van 11/01/1193 tot regeling van de indeling en de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op de markt brengen of het gebruik ervan :

Xn, N

4.3. De volgende R en S zinnen van de bijlage XIII van het KB van 28/02/1994 :

4.3.1. R20-R22-R43-R50/53

4.3.2. S2-S13-S20/21-S23-S36/37-S46-S47-S35-S61

4.4. Aantal punten toegekend in toepassing van art. 2bis §1 van het KB van 14/01/2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten :

4

4.5. Andere vermeldingen :

- SP0: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SP02: Was alle beschermende kleding na gebruik.
- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende

maatregelen).

- SPE8: Gevaarlijk voor bijen. Gebruik dit product niet op het ogenblik dat de bijen actief naar voedsel zoeken.
- De soorten en variëteiten van sierteelten die kunnen worden behandeld, worden vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.
- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2:

- Op het etiket te vermelden co-formulanten: 1,2-benzisothiazolin-3-on, Index Nr. 613-088-00-6.
- P280: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
- P411: Bij maximaal 40 °C bewaren.

5. Geldigheidsduur van de toelating

5.1. Geldigheidsduur : vanaf 15/01/2018 tot en met 31/03/2024

5.2. Bijzondere voorwaarden voor de verlenging :

/

Deze toelating vervangt elke voorgaande toelating betreffende dit product.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:

De toelating is slechts geldig voor zover mij de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

GUELTON O.
Celhoofd Toelatingen

Bijlage 1

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden :

Te behandelen	: druivelaars (tafeldruiven) (open lucht)
Opmerking	: max. 3 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: trosrups(Lobesia botrana, Eupocelia ambiguella)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: cicaden(Cicadellidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha haag, 1-3 toepassingen
Ter bestrijding van	: Drosophila suzukii(Drosophila suzukii)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha haag, 1-3 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Te behandelen	: valeriaan (consumptie wortels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladvetende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: pompoen (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvetende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: pompoen (onder bescherming)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladvetende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /

Te behandelen	: meloen (onder bescherming)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha (horizontale teelt) of 0,1 l/ha haag (verticale teelt), 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha (horizontale teelt) of 0,075 l/ha haag (verticale teelt), 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: pompoen (open lucht)
Toepassingsstadium	: Opkomst - 3 bladeren (BBCH 09-13)
Ter bestrijding van	: aardvlooiën(Epitrix sp.)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: snijselder (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: wantsen(Miridae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrodis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: rucola (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen

Ter bestrijding van	: bladvretende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrodis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: meloen (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: Opkomst - 3 bladeren (BBCH 09-13)
Ter bestrijding van	: aardvlooien(Epitrix sp.)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: pompoen (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: Opkomst - 3 bladeren (BBCH 09-13)
Ter bestrijding van	: aardvlooien(Epitrix sp.)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: blauwe / rode bosbessen (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvretende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: Drosophila suzukii(Drosophila suzukii)
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Te behandelen	: veenbessen (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvretende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: Drosophila suzukii(Drosophila suzukii)
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Te behandelen	: kiwibes (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: Drosophila suzukii(Drosophila suzukii)
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Te behandelen	: kervel (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wortelvlieg(Psila rosae)
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: peterselie (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wortelvlieg(Psila rosae)
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: peterselie (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wortelvlieg(Psila rosae)
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /

Te behandelen	: dille (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wortelvlieg(Psila rosae)
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: dille (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: koriander (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wortelvlieg(Psila rosae)
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: koriander (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wortelvlieg(Psila rosae)
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /

Te behandelen	: snijseider (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wortelvlieg(Psila rosae)
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: snijseider (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wortelvlieg(Psila rosae)
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: dille (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wortelvlieg(Psila rosae)
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: citroenmelisse (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

Te behandelen	: citroenmelisse (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: rozemarijn (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: rozemarijn (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen

Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: gewone bernagie (consumptie van de bloemen) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: gewone bernagie (consumptie van de bloemen) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen

Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: engelwortel (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wortelvlieg(Psila rosae)
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: engelwortel (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wortelvlieg(Psila rosae)
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: lavas, maggiplant (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wortelvlieg(Psila rosae)
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: lavas, maggiplant (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wortelvlieg(Psila rosae)
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /

Te behandelen	: karwij (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wortelvlieg(Psila rosae)
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: karwij (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wortelvlieg(Psila rosae)
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: laurier (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrodis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: laurier (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen

Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumatopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: loofbomen en -heesters (sierbomen)(niet bestemd voor consumptie) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 10 ml/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 5-7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Te behandelen	: loofbomen en -heesters (sierbomen)(niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 10 ml/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 5-7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: knolvenkel (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: wantsen(Miridae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumatopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: knolvenkel (onder bescherming)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wantsen(Miridae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen

Ter bestrijding van	: bladvretende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: knolvenkel (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wortelvlieg(Psila rosae)
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: knolvenkel (onder bescherming)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wortelvlieg(Psila rosae)
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: voederbieten (open lucht)
Toepassingsstadium	: opkomst - 10 bladeren (BBCH 09-19)
Opmerking	: max. 3 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bietenkever(Atomaria linearis)
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: bieten aardvlooiën(Chaetocnema)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: suikerbieten (open lucht)
Toepassingsstadium	: opkomst - 10 bladeren (BBCH 09-19)
Opmerking	: max. 3 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bietenkever(Atomaria linearis)
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: bieten aardvlooiën(Chaetocnema)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: voederbieten (open lucht)
Toepassingsstadium	: 2-10 bladeren (BBCH 12-19)
Opmerking	: max. 3 toepassingen/teelt

Ter bestrijding van	: bietenvlieg(<i>Pegomya hyoscyami</i> , <i>P. betae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: suikerbieten (open lucht)
Toepassingsstadium	: 2-10 bladeren (BBCH 12-19)
Opmerking	: max. 3 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bietenvlieg(<i>Pegomya hyoscyami</i> , <i>P. betae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: voederbieten (open lucht)
Opmerking	: max. 3 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(<i>Mamestra</i> , <i>Spodoptera</i> , <i>Autographa</i> , <i>Orthosia</i> , <i>Thaumetopoeidae</i> , <i>Pieris</i> ...)
Toepassingsstadium	: vanaf het waarnemen van de plaag
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: suikerbieten (open lucht)
Opmerking	: max. 3 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(<i>Mamestra</i> , <i>Spodoptera</i> , <i>Autographa</i> , <i>Orthosia</i> , <i>Thaumetopoeidae</i> , <i>Pieris</i> ...)
Toepassingsstadium	: vanaf het waarnemen van de plaag
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardappelpootgoedteelt (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(<i>Aphididae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,075-0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: coloradokever(<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardappelen (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(<i>Aphididae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,075-0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: coloradokever(<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

Te behandelen	: wintertarwe (open lucht)
Toepassingsstadium	: opkomst - stadium oprichten (BBCH 09-30)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomertarwe (open lucht)
Toepassingsstadium	: opkomst - stadium oprichten (BBCH 09-30)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wintertarwe (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin oprichting - aarvorming (BBCH 30-59)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: galmuggen(Cecidomyiidae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomertarwe (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin oprichting - aarvorming (BBCH 30-59)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: galmuggen(Cecidomyiidae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wintertarwe (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin bloei - midden deegrijpheid (BBCH 60-85)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomertarwe (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin bloei - midden deegrijpheid (BBCH 60-85)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek

Te behandelen	: wintergerst (open lucht)
Toepassingsstadium	: opkomst - oprichten (BBCH 09-30)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomergerst (open lucht)
Toepassingsstadium	: opkomst - oprichten (BBCH 09-30)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wintergerst (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin oprichting - aarvorming (BBCH 30-59)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: galmuggen(Cecidomyiidae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomergerst (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin oprichting - aarvorming (BBCH 30-59)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: galmuggen(Cecidomyiidae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterrogge (open lucht)
Toepassingsstadium	: opkomst - oprichten (BBCH 09-30)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomerrogge (open lucht)
Toepassingsstadium	: opkomst - oprichten (BBCH 09-30)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek

Te behandelen	: winterrogge (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin oprichting - aarvorming (BBCH 30-59)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: galmuggen(Cecidomyiidae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomerrogge (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin oprichting - aarvorming (BBCH 30-59)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: galmuggen(Cecidomyiidae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterrogge (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin bloei - midden deegrijpheid (BBCH 60-85)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomerrogge (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin bloei - midden deegrijpheid (BBCH 60-85)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterhaver (open lucht)
Toepassingsstadium	: opkomst - oprichten (BBCH 09-30)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomerhaver (open lucht)
Toepassingsstadium	: opkomst - oprichten (BBCH 09-30)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek

Te behandelen	: winterhaver (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin oprichting - aarvorming (BBCH 30-59)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: galmuggen(Cecidomyiidae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomerhaver (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin oprichting - aarvorming (BBCH 30-59)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: galmuggen(Cecidomyiidae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterhaver (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin bloei - midden deegrijpheid (BBCH 60-85)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomerhaver (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin bloei - midden deegrijpheid (BBCH 60-85)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Te behandelen	: triticale (open lucht)
Toepassingsstadium	: opkomst - oprichten (BBCH 09-30)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Te behandelen	: triticale (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin oprichting - aarvorming (BBCH 30-59)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: galmuggen(Cecidomyiidae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek

Te behandelen	: triticale (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin bloei - midden deegrijpheid (BBCH 60-85)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Te behandelen	: spelt (open lucht)
Toepassingsstadium	: opkomst - oprichten (BBCH 09-30)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Te behandelen	: spelt (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin oprichting - aarvorming (BBCH 30-59)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: galmuggen(Cecidomyiidae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Te behandelen	: spelt (open lucht)
Toepassingsstadium	: begin bloei - midden deegrijpheid (BBCH 60-85)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Te behandelen	: perenbomen (open lucht)
Toepassingsstadium	: na de bloei - eerste bloemknoppen zichtbaar (BBCH70-55)
Opmerking	: - Dit product heeft een nevenwerking tegen rode spin (Panonychus ulmi). - max. 2 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 30 m met 90% driftreducerende techniek
Te behandelen	: kersen- en kriekenbomen (open lucht)
Opmerking	: - Dit product heeft een nevenwerking tegen rode spin (Panonychus ulmi). - max. 2 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van	: <i>Drosophila suzukii</i> (<i>Drosophila suzukii</i>)
Toepassingsstadium	: vanaf het waarnemen van de insecten
Dosis / Concentratie	: 0,050 l/ha haag (laagstam) of 0,005 l/100 l (hoogstam), 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladrollers(<i>Cacoecia</i> , <i>Spilonota</i> , <i>Argyroplote</i> , <i>Pandemis</i> , <i>Notocelia</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha haag (laagstam) of 0,01 l/100 l (hoogstam), 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(<i>Aphididae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha haag (laagstam) of 0,0075 l/100 l (hoogstam), 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(<i>Mamestra</i> , <i>Spodoptera</i> , <i>Autographa</i> , <i>Orthosia</i> , <i>Thaumetopoeidae</i> , <i>Pieris</i> ...)
Dosis / Concentratie	: 0,050 l/ha haag (laagstam) of 0,005 l/100 l (hoogstam), 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: mineermotten(<i>Gracillariidae</i> / <i>Depressariidae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha haag (laagstam) of 0,01 l/100 l (hoogstam), 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 30 m met 90% driftreducerende techniek
Te behandelen	: pruimenbomen (open lucht)
Opmerking	: - Dit product heeft een nevenwerking tegen rode spin (<i>Panonychus ulmi</i>). - max. 2 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: <i>Drosophila suzukii</i> (<i>Drosophila suzukii</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha haag (laagstam) of 0,005 l/100 l (hoogstam), 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladrollers(<i>Cacoecia</i> , <i>Spilonota</i> , <i>Argyroplote</i> , <i>Pandemis</i> , <i>Notocelia</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha haag (laagstam) of 0,01 l/100 l (hoogstam), 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(<i>Aphididae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha haag (laagstam) of 0,0075 l/100 l (hoogstam), 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(<i>Mamestra</i> , <i>Spodoptera</i> , <i>Autographa</i> , <i>Orthosia</i> , <i>Thaumetopoeidae</i> , <i>Pieris</i> ...)
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha haag (laagstam) of 0,005 l/100 l (hoogstam), 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: mineermotten(<i>Gracillariidae</i> / <i>Depressariidae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha haag (laagstam) of 0,01 l/100 l (hoogstam), 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 30 m met 90% driftreducerende techniek
Te behandelen	: groengeoogste erwten (met peul) (open lucht)
Opmerking	: - Dit product heeft een nevenwerking tegen galmuggen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(<i>Aphididae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van	: erwtenpeulboorder(<i>Laspeyresia nigricana</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: bladrandkever(<i>Sitona lineatus</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: groengeoogste erwten (met peul) (open lucht)
Toepassingsstadium	: opkomst - 5 bladeren (BBCH 09-15)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: trips(<i>Thysanoptera</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: groengeoogste erwten (zonder peul) (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladrandkever(<i>Sitona lineatus</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: bladluizen(<i>Aphididae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: erwtenpeulboorder(<i>Laspeyresia nigricana</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: groengeoogste erwten (zonder peul) (open lucht)
Toepassingsstadium	: opkomst - 5 bladeren (BBCH 09-15)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: trips(<i>Thysanoptera</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: drooggeoogste erwten (zonder peul) (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(<i>Aphididae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: erwtenpeulboorder(<i>Laspeyresia nigricana</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: bladrandkever(<i>Sitona lineatus</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 28 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: drooggeoogste erwten (zonder peul) (open lucht)
Toepassingsstadium	: opkomst - 5 bladeren (BBCH 09-15)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: trips(<i>Thysanoptera</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1 toepassing

Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (drooggeogst) (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bonenkevers(Bruchus sp.)
Dosis / Concentratie	: 0,063 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladrandkever(Sitona lineatus)
Dosis / Concentratie	: 0,063 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,063 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (groengeogst, zonder peul) (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bonenkevers(Bruchus sp.)
Dosis / Concentratie	: 0,063 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladrandkever(Sitona lineatus)
Dosis / Concentratie	: 0,063 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,063 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterkoolzaad (open lucht)
Toepassingsstadium	: ontwikkeling van de bloemknoppen - ontwikkeling van de peulen (BBCH 50-75)
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - max. 1 toepassing in BBCH 50-75
Ter bestrijding van	: koolzaadglanskever(Meligethes aeneus, M. viridescens)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: koolzaadsnuitkever(Ceutorrhynchus assimilis)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 42 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomerkoolzaad (open lucht)
Toepassingsstadium	: ontwikkeling van de bloemknoppen - ontwikkeling van de peulen (BBCH 50-75)
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - Dit product heeft een nevenwerking tegen de koolzaadmug (Dasineura brassicae).

Ter bestrijding van	: koolzaadglanskever(<i>Meligethes aeneus</i> , <i>M. viridescens</i>)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: koolzaadsnuitkever(<i>Ceutorrhynchus assimilis</i>)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 42 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterkoolzaad (open lucht)
Toepassingsstadium	: opkomst - 3 bladeren (BBCH 09-13)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: koolzaadaardvlo(<i>Psylliodes chrysocephala</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: vlas (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: aardvlooien(<i>Epitrix</i> sp.)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: trips(<i>Thysanoptera</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 42 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: prei (productieveld) (open lucht)
Toepassingsstadium	: na het planten
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: trips(<i>Thysanoptera</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: preimot(<i>Acrolepia assectella</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: aardrupsen(<i>Agrotis</i> , <i>Noctua</i> , <i>Euxoa</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Ter bestrijding van	: mineervliegen(<i>Agromyzidae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: prei (zaaibed) (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: trips(<i>Thysanoptera</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: preimot(<i>Acrolepia assectella</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: mineervliegen(<i>Agromyzidae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen

Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: courgette/patisson (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - enkel als correctiebehandeling
Ter bestrijding van	: bladvtretende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha (horizontale teelt) of 0,075 l/ha haag (vertikale teelt), 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha (horizontale teelt) of 0,1 l/ha haag (vertikale teelt), 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: courgette/patisson (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: opkomst - 3 bladeren (BBCH 09-13)
Opmerking	: - maximum 2 toepassingen per teelt - enkel als correctiebehandeling
Ter bestrijding van	: aardvlooien(Epitrix sp.)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha (horizontale teelt) of 0,0625 l/ha haag (vertikale teelt), 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: courgette/patisson (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladvtretende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: courgette/patisson (open lucht)
Toepassingsstadium	: opkomst - 3 bladeren (BBCH 09-13)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: aardvlooien(Epitrix sp.)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: augurk (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - enkel als correctiebehandeling
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha (horizontale teelt) of 0,075 l/ha haag (vertikale teelt), 1-2 toepassingen

Ter bestrijding van	: bladvretende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha (horizontale teelt) of 0,075 l/ha haag (vertikale teelt), 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: augurk (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: opkomst - 3 bladeren (BBCH 09-13)
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - enkel als correctiebehandeling
Ter bestrijding van	: aardvlooien(Epitrix sp.)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha (horizontale teelt) of 0,0625 l/ha haag (vertikale teelt), 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: augurk (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvretende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: augurk (open lucht)
Toepassingsstadium	: opkomst - 3 bladeren (BBCH 09-13)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: aardvlooien(Epitrix sp.)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wortelen (open lucht)
Opmerking	: max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvretende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wortelen (open lucht)
Opmerking	: max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wortelvlieg(Psila rosae)
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-4 toepassingen

Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: pastinaak (open lucht)
Opmerking	: max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wortelvlieg(Psila rosae)
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-4 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: pastinaak (onder bescherming)
Opmerking	: max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wortelvlieg(Psila rosae)
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-4 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: pastinaak (open lucht)
Opmerking	: max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: mierikswortel (open lucht)
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: radijs (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen

Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: radijs (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: koolvlieg(<i>Hylemyia brassicae</i> (<i>Delia brassicae</i>))
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: radijs (open lucht)
Toepassingsstadium	: opkomst - 3 bladeren (BBCH 09-13)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: aardvlooien(<i>Epitrix</i> sp.)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: rammenas en rettich (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladretende rupsen(<i>Mamestra</i> , <i>Spodoptera</i> , <i>Autographa</i> , <i>Orthosia</i> , <i>Thaumetopoeidae</i> , <i>Pieris</i> ...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: rammenas en rettich (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: koolvlieg(<i>Hylemyia brassicae</i> (<i>Delia brassicae</i>))
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: rammenas en rettich (open lucht)
Toepassingsstadium	: opkomst - 3 bladeren (BBCH 09-13)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: aardvlooien(<i>Epitrix</i> sp.)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardpeer (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(<i>Aphididae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladretende rupsen(<i>Mamestra</i> , <i>Spodoptera</i> , <i>Autographa</i> , <i>Orthosia</i> , <i>Thaumetopoeidae</i> , <i>Pieris</i> ...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: snijselder (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: wantsen(Miridae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrodis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: selderij (bleek-, groene en witte) (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: wantsen(Miridae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: selderij (bleek-, groene en witte) (onder bescherming)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wantsen(Miridae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen

Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: selderij (bleek-, groene en witte) (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wortelvlieg(Psila rosae)
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: selderij (bleek-, groene en witte) (onder bescherming)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wortelvlieg(Psila rosae)
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: knolselder (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wantsen(Miridae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: knolselder (open lucht)
Opmerking	: max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wortelvlieg(Psila rosae)
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-4 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul) (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen

Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: drooggeogoste stamslabonen (zonder peul) (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvretende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: rode biet (kroten) (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladvretende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: rode biet (kroten) (open lucht)
Toepassingsstadium	: opkomst - 10 bladeren (BBCH 09-19)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bietenkever(Atomaria linearis)
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bietenvlieg(Pegomya hyoscyami, P. betae)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: schorseneren (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: bladvretende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 90 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: raap (stoppelraap, meiraap) (open lucht)
Opmerking	: max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: koolvlieg(Hylemyia brassicae (Delia brassicae))
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-2 toepassingen

Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: koolraap (open lucht)
Opmerking	: max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: koolvlieg(Hylemyia brassicae (Delia brassicae))
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: bloemkool (witte en groene) (open lucht)
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - Dit product heeft een nevenwerking tegen de koolbladvlieg.
Ter bestrijding van	: koolvlieg(Hylemyia brassicae (Delia brassicae))
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: galmuggen(Cecidomyiidae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: - 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen - Het product heeft een minder goede werking tegen Brevicoryne brassicae.
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: spruitkool (open lucht)
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - Dit product heeft een nevenwerking tegen de koolbladvlieg.
Ter bestrijding van	: koolvlieg(Hylemyia brassicae (Delia brassicae))
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: galmuggen(Cecidomyiidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen

Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: - 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen - Het product heeft een minder goede werking tegen Brevicoryne brassicae.
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (open lucht)
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - Dit product heeft een nevenwerking tegen de koolbladvlies.
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: - 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen - Het product heeft een minder goede werking tegen Brevicoryne brassicae.
Ter bestrijding van	: galmuggen(Cecidomyiidae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: koolvlies(Hylemyia brassicae (Delia brassicae))
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: Chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna (open lucht)
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - Dit product heeft een nevenwerking tegen de koolbladvlies.
Ter bestrijding van	: galmuggen(Cecidomyiidae)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: koolvlies(Hylemyia brassicae (Delia brassicae))
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: - 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen - Het product heeft een minder goede werking tegen Brevicoryne brassicae.
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

Te behandelen	: slasoorten (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: slasoorten (onder bescherming)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: babyleaf (geogst tot het stadium 8 bladeren) (open lucht)
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: babyleaf (geogst tot het stadium 8 bladeren) (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen

Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: spinazie (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bietenvlieg(Pegomyia hyoscyami, P. betae)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: wantsen(Miridae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: warmoes (snijbiet) (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bietenvlieg(Pegomyia hyoscyami, P. betae)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: wantsen(Miridae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen

Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: warmoes (snijbiet) (onder bescherming)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wantsen(Miridae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bietenvlieg(Pegomya hyoscyami, P. betae)
Dosis / Concentratie	: 0,0625 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvretende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: witloofwortelteelt (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wantsen(Miridae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvretende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: cichorei (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvretende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardbeien (productieveld) (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt

Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: Drosophila suzukii(Drosophila suzukii)
Toepassingsstadium	: vanaf het waarnemen van de insecten
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: wantsen(Miridae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: Drosophila suzukii(Drosophila suzukii)
Toepassingsstadium	: vanaf het waarnemen van de insecten
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: wantsen(Miridae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardbeien (productieveld) (onder bescherming)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wantsen(Miridae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: Drosophila suzukii(Drosophila suzukii)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /

Te behandelen	: aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (onder bescherming)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wantsen(Miridae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: Drosophila suzukii(Drosophila suzukii)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: frambozenstruiken (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: Drosophila suzukii(Drosophila suzukii)
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Te behandelen	: stekelbes (kruisbes) en kruisingen (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: Drosophila suzukii(Drosophila suzukii)
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Te behandelen	: stekelbes (kruisbes) en kruisingen (onder bescherming)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: Drosophila suzukii(Drosophila suzukii)
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha haag, 1-2 toepassingen

Ter bestrijding van	: bladvretende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 21 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: aalbessen (witte, rode, zwarte) (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: Drosophila suzukii(Drosophila suzukii)
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvretende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Te behandelen	: aalbessen (witte, rode, zwarte) (onder bescherming)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: bladvretende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: Drosophila suzukii(Drosophila suzukii)
Toepassingsstadium	: vanaf het waarnemen van de insecten
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 21 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: braamstruiken (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: Drosophila suzukii(Drosophila suzukii)
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvretende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek

Te behandelen	: druivelaars (voor wijnproductie) (open lucht)
Opmerking	: max. 3 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: trostrups(Lobesia botrana, Eupocelia ambiguella)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: cicaden(Cicadellidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha haag, 1-3 toepassingen
Ter bestrijding van	: Drosophila suzukii(Drosophila suzukii)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha haag, 1-3 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Te behandelen	: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht)
Opmerking	: max. 3 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,01 l /100 l, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: cicaden(Cicadellidae)
Dosis / Concentratie	: 0,0075 l/100 l, 1-3 toepassingen
Ter bestrijding van	: wantsen(Miridae)
Dosis / Concentratie	: 0,0075 l/100 l, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladrollers(Cacoecia, Spilonota, Argyroplote, Pandemis, Notocelia)
Dosis / Concentratie	: 0,01 l/100 l, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: mineermotten(Gracillariidae/Depressariidae)
Dosis / Concentratie	: 0,01 l/100 l, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,0075 l/100 l, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,0075 l/100 l, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,0075 l/100 l, 1-3 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladrandsnuitkever(Polydrusus spp., Phyllobius spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,01 l/100 l, 1-3 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,01 l/100 l, 1-3 toepassingen
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Toepassingsstadium	: larven en adulten
Dosis / Concentratie	: 0,0075 l/100 l, 1-3 toepassingen
Ter bestrijding van	: dop-, schild- en wolluizen(Coccoidea)
Toepassingsstadium	: bij het uitkomen van de eitjes of volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,01 l/100 l, 1-3 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvlooiën(Psyllidae)
Toepassingsstadium	: uitkomen van de wintereitjes
Dosis / Concentratie	: 0,01 l/100 l, 1-3 toepassingen met een interval van 5-7 dagen

Ter bestrijding van	: grote dennesnuitkever(<i>Hylobius abietis</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,0125 l/100 l, 5 l/100 planten, bespuiten aan de voet van de planten
Ter bestrijding van	: galluizen (chermes-, sparappel-, dennewolluis)(<i>Adelgidae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,0075 l/hl, 1-2 toepassingen, in menging met een uitvloeier
Ter bestrijding van	: galmuggen(<i>Cecidomyiidae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,01 l /100 l, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Te behandelen	: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming)
Opmerking	: max. 3 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: wantsen(<i>Miridae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,0075 l/100 l, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvtretende rupsen(<i>Mamestra</i> , <i>Spodoptera</i> , <i>Autographa</i> , <i>Orthosia</i> , <i>Thaumetopoeidae</i> , <i>Pieris</i> ...)
Dosis / Concentratie	: 0,0075 l/100 l, 1-3 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(<i>Aphididae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,01 l/100 l, 1-3 toepassingen
Ter bestrijding van	: trips(<i>Thysanoptera</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,01 l/100 l, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: galmuggen(<i>Cecidomyiidae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,01 l/100 l, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: haantjes(<i>Chrysomelidae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,0075 l/100 l, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: haantjes(<i>Chrysomelidae</i>)
Toepassingsstadium	: larven en adulten
Dosis / Concentratie	: 0,0075 l/100 l, 1-3 applications
Ter bestrijding van	: dop-, schild- en wolluizen(<i>Coccoidea</i>)
Toepassingsstadium	: bij het uitkomen van de eitjes of volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,01 l/100 l, 1-3 applications
Ter bestrijding van	: snuitkevers(<i>Curculionidae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,0075 l/100 l, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladrandsnuitkever(<i>Polydrusus</i> spp., <i>Phyllobius</i> spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,01 l/100 l, 1-3 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvlooiën(<i>Psyllidae</i>)
Toepassingsstadium	: uitkomen van de wintereitjes
Dosis / Concentratie	: 0,01 l/100 l, 1-3 toepassingen met een interval van 5-7 dagen
Ter bestrijding van	: bladrollers(<i>Cacoecia</i> , <i>Spilonota</i> , <i>Argyroplote</i> , <i>Pandemis</i> , <i>Notocelia</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,01 l/100 l, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: mineermotten(<i>Gracillariidae</i> / <i>Depressariidae</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,01 l/100 l, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: grote dennesnuitkever(<i>Hylobius abietis</i>)
Dosis / Concentratie	: 0,0125 l/100 l, 5 l/100 planten, bespuiten aan de voet van de planten

Ter bestrijding van	: cicaden(Cicadellidae)
Dosis / Concentratie	: 0,0075 l/100 l, 1-3 toepassingen
Ter bestrijding van	: galluizen (chermes-, sparappel-, dennewolluis)(Adelgidae)
Dosis / Concentratie	: 0,0075 l/hl, 1-2 toepassingen, in menging met een uitvloeier
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: lokbomen, omringende bomen, omverliggende bomen en stamhout
Ter bestrijding van	: spintkever/bastkever(Scolytus)
Dosis / Concentratie	: - 0,03 l/10 l, 1,5-2 l/m ³ - de schors moet goed bevochtigd worden
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: maïs (behalve suikermaïs) (open lucht)
Ter bestrijding van	: maïswortelboorder(Diabrotica virgifera)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: bosuien (lente-ui) (open lucht)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: preimot(Acrolepia assectella)
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: bieslook (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: preimot(Acrolepia assectella)
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: bieslook (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt

Ter bestrijding van	: trips(Thysanoptera)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: preimot(Acrolepia assectella)
Dosis / Concentratie	: 0,05 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: wortelpeterselie (consumptie wortels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 4 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: wortelvlieg(Psila rosae)
Dosis / Concentratie	: 0,125 l/ha, 1-4 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladretende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: dille (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladretende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /

Te behandelen	: engelwortel (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: engelwortel (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: engelwortel (consumptie wortels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen

Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: kervel (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: kervel (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /

Te behandelen	: karwij (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: karwij (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: koriander (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen

Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardruipsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: koriander (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardruipsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: lavas, maggiplant (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardruipsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: lavas, maggiplant (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: lavas, maggiplant (consumptie wortels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: roomse kervel (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen

Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: roomse kervel (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: peterselie (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: peterselie (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt

Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrodis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: dragon (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrodis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: dragon (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen

Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: winterkers, barbarakruid (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterkers, barbarakruid (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: tuinkers en andere kiemen en scheuten (open lucht)
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen

Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: tuinkers en andere kiemen en scheuten (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: witte/gele mosterd (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: witte/gele mosterd (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen

Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: rode amsoi (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: rode amsoi (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: zwarte mosterd (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen

Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zwarte mosterd (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: rucola (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: roos (consumptie van de bloemen) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

Te behandelen	: roos (consumptie van de bloemen) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: valeriaan (consumptie wortels)(onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: geranium (niet voor humane consumptie) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: geranium (niet voor humane consumptie) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen

Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: jasmijn (niet voor humane consumptie) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: jasmijn (niet voor humane consumptie) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: kaasjeskruid (niet voor humane consumptie) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: kaasjeskruid (niet voor humane consumptie) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen

Ter bestrijding van	: bladvretende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: ganzerik (niet voor humane consumptie) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvretende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: ganzerik (niet voor humane consumptie) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvretende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: maagdenpalm (niet voor humane consumptie) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvretende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: maagdenpalm (niet voor humane consumptie) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen

Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: munt (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: munt (consumptie bladeren en/of stengels)(onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /

Te behandelen	: salie (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: salie (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: marjolein/oregano (consumptie bladeren en/of stengels)(open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen

Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: marjolein/oregano (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: tijm (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: tijm (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: basilicum (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: basilicum (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. - max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen

Ter bestrijding van	: snuitkevers(Curculionidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: haantjes(Chrysomelidae)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: asperge (open lucht)
Toepassingsstadium	: na de oogst
Opmerking	: max. 2 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: asperge (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: na de oogst
Opmerking	: max. 2 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: uien (drooggeogoste) (open lucht)
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 28 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: knoflook (open lucht)
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen

Veiligheidstermijn	: 28 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: sjalot (open lucht)
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 28 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: suikermaïs (open lucht)
Toepassingsstadium	: Tot vorming van de eerste echte blad (BBCH 11)
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: hop (open lucht)
Toepassingsstadium	: Tot 50 cm hoog
Ter bestrijding van	: aardvlooiën(Epitrix sp.)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: bladrollers(Cacoecia, Spilonata, Argyroplote, Pandemis, Notocelia)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: postelein (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zuring (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zeekraal (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: bladvreterende rupsen(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris...)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Ter bestrijding van	: aardrupsen(Agrotis, Noctua, Euxoa)
Dosis / Concentratie	: 0,075 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
<u>Algemene opmerking :</u>	
/	

Bijlage 2

CLP-etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 en
Verordening (EG) Nr. 547/2011

Signaalwoorden :

Waarschuwing

Gevarenpictogrammen en hun GHS-code :

GHS07



GHS09

Gevarenaanduidingen (H-zinnen):

H302

H317

H332

H410

Aanvullende informatie(EUH-zinnen) :

EUH401

Standaardzinnen bijzondere risico's (R SH-zinnen) :Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) :

P261

P280

P301

P330

P391

P302+P352

P304+P340

P308-P311

P411