



FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,  
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DG Dier, Plant en Voeding (DG4)

DIENST  
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  
MESTSTOFFEN

SYNGENTA CROP PROTECTION N.V.  
POSTBUS 512  
4600 AM BERGEN OP ZOOM  
NEDERLAND

Correspondent :

HEINEN COPPELIA

Attaché

02 524 7263

Onze referten :

Dossiernummer : 11225

Datum : 22/11/2019

1/11

Betreft : Nieuwe berekeningswijze jaarlijkse bijdrage (pt 4.4)

**TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL OF TOEVOEGINGSSTOF**

1. Algemene bepalingen van de toelating

In toepassing van de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21/10/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad, en het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, en overeenkomstig het advies van het Erkenningscomité, wordt het product :

**DUAL GOLD**

met de hieronder vermelde specificaties en voorwaarden toegelaten onder het

nummer :

**9244P/B**

voor :

**BEROEPSGEBRUIK**

als : Herbicide

op naam van : SYNGENTA CROP PROTECTION N.V.



2. Samenstelling en vorm2.1. Algemene bepalingen :

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening Nr. 1107/2009 moeten de samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de bij de aanvraag of later verstrekte gegevens.

2.2. Werkzame stof(fen) en gewaarborgde gehalte(n) :

S-METOLACHLOOR 960 g/l

Algemene opmerking

/

2.3. Formuleringstype : EC (Emulgeerbaar concentraat)3. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Zie bijlage

4. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen4.1. Gevarencategorie(ën) : sensibiliserend en milieugevaarlijk

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) Nr. 547/2011 van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen en het KB van 28/02/1994 tot regeling van de indeling en de verpakking moeten de volgende vermeldingen op het etiket vermeld worden.

4.2. De volgende symbolen van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG of van de bijlage XIV van het KB van 28/02/1994 en het KB van 11/01/1193 tot regeling van de indeling en de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op de markt brengen of het gebruik ervan :

Xi, N

4.3. De volgende R en S zinnen van de bijlage XIII van het KB van 28/02/1994 :

4.3.1. R43-R50/53

4.3.2. S2-S13-S20/21-S23-S36/37-S35-S61

4.4. Aantal punten toegekend in toepassing van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten :

3

4.5. Andere vermeldingen :

- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPE3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
- SPE2: Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op

erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan.

- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.
- Mogelijke vervanggewassen: aardappel, Vicia-boon, drooggeogste stamslabonen, erwt, koolgewassen, schorseneer, biet, zaaiui en zomergerst na een oppervlakkige, niet-kerende grondbewerking; na een kerende grondbewerking kunnen tevens maïs, raap, spinazie, stamslabonen, witloof, wortel en zomerhaver als vervanggewas geteeld worden.
- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2:

- Op het etiket te vermelden co-formulanten: /
- P280: Beschermende handschoenen, beschermende kl

#### 5. Geldigheidsduur van de toelating

5.1. Geldigheidsduur : vanaf 22/11/2019 tot en met 31/07/2020

5.2. Bijzondere voorwaarden voor de verlenging :

/

Deze toelating vervangt elke voorgaande toelating betreffende dit product.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:

De toelating is slechts geldig voor zover mij de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

GUELTON O.  
Celhoofd Toelatingen

## Bijlage 1

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden :

Te behandelen	: <b>voederbieten (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: 4-6 bladeren (BBCH 14-16)
Opmerking	: max. 1,3 l/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 0,5-0,65 l/ha, 1 toepassing, in menging met fenmedifam, desmedifam en/of ethofumesaat
Ter bestrijding van	: zwarte nachtschade(Solanum nigrum)
Dosis / Concentratie	: 0,5-0,65 l/ha, 1 toepassing, in menging met fenmedifam, desmedifam en/of ethofumesaat
Ter bestrijding van	: kamille (echte)(Matricaria chamomilla)
Dosis / Concentratie	: 0,5-0,65 l/ha, 1 toepassing, in menging met fenmedifam, desmedifam en/of ethofumesaat
Ter bestrijding van	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli)
Dosis / Concentratie	: 0,5-0,65 l/ha, 1 toepassing, in menging met fenmedifam, desmedifam en/of ethofumesaat
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>suikerbieten (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: 4-6 bladeren (BBCH 14-16)
Opmerking	: max. 1,3 l/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: zwarte nachtschade(Solanum nigrum)
Dosis / Concentratie	: 0,5-0,65 l/ha, 1 toepassing, in menging met fenmedifam, desmedifam en/of ethofumesaat
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 0,5-0,65 l/ha, 1 toepassing, in menging met fenmedifam, desmedifam en/of ethofumesaat
Ter bestrijding van	: kamille (echte)(Matricaria chamomilla)
Dosis / Concentratie	: 0,5-0,65 l/ha, 1 toepassing, in menging met fenmedifam, desmedifam en/of ethofumesaat
Ter bestrijding van	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli)
Dosis / Concentratie	: 0,5-0,65 l/ha, 1 toepassing, in menging met fenmedifam, desmedifam en/of ethofumesaat
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>voederbieten (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: 6-8 bladeren (BBCH 16-18)
Opmerking	: max. 1,3 l/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 1,3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: zwarte nachtschade(Solanum nigrum)
Dosis / Concentratie	: 1,3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: kamille (echte)(Matricaria chamomilla)
Dosis / Concentratie	: 1,3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli)
Dosis / Concentratie	: 1,3 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

Te behandelen	: <b>suikerbieten (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: 6-8 bladeren (BBCH 16-18)
Opmerking	: max. 1,3 l/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 1,3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: zwarte nachtschade(Solanum nigrum)
Dosis / Concentratie	: 1,3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: kamille (echte)(Matricaria chamomilla)
Dosis / Concentratie	: 1,3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli)
Dosis / Concentratie	: 1,3 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>maïs (behalve suikermaïs) (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: voor zaai met inwerking of voor opkomst
Opmerking	: max. 1,5 l/ha/12 maanden (1,6 l/ha/12 maanden op humusrijke bodems)
Ter bestrijding van	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli)
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha (1,6 l/ha op humusrijke bodems), 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>maïs (behalve suikermaïs) (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: na opkomst - 3-4 bladeren (BBHC 12-14)
Opmerking	: max. 1,5 l/ha/12 maanden (1,6 l/ha/12 maanden op humusrijke bodems)
Ter bestrijding van	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli)
Dosis / Concentratie	: 0,9 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>cichorei (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: 1-8 bladeren (BBCH 11-18)
Opmerking	: max. 1,3 l/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 0,1-0,6 l/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 8 dagen
Ter bestrijding van	: zwarte nachtschade(Solanum nigrum)
Dosis / Concentratie	: 0,1-0,6 l/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 8 dagen
Ter bestrijding van	: kamille (echte)(Matricaria chamomilla)
Dosis / Concentratie	: 0,1-0,6 l/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 8 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>witloofwortelteelt (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: 1-8 bladeren (BBCH 11-18)
Opmerking	: max. 1,3 l/ha/12 maanden

Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 0,1-0,6 l/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 8 dagen
Ter bestrijding van	: zwarte nachtschade(Solanum nigrum)
Dosis / Concentratie	: 0,1-0,6 l/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 8 dagen
Ter bestrijding van	: kamille (echte)(Matricaria chamomilla)
Dosis / Concentratie	: 0,1-0,6 l/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 8 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeogst, met peul) (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: voor opkomst
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>aardbeien (productieveld) (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: 1-14 dagen na het planten
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 0,7 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7-14 dagen
Veiligheidstermijn	: 30 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: 1-14 dagen na het planten
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 0,7 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7-14 dagen, rijbehandeling op de moederplanten
Veiligheidstermijn	: 30 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>knolbegonia (open lucht) (niet bestemd voor consumptie)</b>
Toepassingsstadium	: kort na het planten
Opmerking	: max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Toepassingsstadium	: naakte of weinig veronkruide bodem
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))
Toepassingsstadium	: naakte of weinig veronkruide bodem
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing in menging met een product op basis van 100 g/ha isoxaben, gevolgd door 350 g/ha bentazon bij de opkomst van de eerste onkruiden.

Risicobeperkende maatregelen : Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

Te behandelen : **sierplanten (eenjarige) (open lucht) (niet bestemd voor consumptie)**

Toepassingsstadium : na het planten

Opmerking : - Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Dendranthema  
- max. 1,5 l/ha/12 maanden

Ter bestrijding van : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))

Dosis / Concentratie : 1,5 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))

Dosis / Concentratie : 1,5 l/ha, 1 toepassing

Risicobeperkende maatregelen : Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

Te behandelen : **vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (drooggeogst) (open lucht)**

Toepassingsstadium : voor opkomst (BBCH 01-08)

Opmerking : max. 1 toepassing/teelt

Ter bestrijding van : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))

Dosis / Concentratie : 0,8 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))

Dosis / Concentratie : 0,8 l/ha, 1 toepassing

Risicobeperkende maatregelen : Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

Te behandelen : **vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (groengeogst, zonder peul) (open lucht)**

Toepassingsstadium : voor opkomst (BBCH 01-08)

Opmerking : max. 1 toepassing/teelt

Ter bestrijding van : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))

Dosis / Concentratie : 0,8 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))

Dosis / Concentratie : 0,8 l/ha, 1 toepassing

Risicobeperkende maatregelen : Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

Te behandelen : **vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (drooggeogst) (open lucht)**

Toepassingsstadium : na opkomst (BBCH 12-14)

Opmerking : max. 1 toepassing/teelt

Ter bestrijding van : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))

Dosis / Concentratie : 0,5 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van : eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))

Dosis / Concentratie : 0,5 l/ha, 1 toepassing

Risicobeperkende maatregelen : Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

Te behandelen	: <b>vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...)</b> <b>(groengeogst, zonder peul) (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: na opkomst (BBCH 12-14)
Opmerking	: max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))
Dosis / Concentratie	: 0,5 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>raap (stoppelraap, meiraap) (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: voor opkomst (BBCH 01-08)
Opmerking	: max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Toepassingsstadium	: naakte of weinig veronkruide bodem
Dosis / Concentratie	: 1,3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))
Toepassingsstadium	: naakte of weinig veronkruide bodem
Dosis / Concentratie	: 1,3 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>koolraap (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: voor opkomst (BBCH 01-08)
Opmerking	: max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Toepassingsstadium	: naakte of weinig veronkruide bodem
Dosis / Concentratie	: 1,3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))
Toepassingsstadium	: naakte of weinig veronkruide bodem
Dosis / Concentratie	: 1,3 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>bloemkool (witte en groene) (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: 1-5 dagen na het planten
Opmerking	: max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Toepassingsstadium	: naakte of weinig veronkruide bodem
Dosis / Concentratie	: 1,3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))
Toepassingsstadium	: naakte of weinig veronkruide bodem
Dosis / Concentratie	: 1,3 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 73 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek



Te behandelen	: <b>broccoli (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: 1-5 dagen na het planten
Opmerking	: max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Toepassingsstadium	: naakte of weinig veronkruide bodem
Dosis / Concentratie	: 1,3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))
Toepassingsstadium	: naakte of weinig veronkruide bodem
Dosis / Concentratie	: 1,3 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 73 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>spruitkool (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: 1-5 dagen na het planten
Opmerking	: max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Toepassingsstadium	: naakte of weinig veronkruide bodem
Dosis / Concentratie	: 1,3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))
Toepassingsstadium	: naakte of weinig veronkruide bodem
Dosis / Concentratie	: 1,3 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 86 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: 1-5 dagen na het planten
Opmerking	: max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Toepassingsstadium	: naakte of weinig veronkruide bodem
Dosis / Concentratie	: 1,3 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden(Dicotyledonae (annual))
Toepassingsstadium	: naakte of weinig veronkruide bodem
Dosis / Concentratie	: 1,3 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 86 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>boerenkool (krulkool, palomboerenkool) (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: voor opkomst (BBCH 01-08) of 1-5 dagen na het planten
Opmerking	: max. 1 toepassing/teelt
Ter bestrijding van	: eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae (annual))
Toepassingsstadium	: naakte of weinig veronkruide bodem
Dosis / Concentratie	: 1,3 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van : eenjarige tweezaadlobbige  
onkruiden(Dicotyledonae (annual))  
Toepassingsstadium : naakte of weinig veronkruid bodem  
Dosis / Concentratie : 1,3 l/ha, 1 toepassing

Veiligheidstermijn : 69 dagen  
Risicobeperkende maatregelen : Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

Te behandelen : **Chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna (open  
lucht)**

Toepassingsstadium : 1-5 dagen na het planten  
Opmerking : max. 1 toepassing/teelt

Ter bestrijding van : eenjarige grasachtige onkruiden(Poaceae  
(annual))  
Toepassingsstadium : naakte of weinig veronkruid bodem  
Dosis / Concentratie : 1,3 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van : eenjarige tweezaadlobbige  
onkruiden(Dicotyledonae (annual))  
Toepassingsstadium : naakte of weinig veronkruid bodem  
Dosis / Concentratie : 1,3 l/ha, 1 toepassing

Veiligheidstermijn : 69 dagen  
Risicobeperkende maatregelen : Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

Algemene opmerking :

/

## Bijlage 2

CLP-etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 en  
Verordening (EG) Nr. 547/2011

Signaalwoorden :

Waarschuwing

Gevarenpictogrammen en hun GHS-code :

GHS07



GHS09

Gevarenaanduidingen (H-zinnen):

H317

H319

H410

Aanvullende informatie(EUH-zinnen) :

EUH401

Standaardzinnen bijzondere risico's (R SH-zinnen) :Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) :

P261

P280

P391

P302+P352

P305+P351+P338

P333+P313

P337+P313