



2. Samenstelling en vorm2.1. Algemene bepalingen :

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening Nr. 1107/2009 moeten de samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de bij de aanvraag of later verstrekte gegevens.

2.2. Werkzame stof(fen) en gewaarborgde gehalte(n) :

FLUDIOXONIL

25 g/l

Algemene opmerking

/

2.3. Formuleringstype : FS (Suspensieconcentraat voor zaadbehandeling)3. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Zie bijlage

4. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen4.1. Gevarencategorie(ën) : milieugevaarlijk

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) Nr. 547/2011 van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen en het KB van 28/02/1994 tot regeling van de indeling en de verpakking moeten de volgende vermeldingen op het etiket vermeld worden.

4.2. De volgende symbolen van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG of van de bijlage XIV van het KB van 28/02/1994 en het KB van 11/01/1193 tot regeling van de indeling en de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op de markt brengen of het gebruik ervan :

N

4.3. De volgende R en S zinnen van de bijlage XIII van het KB van 28/02/1994 :

4.3.1. R51/53

4.3.2. S2-S13-S20/21-S35-S37-S61

4.4. Aantal punten toegekend in toepassing van art. 2bis §1 van het KB van 14/01/2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten :

2

4.5. Andere vermeldingen :

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2:

- Op het etiket te vermelden co-formulanten: /

- EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

- P280: Beschermende handschoenen dragen.

- P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

## 5. Geldigheidsduur van de toelating

5.1. Geldigheidsduur : vanaf 16/11/2015 tot en met 31/10/2019

5.2. Bijzondere voorwaarden voor de verlenging :

Evaluatie van de aanvraag tot her-erkenning

Deze toelating vervangt elke voorgaande toelating betreffende dit product.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:

De toelating is slechts geldig voor zover mij de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

GUELTON O.  
Celhoofd Toelatingen

Bijlage 1

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden :

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Te behandelen                | : <b>zaaizaden van winterrogge</b>                                       |
| Ter bestrijding van          | : fusarium(Fusarium spp.)                                                |
| Dosis / Concentratie         | : 200 ml/100 kg zaaizaden                                                |
| Risicobeperkende maatregelen | : /                                                                      |
| Te behandelen                | : <b>zaaizaden van zomerrogge</b>                                        |
| Ter bestrijding van          | : fusarium(Fusarium spp.)                                                |
| Dosis / Concentratie         | : 200 ml/100 kg zaaizaden                                                |
| Risicobeperkende maatregelen | : /                                                                      |
| Te behandelen                | : <b>zaaizaden van winterhaver</b>                                       |
| Ter bestrijding van          | : fusarium(Fusarium spp.)                                                |
| Dosis / Concentratie         | : 200 ml/100 kg zaaizaden                                                |
| Risicobeperkende maatregelen | : /                                                                      |
| Te behandelen                | : <b>zaaizaden van zomerhaver</b>                                        |
| Ter bestrijding van          | : fusarium(Fusarium spp.)                                                |
| Dosis / Concentratie         | : 200 ml/100 kg zaaizaden                                                |
| Risicobeperkende maatregelen | : /                                                                      |
| Te behandelen                | : <b>zaaizaden van zonnebloem</b>                                        |
| Ter bestrijding van          | : grauwe schimmel(Botrytis cinerea)                                      |
| Dosis / Concentratie         | : 600 ml/100 kg zaaizaden                                                |
| Risicobeperkende maatregelen | : /                                                                      |
| Te behandelen                | : <b>zaaizaden van wintertarwe</b>                                       |
| Ter bestrijding van          | : steenbrand(Tilletia caries)                                            |
| Dosis / Concentratie         | : 200 ml/100 kg zaaizaden                                                |
| Ter bestrijding van          | : fusarium(Fusarium spp.)                                                |
| Dosis / Concentratie         | : 200 ml/100 kg zaaizaden                                                |
| Ter bestrijding van          | : bladvlekkenziekte/septoriose(Septoria tritici, Leptosphaeria nodorum)) |
| Dosis / Concentratie         | : 200 ml/100 kg zaaizaden                                                |
| Risicobeperkende maatregelen | : /                                                                      |
| Te behandelen                | : <b>zaaizaden van zomertarwe</b>                                        |
| Ter bestrijding van          | : steenbrand(Tilletia caries)                                            |
| Dosis / Concentratie         | : 200 ml/100 kg zaaizaden                                                |
| Ter bestrijding van          | : fusarium(Fusarium spp.)                                                |
| Dosis / Concentratie         | : 200 ml/100 kg zaaizaden                                                |
| Ter bestrijding van          | : bladvlekkenziekte/septoriose(Septoria tritici, Leptosphaeria nodorum)) |
| Dosis / Concentratie         | : 200 ml/100 kg zaaizaden                                                |
| Risicobeperkende maatregelen | : /                                                                      |
| Te behandelen                | : <b>zaaizaden van wintergerst</b>                                       |
| Ter bestrijding van          | : fusarium(Fusarium spp.)                                                |
| Dosis / Concentratie         | : 200 ml/100 kg zaaizaden                                                |

Ter bestrijding van : netvlekkenziekte/strepenziekte(Pyrenophora,  
Helminthosporium, Drechslera)  
Dosis / Concentratie : 200 ml/100 kg zaaizaden

Risicobeperkende maatregelen : /

Te behandelen : **zaaizaden van zomergerst**

Ter bestrijding van : fusarium(Fusarium spp.)  
Dosis / Concentratie : 200 ml/100 kg zaaizaden  
Ter bestrijding van : netvlekkenziekte/strepenziekte(Pyrenophora,  
Helminthosporium, Drechslera)  
Dosis / Concentratie : 200 ml/100 kg zaaizaden

Risicobeperkende maatregelen : /

Te behandelen : **zaaizaden van spelt**

Ter bestrijding van : steenbrand(Tilletia caries)  
Dosis / Concentratie : 200 ml/100 kg zaaizaden  
Ter bestrijding van : bladvlekkenziekte/septoriose(Septoria tritici,  
Leptosphaeria nodorum))  
Dosis / Concentratie : 200 ml/100 kg zaaizaden  
Ter bestrijding van : fusarium(Fusarium spp.)  
Dosis / Concentratie : 200 ml/100 kg zaaizaden

Risicobeperkende maatregelen : /

Te behandelen : **zaaizaden van wintertriticale**

Ter bestrijding van : fusarium(Fusarium spp.)  
Dosis / Concentratie : 200 ml/100 kg zaaizaden  
Ter bestrijding van : bladvlekkenziekte/septoriose(Septoria tritici,  
Leptosphaeria nodorum))  
Dosis / Concentratie : 200 ml/100 kg zaaizaden  
Ter bestrijding van : steenbrand(Tilletia caries)  
Dosis / Concentratie : 200 ml/100 kg zaaizaden

Risicobeperkende maatregelen : /

Te behandelen : **zaaizaden van zomertriticale**

Ter bestrijding van : fusarium(Fusarium spp.)  
Dosis / Concentratie : 200 ml/100 kg zaaizaden  
Ter bestrijding van : bladvlekkenziekte/septoriose(Septoria tritici,  
Leptosphaeria nodorum))  
Dosis / Concentratie : 200 ml/100 kg zaaizaden  
Ter bestrijding van : steenbrand(Tilletia caries)  
Dosis / Concentratie : 200 ml/100 kg zaaizaden

Risicobeperkende maatregelen : /

Algemene opmerking :

/

Bijlage 2

CLP-etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 en  
Verordening (EG) Nr. 547/2011

Signaalwoorden :

Gevarenpictogrammen en hun GHS-code :

GHS09



Gevarenaanduidingen (H-zinnen):

H411

Aanvullende informatie(EUH-zinnen) :

EUH208

EUH210

EUH401

Standaardzinnen bijzondere risico's (R SH-zinnen) :

Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) :

P102  
P391

P270  
P501

P273

P280