



FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,  
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DG Dier, Plant en Voeding (DG4)

DIENST  
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  
MESTSTOFFEN

SYNGENTA CROP PROTECTION N.V.  
POSTBUS 512  
4600 AM BERGEN OP ZOOM  
NEDERLAND

Correspondent :

PITTMVILS I.  
Attaché  
02 524 72 67

Onze referten :

Dossiernummer : 15055

Datum : 17/11/2017

1/24

Betreft : Uitbreiding in boerenkool

**TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL OF TOEVOEGINGSSTOF**

1. Algemene bepalingen van de toelating

In toepassing van de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21/10/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad, en het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, en overeenkomstig het advies van het Erkenningscomité, wordt het product :

**ORTIVA**

met de hieronder vermelde specificaties en voorwaarden toegelaten onder het

nummer : **9326P/B**

voor : **BEROEPSGEBRUIK**

als : Fungicide

op naam van : SYNGENTA CROP PROTECTION N.V.



2. Samenstelling en vorm2.1. Algemene bepalingen :

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening Nr. 1107/2009 moeten de samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de bij de aanvraag of later verstrekte gegevens.

2.2. Werkzame stof(fen) en gewaarborgde gehalte(n) :

AZOXYSTROBIN

250 g/l

Algemene opmerking

/

2.3. Formuleringstype : SC (Suspensie concentraat)3. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Zie bijlage

4. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen4.1. Gevarencategorie(ën) : milieugevaarlijk

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) Nr. 547/2011 van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen en het KB van 28/02/1994 tot regeling van de indeling en de verpakking moeten de volgende vermeldingen op het etiket vermeld worden.

4.2. De volgende symbolen van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG of van de bijlage XIV van het KB van 28/02/1994 en het KB van 11/01/1193 tot regeling van de indeling en de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op de markt brengen of het gebruik ervan :

N

4.3. De volgende R en S zinnen van de bijlage XIII van het KB van 28/02/1994 :

4.3.1. R50/53

4.3.2. S2-S13-S20/21-S23-S35-S61

4.4. Aantal punten toegekend in toepassing van art. 2bis §1 van het KB van 14/01/2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten :

2

4.5. Andere vermeldingen :

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
- SPE3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
- Aangezien bepaalde appelvariëteiten zeer gevoelig zijn voor azoxystrobin, moet

de kans op drift worden vermeden op deze teelt, alsook het gebruik van hetzelfde spuittoestel.

- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2:

- Op het etiket te vermelden co-formulanten: /
- EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

## 5. Geldigheidsduur van de toelating

5.1. Geldigheidsduur : vanaf 17/11/2017 tot en met 31/12/2022

5.2. Bijzondere voorwaarden voor de verlenging :

Evaluatie van de aanvraag tot her-erkenning.

Deze toelating vervangt elke voorgaande toelating betreffende dit product.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:

De toelating is slechts geldig voor zover mij de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

GUELTON O.  
Celhoofd Toelatingen

## Bijlage 1

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden :

|                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Te behandelen                               | : <b>prei (open lucht)</b>                                                                                                                                                                                                  |
| Opmerking                                   | : max. 3 toepassingen/teelt                                                                                                                                                                                                 |
| Ter bestrijding van<br>Toepassingsstadium   | : roest(Puccinia porri, P. allii)<br>: preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie                        | : 1 l/ha, 1-3 toepassingen, met een interval van 21 dagen                                                                                                                                                                   |
| Ter bestrijding van<br>Toepassingsstadium   | : papiervlekkenziekte(Phytophthora porri)<br>: preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen                                                                                                                           |
| Dosis / Concentratie                        | : 1 l/ha, 1-3 toepassingen, met een interval van 21 dagen                                                                                                                                                                   |
| Ter bestrijding van<br>Toepassingsstadium   | : purpervlekkenziekte(Alternaria porri)<br>: preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen                                                                                                                             |
| Dosis / Concentratie                        | : 1 l/ha, 1-3 toepassingen, met een interval van 21 dagen                                                                                                                                                                   |
| Veiligheidstermijn                          | : 21 dagen                                                                                                                                                                                                                  |
| Risicobeperkende maatregelen                | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                                                                                                                                                                 |
| Te behandelen                               | : <b>prei (onder bescherming)</b>                                                                                                                                                                                           |
| Opmerking                                   | : max. 4 toepassingen/teelt                                                                                                                                                                                                 |
| Ter bestrijding van<br>Toepassingsstadium   | : roest(Puccinia porri, P. allii)<br>: preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie                        | : 1 l/ha, 1-4 toepassingen, met een interval van 14-21 dagen                                                                                                                                                                |
| Ter bestrijding van<br>Toepassingsstadium   | : papiervlekkenziekte(Phytophthora porri)<br>: preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen                                                                                                                           |
| Dosis / Concentratie                        | : 1 l/ha, 1-4 toepassingen, met een interval van 14-21 dagen                                                                                                                                                                |
| Ter bestrijding van<br>Toepassingsstadium   | : purpervlekkenziekte(Alternaria porri)<br>: preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen                                                                                                                             |
| Dosis / Concentratie                        | : 1 l/ha, 1-4 toepassingen, met een interval van 14-21 dagen                                                                                                                                                                |
| Veiligheidstermijn                          | : 14 dagen                                                                                                                                                                                                                  |
| Risicobeperkende maatregelen                | : /                                                                                                                                                                                                                         |
| Te behandelen                               | : <b>sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht)</b>                                                                                                                                                            |
| Opmerking                                   | : - Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Buxus, Viola x wittrockiana, Ranunculus, laurierkers, roos, kalanchoë en aster.<br>- max. 2 toepassingen/12 maanden |
| Ter bestrijding van<br>Dosis / Concentratie | : roest(Puccinia, Uromyces, Phragmidium,...)<br>: 100 ml/100 l, preventief, 1-2 toepassingen                                                                                                                                |
| Ter bestrijding van<br>Dosis / Concentratie | : echte meeldauw(Erysiphaceae)<br>: 100 ml/100 l, 1-2 toepassingen                                                                                                                                                          |
| Ter bestrijding van<br>Dosis / Concentratie | : alternaria(Alternaria)<br>: 100 ml/100 l, 1-2 toepassingen                                                                                                                                                                |
| Ter bestrijding van<br>Dosis / Concentratie | : septoria(Septoria)<br>: 100 ml/100 l, 1-2 toepassingen                                                                                                                                                                    |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ter bestrijding van          | : witte roest( <i>Albugo candida</i> )                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dosis / Concentratie         | : 100 ml/100 l, 1-2 toepassingen                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ter bestrijding van          | : <i>cladosporium</i> ( <i>Cladosporium</i> )                                                                                                                                                                                                                             |
| Dosis / Concentratie         | : 100 ml/100 l, 1-2 toepassingen                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ter bestrijding van          | : <i>ascochyta</i> ( <i>Ascochyta</i> )                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 100 ml/100 l, 1-2 toepassingen                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ter bestrijding van          | : <i>stemphylium</i> ( <i>Stemphylium</i> )                                                                                                                                                                                                                               |
| Dosis / Concentratie         | : 100 ml/100 l, 1-2 toepassingen                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ter bestrijding van          | : blad-en takphytophthora en valse<br>meeldauw( <i>Phytophthora</i> spp. / <i>Peronospora</i> spp.)                                                                                                                                                                       |
| Dosis / Concentratie         | : 100 ml/100 l, 1-2 toepassingen                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ter bestrijding van          | : <i>Calonectria</i> ( <i>Cylindrocladium</i> )( <i>Calonectria</i> spp.)                                                                                                                                                                                                 |
| Dosis / Concentratie         | : 100 ml/100 l, 1-2 toepassingen                                                                                                                                                                                                                                          |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 10 m met klassieke techniek                                                                                                                                                                                                                              |
| Te behandelen                | : <b>sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming)</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Opmerking                    | : - Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: <i>Buxus</i> , <i>Viola</i> x <i>wittrockiana</i> , <i>Ranunculus</i> , laurierkers, roos, <i>kalanchoë</i> en <i>aster</i> .<br>- max. 2 toepassingen/12 maanden |
| Ter bestrijding van          | : roest( <i>Puccinia</i> , <i>Uromyces</i> , <i>Phragmidium</i> ,...)                                                                                                                                                                                                     |
| Dosis / Concentratie         | : 100 ml/100 l, preventief, 1-2 toepassingen                                                                                                                                                                                                                              |
| Ter bestrijding van          | : echte meeldauw( <i>Erysiphaceae</i> )                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 100 ml/100 l, 1-2 toepassingen                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ter bestrijding van          | : <i>alternaria</i> ( <i>Alternaria</i> )                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dosis / Concentratie         | : 100 ml/100 l, 1-2 toepassingen                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ter bestrijding van          | : <i>septoria</i> ( <i>Septoria</i> )                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dosis / Concentratie         | : 100 ml/100 l, 1-2 toepassingen                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ter bestrijding van          | : witte roest( <i>Albugo candida</i> )                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dosis / Concentratie         | : 100 ml/100 l, 1-2 toepassingen                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ter bestrijding van          | : <i>cladosporium</i> ( <i>Cladosporium</i> )                                                                                                                                                                                                                             |
| Dosis / Concentratie         | : 100 ml/100 l, 1-2 toepassingen                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ter bestrijding van          | : <i>ascochyta</i> ( <i>Ascochyta</i> )                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 100 ml/100 l, 1-2 toepassingen                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ter bestrijding van          | : <i>stemphylium</i> ( <i>Stemphylium</i> )                                                                                                                                                                                                                               |
| Dosis / Concentratie         | : 100 ml/100 l, 1-2 toepassingen                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ter bestrijding van          | : blad-en takphytophthora en valse<br>meeldauw( <i>Phytophthora</i> spp. / <i>Peronospora</i> spp.)                                                                                                                                                                       |
| Dosis / Concentratie         | : 100 ml/100 l, 1-2 toepassingen                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ter bestrijding van          | : <i>Calonectria</i> ( <i>Cylindrocladium</i> )( <i>Calonectria</i> spp.)                                                                                                                                                                                                 |
| Dosis / Concentratie         | : 100 ml/100 l, 1-2 toepassingen                                                                                                                                                                                                                                          |
| Risicobeperkende maatregelen | : /                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Te behandelen                | : <b>wortelen (open lucht)</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opmerking                    | : max. 2 toepassingen/teelt                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ter bestrijding van          | : <i>alternaria</i> ( <i>Alternaria dauci</i> )                                                                                                                                                                                                                           |
| Toepassingsstadium           | : preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen                                                                                                                                                                                                                      |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen, met een interval van 14-21 dagen                                                                                                                                                                                                              |

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ter bestrijding van          | : echte meeldauw(Erysiphe heraclei)                          |
| Toepassingsstadium           | : preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen         |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen, met een interval van 14-21 dagen |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                   |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                  |
| Te behandelen                | : <b>voedererwten (drooggeogst) (open lucht)</b>             |
| Toepassingsstadium           | : tijdens de bloei (BBCH 60-69)                              |
| Opmerking                    | : max. 1 toepassing/teelt                                    |
| Ter bestrijding van          | : anthracnose(Ascochyta pisi, A. pinodes)                    |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                       |
| Ter bestrijding van          | : grauwe schimmel(Botrytis cinerea)                          |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                       |
| Ter bestrijding van          | : echte meeldauw(Erysiphe pisi)                              |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                       |
| Ter bestrijding van          | : roest(Uromyces pisi)                                       |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                       |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                   |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                  |
| Te behandelen                | : <b>drooggeogste erwten (zonder peul) (open lucht)</b>      |
| Toepassingsstadium           | : tijdens de bloei (BBCH 60-69)                              |
| Opmerking                    | : max. 1 toepassing/teelt                                    |
| Ter bestrijding van          | : anthracnose(Ascochyta pisi, A. pinodes)                    |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                       |
| Ter bestrijding van          | : grauwe schimmel(Botrytis cinerea)                          |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                       |
| Ter bestrijding van          | : echte meeldauw(Erysiphe pisi)                              |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                       |
| Ter bestrijding van          | : roest(Uromyces pisi)                                       |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                       |
| Veiligheidstermijn           | : 36 dagen                                                   |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                  |
| Te behandelen                | : <b>groengeogste erwten (met peul) (open lucht)</b>         |
| Toepassingsstadium           | : tijdens de bloei (BBCH 60-69)                              |
| Opmerking                    | : max. 1 toepassing/teelt                                    |
| Ter bestrijding van          | : anthracnose(Ascochyta pisi, A. pinodes)                    |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                       |
| Ter bestrijding van          | : grauwe schimmel(Botrytis cinerea)                          |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                       |
| Ter bestrijding van          | : echte meeldauw(Erysiphe pisi)                              |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                       |
| Ter bestrijding van          | : roest(Uromyces pisi)                                       |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                       |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                   |

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                                  |
| Te behandelen                | : <b>groengeoogste erwten (zonder peul) (open lucht)</b>                                     |
| Toepassingsstadium           | : tijdens de bloei (BBCH 60-69)                                                              |
| Opmerking                    | : max. 1 toepassing/teelt                                                                    |
| Ter bestrijding van          | : anthracnose( <i>Ascochyta pisi</i> , <i>A. pinodes</i> )                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                       |
| Ter bestrijding van          | : grauwe schimmel( <i>Botrytis cinerea</i> )                                                 |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                       |
| Ter bestrijding van          | : echte meeldauw( <i>Erysiphe pisi</i> )                                                     |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                       |
| Ter bestrijding van          | : roest( <i>Uromyces pisi</i> )                                                              |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                       |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                                   |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                                  |
| Te behandelen                | : <b>stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul) (open lucht)</b>          |
| Opmerking                    | : max. 1 toepassing/teelt                                                                    |
| Ter bestrijding van          | : roest( <i>Uromyces appendiculatus</i> )                                                    |
| Dosis / Concentratie         | : 0,8-1 l/ha, 1 toepassing                                                                   |
| Ter bestrijding van          | : bladvlekkenziekte( <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> )                                  |
| Dosis / Concentratie         | : 0,8-1 l/ha, 1 toepassing                                                                   |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                                   |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                                  |
| Te behandelen                | : <b>vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (drooggeogst) (open lucht)</b>               |
| Toepassingsstadium           | : tijdens de bloei (BBCH 60-69)                                                              |
| Opmerking                    | : max. 1 toepassing/teelt                                                                    |
| Ter bestrijding van          | : anthracnose( <i>Ascochyta pisi</i> , <i>A. pinodes</i> )                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                       |
| Ter bestrijding van          | : grauwe schimmel( <i>Botrytis fabae</i> )                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                       |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                                   |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                                  |
| Te behandelen                | : <b>vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (groengeoogst, zonder peul) (open lucht)</b> |
| Toepassingsstadium           | : tijdens de bloei (BBCH 60-69)                                                              |
| Opmerking                    | : max. 1 toepassing/teelt                                                                    |
| Ter bestrijding van          | : anthracnose( <i>Ascochyta pisi</i> , <i>A. pinodes</i> )                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                       |
| Ter bestrijding van          | : grauwe schimmel( <i>Botrytis fabae</i> )                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                       |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                                   |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                                  |

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Te behandelen                | : <b>selderij (bleek-, groene en witte) (open lucht)</b>                                     |
| Opmerking                    | : max. 2 toepassingen/teelt                                                                  |
| Ter bestrijding van          | : bladvlekkenziekte( <i>Septoria apiicola</i> )                                              |
| Toepassingsstadium           | : preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 0,8 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen                                    |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                                   |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                                  |
| Te behandelen                | : <b>selderij (bleek-, groene en witte) (onder bescherming)</b>                              |
| Opmerking                    | : max. 2 toepassingen/teelt                                                                  |
| Ter bestrijding van          | : bladvlekkenziekte( <i>Septoria apiicola</i> )                                              |
| Toepassingsstadium           | : preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 0,8 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen                                    |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                                   |
| Risicobeperkende maatregelen | : /                                                                                          |
| Te behandelen                | : <b>knolselder (open lucht)</b>                                                             |
| Opmerking                    | : max. 2 toepassingen/teelt                                                                  |
| Ter bestrijding van          | : bladvlekkenziekte( <i>Septoria apiicola</i> )                                              |
| Toepassingsstadium           | : preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 0,8 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen                                    |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                                   |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                                  |
| Te behandelen                | : <b>knolvenkel (open lucht)</b>                                                             |
| Opmerking                    | : max. 3 toepassingen/teelt                                                                  |
| Ter bestrijding van          | : bladvlekkenziekte( <i>Septoria petroselini</i> / <i>Cercosporidium punctum</i> )           |
| Toepassingsstadium           | : preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 0,8 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen                                    |
| Ter bestrijding van          | : sclerotiënrot ( <i>sclerotinia</i> )( <i>Sclerotinia minor</i> ( <i>S. sclerotiorum</i> )) |
| Toepassingsstadium           | : preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 14-21 dagen                                  |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                                   |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                                  |
| Te behandelen                | : <b>knolvenkel (onder bescherming)</b>                                                      |
| Opmerking                    | : max. 3 toepassingen/teelt                                                                  |



|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ter bestrijding van          | : bladvlekkenziekte( <i>Septoria petroselini</i> / <i>Cercosporidium punctum</i> )           |
| Toepassingsstadium           | : preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 0,8 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen                                    |
| Ter bestrijding van          | : sclerotiënrot ( <i>sclerotinia</i> )( <i>Sclerotinia minor</i> ( <i>S. sclerotiorum</i> )) |
| Toepassingsstadium           | : preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 14-21 dagen                                  |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                                   |
| Risicobeperkende maatregelen | : /                                                                                          |
| Te behandelen                | : <b>courgette/patisson (open lucht)</b>                                                     |
| Opmerking                    | : max. 2 toepassingen/teelt                                                                  |
| Ter bestrijding van          | : vruchtvuur( <i>Cladosporium cucumerinum</i> )                                              |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen                                      |
| Veiligheidstermijn           | : 1 dag                                                                                      |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                                  |
| Te behandelen                | : <b>courgette/patisson (onder bescherming)</b>                                              |
| Opmerking                    | : max. 2 toepassingen/teelt                                                                  |
| Ter bestrijding van          | : vruchtvuur( <i>Cladosporium cucumerinum</i> )                                              |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen                                      |
| Veiligheidstermijn           | : 1 dag                                                                                      |
| Risicobeperkende maatregelen | : /                                                                                          |
| Te behandelen                | : <b>pastinaak (open lucht)</b>                                                              |
| Opmerking                    | : max. 2 toepassingen/teelt                                                                  |
| Ter bestrijding van          | : <i>alternaria</i> ( <i>Alternaria dauci</i> )                                              |
| Toepassingsstadium           | : preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen, met een interval van 14-21 dagen                                 |
| Ter bestrijding van          | : echte meeldauw( <i>Erysiphe heraclei</i> )                                                 |
| Toepassingsstadium           | : preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen                                         |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen, met een interval van 14-21 dagen                                 |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                                   |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                                  |
| Te behandelen                | : <b>bloemkool (witte en groene) (open lucht)</b>                                            |
| Opmerking                    | : max. 2 toepassingen/teelt                                                                  |
| Ter bestrijding van          | : witte roest( <i>Albugo candida</i> )                                                       |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen                                     |

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ter bestrijding van          | : spikkelziekte, alternaria( <i>Alternaria brassicae</i> )                      |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen, met een interval van 14 dagen                       |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                      |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                     |
| Te behandelen                | : <b>sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (open lucht)</b> |
| Opmerking                    | : max. 2 toepassingen/teelt                                                     |
| Ter bestrijding van          | : witte roest( <i>Albugo candida</i> )                                          |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen                        |
| Ter bestrijding van          | : spikkelziekte, alternaria( <i>Alternaria brassicae</i> )                      |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen, met een interval van 14 dagen                       |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                      |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                     |
| Te behandelen                | : <b>koolrabi (koolraap-boven-de-grond) (open lucht)</b>                        |
| Opmerking                    | : max. 2 toepassingen/teelt                                                     |
| Ter bestrijding van          | : witte roest( <i>Albugo candida</i> )                                          |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen                        |
| Ter bestrijding van          | : spikkelziekte, alternaria( <i>Alternaria brassicae</i> )                      |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen, met een interval van 14 dagen                       |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                      |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                     |
| Te behandelen                | : <b>broccoli (open lucht)</b>                                                  |
| Opmerking                    | : max. 2 toepassingen/teelt                                                     |
| Ter bestrijding van          | : witte roest( <i>Albugo candida</i> )                                          |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen, met een interval van 14 dagen                       |
| Ter bestrijding van          | : spikkelziekte, alternaria( <i>Alternaria brassicae</i> )                      |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen, met een interval van 14 dagen                       |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                      |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                     |
| Te behandelen                | : <b>spruitkool (open lucht)</b>                                                |
| Opmerking                    | : max. 2 toepassingen/teelt                                                     |
| Ter bestrijding van          | : spikkelziekte, alternaria( <i>Alternaria brassicae</i> )                      |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen, met een interval van 14 dagen                       |
| Ter bestrijding van          | : witte roest( <i>Albugo candida</i> )                                          |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen, met een interval van 14 dagen                       |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                      |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                     |

|                              |                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Te behandelen                | : <b>Chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna (open lucht)</b>                           |
| Opmerking                    | : max. 2 toepassingen/teelt                                                               |
| Ter bestrijding van          | : spikkelziekte, alternaria( <i>Alternaria brassicae</i> )                                |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen, met een interval van 14 dagen                                 |
| Ter bestrijding van          | : witte roest( <i>Albugo candida</i> )                                                    |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen, met een interval van 14 dagen                                 |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                                |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                               |
| Te behandelen                | : <b>boerenkool (krulkool, palmboerenkool) (open lucht)</b>                               |
| Opmerking                    | : max. 2 toepassingen/teelt                                                               |
| Ter bestrijding van          | : spikkelziekte, alternaria( <i>Alternaria brassicae</i> )                                |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen, met een interval van 14 dagen                                 |
| Ter bestrijding van          | : witte roest( <i>Albugo candida</i> )                                                    |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen, met een interval van 14 dagen                                 |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                                |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                               |
| Te behandelen                | : <b>raap (stoppelraap, meiraap) (open lucht)</b>                                         |
| Ter bestrijding van          | : spikkelziekte, alternaria( <i>Alternaria brassicae</i> )                                |
| Toepassingsstadium           | : preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen                                      |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen, met een interval van 14 dagen                                 |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                                |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                               |
| Te behandelen                | : <b>koolraap (open lucht)</b>                                                            |
| Ter bestrijding van          | : spikkelziekte, alternaria( <i>Alternaria brassicae</i> )                                |
| Toepassingsstadium           | : preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen                                      |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen, met een interval van 14 dagen                                 |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                                |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                               |
| Te behandelen                | : <b>witloofwortelteelt (open lucht)</b>                                                  |
| Opmerking                    | : - Het product heeft een nevenwerking tegen echte meeldauw.<br>- max. 1 toepassing/teelt |
| Ter bestrijding van          | : alternaria( <i>Alternaria cichorii</i> )                                                |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                    |
| Ter bestrijding van          | : roest( <i>Puccinia cichorii</i> )                                                       |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                    |
| Veiligheidstermijn           | : 21 dagen                                                                                |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                               |

|                              |                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Te behandelen                | : <b>cichorei (open lucht)</b>                                                            |
| Opmerking                    | : - Het product heeft een nevenwerking tegen echte meeldauw.<br>- max. 1 toepassing/teelt |
| Ter bestrijding van          | : alternaria( <i>Alternaria cichorii</i> )                                                |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                    |
| Ter bestrijding van          | : roest( <i>Puccinia cichorii</i> )                                                       |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                    |
| Veiligheidstermijn           | : 21 dagen                                                                                |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                               |
| Te behandelen                | : <b>witloof en roodloof (forcerie grondteelt)</b>                                        |
| Toepassingsstadium           | : bij het intafelen                                                                       |
| Ter bestrijding van          | : phytophthora cryptogea( <i>Phytophthora cryptogea</i> ,<br><i>P. erythroseptica</i> )   |
| Dosis / Concentratie         | : 1 ml/m <sup>2</sup> , over de wortelkragen                                              |
| Risicobeperkende maatregelen | : /                                                                                       |
| Te behandelen                | : <b>witloof en roodloof (forcerie hydrocultuur)</b>                                      |
| Toepassingsstadium           | : bij het intafelen                                                                       |
| Ter bestrijding van          | : phytophthora cryptogea( <i>Phytophthora cryptogea</i> ,<br><i>P. erythroseptica</i> )   |
| Dosis / Concentratie         | : 1 ml/m <sup>2</sup> , over de wortelkragen                                              |
| Risicobeperkende maatregelen | : /                                                                                       |
| Te behandelen                | : <b>asperge (open lucht)</b>                                                             |
| Toepassingsstadium           | : na de oogst                                                                             |
| Opmerking                    | : max. 2 toepassingen/12 maanden                                                          |
| Ter bestrijding van          | : stemphylium-stengelsterfte( <i>Stemphylium vesicarium</i> )                             |
| Toepassingsstadium           | : preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen                                      |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen                                  |
| Ter bestrijding van          | : roest( <i>Puccinia asparagi</i> )                                                       |
| Toepassingsstadium           | : preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen                                      |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen                                  |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                               |
| Te behandelen                | : <b>asperge (onder bescherming)</b>                                                      |
| Toepassingsstadium           | : na de oogst                                                                             |
| Opmerking                    | : max. 2 toepassingen/12 maanden                                                          |
| Ter bestrijding van          | : stemphylium-stengelsterfte( <i>Stemphylium vesicarium</i> )                             |
| Toepassingsstadium           | : preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen                                      |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen                                  |

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ter bestrijding van          | : roest(Puccinia asparagi)                                            |
| Toepassingsstadium           | : preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen                  |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen              |
| Risicobeperkende maatregelen | : /                                                                   |
| Te behandelen                | : <b>slasoorten (open lucht)</b>                                      |
| Opmerking                    | : max. 4 toepassingen/12 maanden waarvan max. 2/teelt                 |
| Ter bestrijding van          | : valse meeldauw(Bremia lactucae)                                     |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7-14 dagen            |
| Ter bestrijding van          | : zwartrot (rhizoctonia)(Rhizoctonia solani)                          |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                           |
| Te behandelen                | : <b>slasoorten (onder bescherming)</b>                               |
| Opmerking                    | : max. 4 toepassingen/12 maanden waarvan max. 2/teelt                 |
| Ter bestrijding van          | : valse meeldauw(Bremia lactucae)                                     |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7-14 dagen            |
| Ter bestrijding van          | : zwartrot (rhizoctonia)(Rhizoctonia solani)                          |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen                                            |
| Veiligheidstermijn           | : 30 dagen                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : /                                                                   |
| Te behandelen                | : <b>andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (open lucht)</b>        |
| Opmerking                    | : max. 4 toepassingen/12 maanden                                      |
| Ter bestrijding van          | : zwartrot (rhizoctonia)(Rhizoctonia solani)                          |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7-14 dagen            |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                           |
| Te behandelen                | : <b>andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (onder bescherming)</b> |
| Opmerking                    | : max. 4 toepassingen/12 maanden                                      |
| Ter bestrijding van          | : zwartrot (rhizoctonia)(Rhizoctonia solani)                          |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                |
| Veiligheidstermijn           | : 30 dagen                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : /                                                                   |
| Te behandelen                | : <b>veldsla (onder bescherming)</b>                                  |
| Toepassingsstadium           | : 14 dagen na zaaien of planten (BBCH 10-16)                          |
| Ter bestrijding van          | : zwartrot (rhizoctonia)(Rhizoctonia solani)                          |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                |
| Risicobeperkende maatregelen | : /                                                                   |

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Te behandelen                | : <b>veldsla (open lucht)</b>                                   |
| Toepassingsstadium           | : 14 dagen na zaaien of planten (BBCH 10-16)                    |
| Ter bestrijding van          | : zwartrot (rhizoctonia)(Rhizoctonia solani)                    |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                          |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                     |
| Te behandelen                | : <b>uien (drooggeogste) (open lucht)</b>                       |
| Opmerking                    | : max. 4 toepassingen/teelt                                     |
| Ter bestrijding van          | : valse meeldauw(Peronospora destructor)                        |
| Toepassingsstadium           | : preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen            |
| Dosis / Concentratie         | : 0,8-1 l/ha, 1-4 toepassingen, met een interval van 7-10 dagen |
| Ter bestrijding van          | : witvlekkenziekte(Sclerotinia squamosa - Botrytis squamosa)    |
| Toepassingsstadium           | : preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen            |
| Dosis / Concentratie         | : 0,8-1 l/ha, 1-4 toepassingen, met een interval van 7-10 dagen |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                      |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                     |
| Te behandelen                | : <b>sjalot (open lucht)</b>                                    |
| Opmerking                    | : max. 4 toepassingen/teelt                                     |
| Ter bestrijding van          | : witvlekkenziekte(Sclerotinia squamosa - Botrytis squamosa)    |
| Toepassingsstadium           | : preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen            |
| Dosis / Concentratie         | : 0,8-1 l/ha, 1-4 toepassingen, met een interval van 7-10 dagen |
| Ter bestrijding van          | : valse meeldauw(Peronospora destructor)                        |
| Toepassingsstadium           | : preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen            |
| Dosis / Concentratie         | : 0,8-1 l/ha, 1-4 toepassingen, met een interval van 7-10 dagen |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                      |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                     |
| Te behandelen                | : <b>bosuien (lente-ui) (open lucht)</b>                        |
| Opmerking                    | : max. 4 toepassingen/teelt                                     |
| Ter bestrijding van          | : valse meeldauw(Peronospora destructor)                        |
| Toepassingsstadium           | : preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen            |
| Dosis / Concentratie         | : 0,8-1 l/ha, 1-4 toepassingen, met een interval van 7-10 dagen |
| Ter bestrijding van          | : witvlekkenziekte(Sclerotinia squamosa - Botrytis squamosa)    |
| Toepassingsstadium           | : preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen            |
| Dosis / Concentratie         | : 0,8-1 l/ha, 1-4 toepassingen, met een interval van 7-10 dagen |
| Veiligheidstermijn           | : 7 dagen                                                       |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                     |

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Te behandelen                | : <b>bosuien (lente-ui) (onder bescherming)</b>                              |
| Opmerking                    | : max. 4 toepassingen/teelt                                                  |
| Ter bestrijding van          | : valse meeldauw( <i>Peronospora destructor</i> )                            |
| Toepassingsstadium           | : preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen                         |
| Dosis / Concentratie         | : 0,8-1 l/ha, 1-4 toepassingen, met een interval van 7-10 dagen              |
| Ter bestrijding van          | : witvlekkenziekte( <i>Sclerotinia squamosa</i> - <i>Botrytis squamosa</i> ) |
| Toepassingsstadium           | : preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen                         |
| Dosis / Concentratie         | : 0,8-1 l/ha, 1-4 toepassingen, met een interval van 7-10 dagen              |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                   |
| Risicobeperkende maatregelen | : /                                                                          |
| Te behandelen                | : <b>knoflook (open lucht)</b>                                               |
| Opmerking                    | : max. 2 toepassingen/teelt                                                  |
| Ter bestrijding van          | : roest( <i>Puccinia porri</i> , <i>P. allii</i> )                           |
| Toepassingsstadium           | : preventief of vanaf het waarnemen van de symptomen                         |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen, met een interval van 8-10 dagen                  |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                   |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                  |
| Te behandelen                | : <b>radijs (open lucht)</b>                                                 |
| Opmerking                    | : max. 1 toepassing/teelt                                                    |
| Ter bestrijding van          | : spikkelziekte, alternaria( <i>Alternaria brassicae</i> )                   |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                       |
| Ter bestrijding van          | : witte roest( <i>Albugo candida</i> )                                       |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                       |
| Veiligheidstermijn           | : 7 dagen                                                                    |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                  |
| Te behandelen                | : <b>radijs (onder bescherming)</b>                                          |
| Opmerking                    | : max. 1 toepassing/teelt                                                    |
| Ter bestrijding van          | : spikkelziekte, alternaria( <i>Alternaria brassicae</i> )                   |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                       |
| Ter bestrijding van          | : witte roest( <i>Albugo candida</i> )                                       |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                       |
| Veiligheidstermijn           | : 21 dagen                                                                   |
| Risicobeperkende maatregelen | : /                                                                          |
| Te behandelen                | : <b>rammenas en rettich (open lucht)</b>                                    |
| Opmerking                    | : max. 1 toepassing/teelt                                                    |
| Ter bestrijding van          | : spikkelziekte, alternaria( <i>Alternaria brassicae</i> )                   |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                       |
| Ter bestrijding van          | : witte roest( <i>Albugo candida</i> )                                       |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                       |

|                              |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veiligheidstermijn           | : 7 dagen                                                                                                                                                                |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                                                                                                              |
| Te behandelen                | : <b>rammenas en rettich (onder bescherming)</b>                                                                                                                         |
| Opmerking                    | : max. 1 toepassing/teelt                                                                                                                                                |
| Ter bestrijding van          | : spikkelziekte, alternaria( <i>Alternaria brassicae</i> )                                                                                                               |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                   |
| Ter bestrijding van          | : witte roest( <i>Albugo candida</i> )                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                   |
| Veiligheidstermijn           | : 21 dagen                                                                                                                                                               |
| Risicobeperkende maatregelen | : /                                                                                                                                                                      |
| Te behandelen                | : <b>mierikswortel (open lucht)</b>                                                                                                                                      |
| Opmerking                    | : - max. 1 toepassing/teelt<br>- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.      |
| Ter bestrijding van          | : spikkelziekte, alternaria( <i>Alternaria brassicae</i> )                                                                                                               |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                   |
| Ter bestrijding van          | : witte roest( <i>Albugo candida</i> )                                                                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                   |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                                                                                                               |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                                                                                                              |
| Te behandelen                | : <b>rode biet (kroten) (open lucht)</b>                                                                                                                                 |
| Opmerking                    | : max. 2 toepassingen/teelt                                                                                                                                              |
| Ter bestrijding van          | : cercospora-bladvlekkenziekte( <i>Cercospora beticola</i> )                                                                                                             |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen, met een interval van 14-21 dagen                                                                                                             |
| Ter bestrijding van          | : echte meeldauw( <i>Erysiphe betae</i> , <i>E. polygoni</i> )                                                                                                           |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen, met een interval van 14-21 dagen                                                                                                             |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                                                                                                               |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                                                                                                              |
| Te behandelen                | : <b>wortelpeterselie (consumptie wortels) (open lucht)</b>                                                                                                              |
| Opmerking                    | : - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden om een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- max. 2 toepassingen/teelt |
| Ter bestrijding van          | : alternaria( <i>Alternaria dauci</i> )                                                                                                                                  |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14-21 dagen                                                                                                              |
| Ter bestrijding van          | : echte meeldauw( <i>Erysiphe heraclei</i> )                                                                                                                             |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14-21 dagen                                                                                                              |
| Ter bestrijding van          | : bladvlekkenziekte( <i>Septoria petroselini</i> / <i>Cercosporidium punctum</i> )                                                                                       |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14-21 dagen                                                                                                              |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                                                                                                               |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                                                                                                              |



|                              |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Te behandelen                | : <b>engelwortel (consumptie wortels) (open lucht)</b>                                                                                                                                             |
| Opmerking                    | : Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden om een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.                                                            |
| Ter bestrijding van          | : bladvlekkenziekte( <i>Septoria apiicola</i> )                                                                                                                                                    |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                             |
| Veiligheidstermijn           | : 10 dagen                                                                                                                                                                                         |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                                                                                                                                        |
| Te behandelen                | : <b>zuring (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)</b>                                                                                                                                  |
| Opmerking                    | : - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden om een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- max. 4 toepassingen/12 maanden waarvan max. 2/teelt |
| Ter bestrijding van          | : bladvlekkenziekte/ <i>ramularia</i> ( <i>Ramularia pratensis</i> )                                                                                                                               |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen                                                                                                                                           |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                                                                                                                                         |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                                                                                                                                        |
| Te behandelen                | : <b>zuring (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)</b>                                                                                                                           |
| Opmerking                    | : - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden om een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- max. 4 toepassingen/12 maanden waarvan max. 1/teelt |
| Ter bestrijding van          | : bladvlekkenziekte/ <i>ramularia</i> ( <i>Ramularia pratensis</i> )                                                                                                                               |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                             |
| Veiligheidstermijn           | : 30 dagen                                                                                                                                                                                         |
| Risicobeperkende maatregelen | : /                                                                                                                                                                                                |
| Te behandelen                | : <b>dille (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)</b>                                                                                                                                   |
| Opmerking                    | : - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden om een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- max. 4 toepassingen/12 maanden waarvan max. 2/teelt |
| Ter bestrijding van          | : <i>alternaria</i> ( <i>Alternaria dauci</i> )                                                                                                                                                    |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14-21 dagen                                                                                                                                        |
| Ter bestrijding van          | : echte meeldauw( <i>Erysiphe heraclei</i> )                                                                                                                                                       |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14-21 dagen                                                                                                                                        |
| Ter bestrijding van          | : bladvlekkenziekte( <i>Septoria petroselinii</i> / <i>Cercosporidium punctum</i> )                                                                                                                |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14-21 dagen                                                                                                                                        |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                                                                                                                                         |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                                                                                                                                        |

Te behandelen : **dille (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)**

Opmerking : - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden om een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.  
- max. 4 toepassingen/12 maanden waarvan max. 1/teelt

Ter bestrijding van : alternaria(*Alternaria dauci*)

Dosis / Concentratie : 1 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van : echte meeldauw(*Erysiphe heraclei*)

Dosis / Concentratie : 1 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van : bladvlekkenziekte(*Septoria petroselini/Cercosporidium punctum*)

Dosis / Concentratie : 1 l/ha, 1 toepassing

Veiligheidstermijn : 30 dagen

Risicobeperkende maatregelen : /

Te behandelen : **snijselder (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)**

Opmerking : - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden om een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.  
- max. 4 toepassingen/12 maanden waarvan max. 2/teelt

Ter bestrijding van : alternaria(*Alternaria dauci*)

Dosis / Concentratie : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14-21 dagen

Ter bestrijding van : echte meeldauw(*Erysiphe heraclei*)

Dosis / Concentratie : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14-21 dagen

Ter bestrijding van : bladvlekkenziekte(*Septoria petroselini/Cercosporidium punctum*)

Dosis / Concentratie : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14-21 dagen

Veiligheidstermijn : 14 dagen

Risicobeperkende maatregelen : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek

Te behandelen : **snijselder (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)**

Opmerking : - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden om een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.  
- max. 4 toepassingen/12 maanden waarvan max. 1/teelt

Ter bestrijding van : alternaria(*Alternaria dauci*)

Dosis / Concentratie : 1 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van : echte meeldauw(*Erysiphe heraclei*)

Dosis / Concentratie : 1 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van : bladvlekkenziekte(*Septoria petroselini/Cercosporidium punctum*)

Dosis / Concentratie : 1 l/ha, 1 toepassing

Veiligheidstermijn : 30 dagen

Risicobeperkende maatregelen : /

|                              |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Te behandelen                | : <b>karwij (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)</b>                                                                                                                                  |
| Opmerking                    | : - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden om een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- max. 4 toepassingen/12 maanden waarvan max. 2/teelt |
| Ter bestrijding van          | : alternaria( <i>Alternaria dauci</i> )                                                                                                                                                            |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14-21 dagen                                                                                                                                        |
| Ter bestrijding van          | : echte meeldauw( <i>Erysiphe heraclei</i> )                                                                                                                                                       |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14-21 dagen                                                                                                                                        |
| Ter bestrijding van          | : bladvlekkenziekte( <i>Septoria petroselini</i> / <i>Cercosporidium punctum</i> )                                                                                                                 |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14-21 dagen                                                                                                                                        |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                                                                                                                                         |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                                                                                                                                        |
| Te behandelen                | : <b>karwij (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)</b>                                                                                                                           |
| Opmerking                    | : - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden om een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- max. 4 toepassingen/12 maanden waarvan max. 1/teelt |
| Ter bestrijding van          | : alternaria( <i>Alternaria dauci</i> )                                                                                                                                                            |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                             |
| Ter bestrijding van          | : echte meeldauw( <i>Erysiphe heraclei</i> )                                                                                                                                                       |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                             |
| Ter bestrijding van          | : bladvlekkenziekte( <i>Septoria petroselini</i> / <i>Cercosporidium punctum</i> )                                                                                                                 |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                             |
| Veiligheidstermijn           | : 30 dagen                                                                                                                                                                                         |
| Risicobeperkende maatregelen | : /                                                                                                                                                                                                |
| Te behandelen                | : <b>koriander (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)</b>                                                                                                                               |
| Opmerking                    | : - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden om een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- max. 4 toepassingen/12 maanden waarvan max. 2/teelt |
| Ter bestrijding van          | : alternaria( <i>Alternaria dauci</i> )                                                                                                                                                            |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14-21 dagen                                                                                                                                        |
| Ter bestrijding van          | : echte meeldauw( <i>Erysiphe heraclei</i> )                                                                                                                                                       |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14-21 dagen                                                                                                                                        |
| Ter bestrijding van          | : bladvlekkenziekte( <i>Septoria petroselini</i> / <i>Cercosporidium punctum</i> )                                                                                                                 |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14-21 dagen                                                                                                                                        |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                                                                                                                                         |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                                                                                                                                        |

|                              |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Te behandelen                | : <b>koriander (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)</b>                                                                                                                        |
| Opmerking                    | : - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden om een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- max. 4 toepassingen/12 maanden waarvan max. 1/teelt |
| Ter bestrijding van          | : alternaria( <i>Alternaria dauci</i> )                                                                                                                                                            |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                             |
| Ter bestrijding van          | : echte meeldauw( <i>Erysiphe heraclei</i> )                                                                                                                                                       |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                             |
| Ter bestrijding van          | : bladvlekkenziekte( <i>Septoria petroselini/Cercosporidium punctum</i> )                                                                                                                          |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                             |
| Veiligheidstermijn           | : 30 dagen                                                                                                                                                                                         |
| Risicobeperkende maatregelen | : /                                                                                                                                                                                                |
| Te behandelen                | : <b>lavas, maggiplant (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)</b>                                                                                                                       |
| Opmerking                    | : - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden om een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- max. 4 toepassingen/12 maanden waarvan max. 2/teelt |
| Ter bestrijding van          | : alternaria( <i>Alternaria dauci</i> )                                                                                                                                                            |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14-21 dagen                                                                                                                                        |
| Ter bestrijding van          | : echte meeldauw( <i>Erysiphe heraclei</i> )                                                                                                                                                       |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14-21 dagen                                                                                                                                        |
| Ter bestrijding van          | : bladvlekkenziekte( <i>Septoria petroselini/Cercosporidium punctum</i> )                                                                                                                          |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14-21 dagen                                                                                                                                        |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                                                                                                                                         |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                                                                                                                                        |
| Te behandelen                | : <b>lavas, maggiplant (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)</b>                                                                                                                |
| Opmerking                    | : - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden om een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- max. 4 toepassingen/12 maanden waarvan max. 1/teelt |
| Ter bestrijding van          | : alternaria( <i>Alternaria dauci</i> )                                                                                                                                                            |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                             |
| Ter bestrijding van          | : echte meeldauw( <i>Erysiphe heraclei</i> )                                                                                                                                                       |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                             |
| Ter bestrijding van          | : bladvlekkenziekte( <i>Septoria petroselini/Cercosporidium punctum</i> )                                                                                                                          |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                             |
| Veiligheidstermijn           | : 30 dagen                                                                                                                                                                                         |
| Risicobeperkende maatregelen | : /                                                                                                                                                                                                |

|                              |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Te behandelen                | : <b>peterselie (consumptie bladeren en/of stengels)<br/>(onder bescherming)</b>                                                                                                                            |
| Opmerking                    | : - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het<br>aangeraden om een test te doen op enkele plantjes<br>alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- max. 4 toepassingen/12 maanden waarvan max.<br>1/teelt |
| Ter bestrijding van          | : alternaria( <i>Alternaria dauci</i> )                                                                                                                                                                     |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                      |
| Ter bestrijding van          | : echte meeldauw( <i>Erysiphe heraclei</i> )                                                                                                                                                                |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                      |
| Ter bestrijding van          | : bladvlekkenziekte( <i>Septoria<br/>petroselini/Cercosporidium punctum</i> )                                                                                                                               |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                                      |
| Veiligheidstermijn           | : 30 dagen                                                                                                                                                                                                  |
| Risicobeperkende maatregelen | : /                                                                                                                                                                                                         |
| Te behandelen                | : <b>peterselie (consumptie bladeren en/of stengels)<br/>(open lucht)</b>                                                                                                                                   |
| Opmerking                    | : - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het<br>aangeraden om een test te doen op enkele plantjes<br>alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- max. 4 toepassingen/12 maanden waarvan max.<br>2/teelt |
| Ter bestrijding van          | : alternaria( <i>Alternaria dauci</i> )                                                                                                                                                                     |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van<br>14-21 dagen                                                                                                                                              |
| Ter bestrijding van          | : echte meeldauw( <i>Erysiphe heraclei</i> )                                                                                                                                                                |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van<br>14-21 dagen                                                                                                                                              |
| Ter bestrijding van          | : bladvlekkenziekte( <i>Septoria<br/>petroselini/Cercosporidium punctum</i> )                                                                                                                               |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van<br>14-21 dagen                                                                                                                                              |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                                                                                                                                                  |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                                                                                                                                                 |
| Te behandelen                | : <b>kervel (consumptie bladeren en/of stengels) (open<br/>lucht)</b>                                                                                                                                       |
| Opmerking                    | : - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het<br>aangeraden om een test te doen op enkele plantjes<br>alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- max. 4 toepassingen/12 maanden waarvan max.<br>2/teelt |
| Ter bestrijding van          | : alternaria( <i>Alternaria dauci</i> )                                                                                                                                                                     |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van<br>14-21 dagen                                                                                                                                              |
| Ter bestrijding van          | : echte meeldauw( <i>Erysiphe heraclei</i> )                                                                                                                                                                |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van<br>14-21 dagen                                                                                                                                              |
| Ter bestrijding van          | : bladvlekkenziekte( <i>Septoria<br/>petroselini/Cercosporidium punctum</i> )                                                                                                                               |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van<br>14-21 dagen                                                                                                                                              |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                                                                                                                                                  |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                                                                                                                                                 |

|                              |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Te behandelen                | : <b>kervel (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)</b>                                                                                                                           |
| Opmerking                    | : - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden om een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.<br>- max. 4 toepassingen/12 maanden waarvan max. 1/teelt |
| Ter bestrijding van          | : alternaria( <i>Alternaria dauci</i> )                                                                                                                                                            |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                             |
| Ter bestrijding van          | : echte meeldauw( <i>Erysiphe heraclei</i> )                                                                                                                                                       |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                             |
| Ter bestrijding van          | : bladvlekkenziekte( <i>Septoria petroselini/Cercosporidium punctum</i> )                                                                                                                          |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1 toepassing                                                                                                                                                                             |
| Veiligheidstermijn           | : 30 dagen                                                                                                                                                                                         |
| Risicobeperkende maatregelen | : /                                                                                                                                                                                                |
| Te behandelen                | : <b>lupine (open lucht)</b>                                                                                                                                                                       |
| Ter bestrijding van          | : anthracnose( <i>Colletotrichum lupini</i> )                                                                                                                                                      |
| Toepassingsstadium           | : vanaf het waarnemen van de symptomen                                                                                                                                                             |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14-28 dagen                                                                                                                                        |
| Veiligheidstermijn           | : 35 dagen                                                                                                                                                                                         |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                                                                                                                                        |
| Te behandelen                | : <b>rabarber (open lucht)</b>                                                                                                                                                                     |
| Ter bestrijding van          | : bladvlekkenziekte/ <i>ramularia</i> ( <i>Ramularia rhei</i> )                                                                                                                                    |
| Dosis / Concentratie         | : 0,8 l/ha, 1-2 toepassingen                                                                                                                                                                       |
| Veiligheidstermijn           | : 14 dagen                                                                                                                                                                                         |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                                                                                                                                        |
| Te behandelen                | : <b>tomaten (onder bescherming)</b>                                                                                                                                                               |
| Ter bestrijding van          | : echte meeldauw( <i>Leveillula taurica</i> )                                                                                                                                                      |
| Dosis / Concentratie         | : 0,8 l/ha, 1-3 toepassingen                                                                                                                                                                       |
| Ter bestrijding van          | : alternariarot( <i>Alternaria solani</i> )                                                                                                                                                        |
| Dosis / Concentratie         | : 0,8 l/ha, 1-3 toepassingen                                                                                                                                                                       |
| Veiligheidstermijn           | : 1 dag                                                                                                                                                                                            |
| Risicobeperkende maatregelen | : /                                                                                                                                                                                                |
| Te behandelen                | : <b>rucola (open lucht)</b>                                                                                                                                                                       |
| Opmerking                    | : Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.                                                               |
| Ter bestrijding van          | : valse meeldauw( <i>Peronospora brassicae</i> ( <i>Peronospora parasitica</i> ))                                                                                                                  |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen, met een interval van 7-14 dagen                                                                                                                                        |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                                                                                                                                        |

|                              |                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Te behandelen                | : <b>rucola (onder bescherming)</b>                                                                                                  |
| Opmerking                    | : Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. |
| Ter bestrijding van          | : valse meeldauw( <i>Peronospora brassicae</i> ( <i>Peronospora parasitica</i> ))                                                    |
| Dosis / Concentratie         | : 1 l/ha, 1-2 toepassingen, met een interval van 7-14 dagen                                                                          |
| Risicobeperkende maatregelen | : /                                                                                                                                  |
| Te behandelen                | : <b>gazons en grasvelden (behalve golfterreinen) (open lucht)</b>                                                                   |
| Opmerking                    | : max. 4 toepassingen/12 maanden                                                                                                     |
| Ter bestrijding van          | : anthracnose( <i>Colletotrichum graminicola</i> )                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 0,95 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 14 dagen                                                                          |
| Ter bestrijding van          | : sneeuwschimmel/fusariose( <i>Fusarium nivale</i> , <i>Fusarium roseum</i> )                                                        |
| Dosis / Concentratie         | : 0,95 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 14 dagen                                                                          |
| Ter bestrijding van          | : zwartrot ( <i>rhizoctonia</i> )( <i>Rhizoctonia solani</i> )                                                                       |
| Dosis / Concentratie         | : 0,95 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 14 dagen                                                                          |
| Ter bestrijding van          | : Dollarspot( <i>Sclerotinia homoeocarpa</i> )                                                                                       |
| Dosis / Concentratie         | : 0,95 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 14 dagen                                                                          |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                                                                          |
| Te behandelen                | : <b>golfterreinen (open lucht)</b>                                                                                                  |
| Opmerking                    | : max. 4 toepassingen/12 maanden                                                                                                     |
| Ter bestrijding van          | : anthracnose( <i>Colletotrichum graminicola</i> )                                                                                   |
| Dosis / Concentratie         | : 0,95 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 14 dagen                                                                          |
| Ter bestrijding van          | : sneeuwschimmel/fusariose( <i>Fusarium nivale</i> , <i>Fusarium roseum</i> )                                                        |
| Dosis / Concentratie         | : 0,95 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 14 dagen                                                                          |
| Ter bestrijding van          | : zwartrot ( <i>rhizoctonia</i> )( <i>Rhizoctonia solani</i> )                                                                       |
| Dosis / Concentratie         | : 0,95 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 14 dagen                                                                          |
| Ter bestrijding van          | : Dollarspot( <i>Sclerotinia homoeocarpa</i> )                                                                                       |
| Dosis / Concentratie         | : 0,95 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 14 dagen                                                                          |
| Risicobeperkende maatregelen | : Bufferzone van 5 m met klassieke techniek                                                                                          |

Algemene opmerking :

/

## Bijlage 2

CLP-etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 en  
Verordening (EG) Nr. 547/2011

Signaalwoorden :

Waarschuwing

Gevarenpictogrammen en hun GHS-code :

GHS09

Gevarenaanduidingen (H-zinnen):

H410

Aanvullende informatie(EUH-zinnen) :

EUH208

EUH401

Standaardzinnen bijzondere risico's (R SH-zinnen) :Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) :

P391