



FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DG Dier, Plant en Voeding (DG4)

DIENST
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN
MESTSTOFFEN

SYNGENTA CROP PROTECTION N.V.
POSTBUS 512
4600 AM BERGEN OP ZOOM
NEDERLAND

Correspondent :

PAULUS BENOIT
Attaché
02 524 7392

Onze referten :

Dossiernummer : 15360

Datum : 05/01/2017

1/15

Betreft : Harmonisatie babyleaf

TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL OF TOEVOEGINGSSTOF

1. Algemene bepalingen van de toelating

In toepassing van de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21/10/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad, en het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, en overeenkomstig het advies van het Erkenningscomité, wordt het product :

PLENUM

met de hieronder vermelde specificaties en voorwaarden toegelaten onder het

nummer : **9398P/B**

voor : **BEROEPSGEBRUIK**

als : Insecticide

op naam van : SYNGENTA CROP PROTECTION N.V.



2. Samenstelling en vorm2.1. Algemene bepalingen :

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening Nr. 1107/2009 moeten de samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de bij de aanvraag of later verstrekte gegevens.

2.2. Werkzame stof(fen) en gewaarborgde gehalte(n) :

PYMETROZIN

50 %

Algemene opmerking

/

2.3. Formuleringstype : WG (Water dispergeerbaar granulaat)3. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Zie bijlage

4. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen4.1. Gevarencategorie(ën) : Schadelijk

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) Nr. 547/2011 van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen en het KB van 28/02/1994 tot regeling van de indeling en de verpakking moeten de volgende vermeldingen op het etiket vermeld worden.

4.2. De volgende symbolen van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG of van de bijlage XIV van het KB van 28/02/1994 en het KB van 11/01/1193 tot regeling van de indeling en de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op de markt brengen of het gebruik ervan :

Xn

4.3. De volgende R en S zinnen van de bijlage XIII van het KB van 28/02/1994 :

4.3.1. R40-R53

4.3.2. S2-S13-S20/21-S23-S36/37

4.4. Aantal punten toegekend in toepassing van art. 2bis §1 van het KB van 14/01/2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten :

1

4.5. Andere vermeldingen :

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPo2: Was alle beschermende kleding na gebruik.
- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de

wachttermijn voor de oogst te verkorten.

- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.
- SPE3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).
- SPE8: Gevaarlijk voor bijen. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken.
- SPO: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2:

- Op het etiket te vermelden co-formulanten: /
- P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
- P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

5. Geldigheidsduur van de toelating

5.1. Geldigheidsduur : vanaf 05/01/2017 tot en met 30/06/2018

5.2. Bijzondere voorwaarden voor de verlenging :

/

Deze toelating vervangt elke voorgaande toelating betreffende dit product.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:

De toelating is slechts geldig voor zover mij de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

GUELTON O.
Celhoofd Toelatingen

Bijlage 1

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden :

Te behandelen	: babyleaf (geogst tot het stadium 8 bladeren) (open lucht)
Opmerking	: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardappelpootgoedteelt (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,3 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7-14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardappelen (open lucht)
Toepassingsstadium	: vóór 10 juni en/of na 30 juni
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,3 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minimum 7 dagen of volgens de waarschuwingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming)
Opmerking	: Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: chrysant, roos, gerbera, begonia, dieffenbachia.
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 20 g/100 l, 1-3 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht)
Toepassingsstadium	: niet tijdens de bloei
Opmerking	: Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: chrysant, roos, gerbera, begonia, dieffenbachia.
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 20 g/100 l, 1-3 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: tomaten (onder bescherming)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: witte vliegen(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)
Dosis / Concentratie	: 0,3 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen

Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen
Veiligheidstermijn	: 1 dag
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: aubergine/eierplant en pepino (onder bescherming)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: witte vliegen(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)
Dosis / Concentratie	: 0,3 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen
Veiligheidstermijn	: 1 dag
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: komkommer (onder bescherming)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen
Ter bestrijding van	: witte vliegen(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)
Dosis / Concentratie	: 0,3 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen
Veiligheidstermijn	: 1 dag
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: augurk (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 kg/ha voor horizontale teelt of 0,1 kg/ha haag voor verticale teelt, 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: augurk (onder bescherming)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 kg/ha voor horizontale teelt of 0,1 kg/ha haag voor verticale teelt, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen
Ter bestrijding van	: witte vliegen(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)
Dosis / Concentratie	: 0,6 kg/ha voor horizontale teelt of 0,3 kg/ha haag voor verticale teelt, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen
Veiligheidstermijn	: 1 dag
Risicobeperkende maatregelen	: /

Te behandelen	: paprika/spaanse peper (onder bescherming)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,1 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen
Ter bestrijding van	: witte vliegen(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)
Dosis / Concentratie	: 0,3 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen
Veiligheidstermijn	: 1 dag
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: slasoorten (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: slasoorten (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: rucola (open lucht)
Opmerking	: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: rucola (onder bescherming)
Opmerking	: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen

Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: courgette/patisson (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: courgette/patisson (onder bescherming)
Opmerking	: max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 kg/ha voor horizontale teelt of 0,1 kg/ha haag voor verticale teelt, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen
Ter bestrijding van	: witte vliegen(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)
Dosis / Concentratie	: 0,6 kg/ha voor horizontale teelt of 0,3 kg/ha haag voor verticale teelt, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen
Veiligheidstermijn	: 1 dag
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (open lucht)
Opmerking	: Het product heeft een minder goede werking tegen Brevicoryne brassicae.
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7-10 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: broccoli (open lucht)
Opmerking	: Het product heeft een minder goede werking tegen Brevicoryne brassicae.
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7-10 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: bloemkool (witte en groene) (open lucht)
Opmerking	: Het product heeft een minder goede werking tegen Brevicoryne brassicae.
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7-10 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: spruitkool (open lucht)
Opmerking	: Het product heeft een minder goede werking tegen Brevicoryne brassicae.

Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardbeien (productieveld) (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor bloei (< BBCH 60) of na de oogst (> BBCH 89)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 10-14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor bloei (< BBCH 60) of BBCH 91-97
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 10-14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardbeien (productieveld) (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: voor bloei (< BBCH 60) of na de oogst (> BBCH 89)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7-14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (onder bescherming)
Toepassingsstadium	: voor bloei (< BBCH 60) of BBCH 91-97
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7-14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: stekelbes (kruisbes) en kruisingen (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 7-14 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: stekelbes (kruisbes) en kruisingen (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 7-14 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /

Te behandelen	: aalbessen (witte, rode, zwarte) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 7-14 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aalbessen (witte, rode, zwarte) (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 7-14 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: veenbessen (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 7-14 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: veenbessen (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 7-14 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: blauwe / rode bosbessen (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 7-14 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: blauwe / rode bosbessen (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 7-14 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: abrikoos (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 7-14 dagen
Veiligheidstermijn	: 21 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek

Te behandelen	: perzikbomen (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 7-14 dagen
Veiligheidstermijn	: 21 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Te behandelen	: frambozenstruiken (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 kg/ha haag, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: frambozenstruiken (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 kg/ha haag, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: braamstruiken (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 kg/ha haag, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: braamstruiken (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 kg/ha haag, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: Chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna (open lucht)
Opmerking	: Het product heeft een minder goede werking tegen Brevicoryne brassicae.
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: boerenkool (krulkool, palmboerenkool) (open lucht)
Opmerking	: Het product heeft een minder goede werking tegen Brevicoryne brassicae.
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen

Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: hop (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 20 g/100 l of 0,2 kg/ha haag, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 21 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterkoolzaad (open lucht)
Toepassingsstadium	: De bloemknoppen zijn zichtbaar van bovenaf - de eerste bloemblaadjes zijn zichtbaar maar de bloemen zijn nog gesloten (BBCH 51-59)
Ter bestrijding van	: koolzaadglanskever(Meligethes aeneus, M. viridescens)
Dosis / Concentratie	: 0,15 kg/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomerkoolzaad (open lucht)
Toepassingsstadium	: De bloemknoppen zijn zichtbaar van bovenaf - de eerste bloemblaadjes zijn zichtbaar maar de bloemen zijn nog gesloten (BBCH 51-59)
Ter bestrijding van	: koolzaadglanskever(Meligethes aeneus, M. viridescens)
Dosis / Concentratie	: 0,15 kg/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: spinazie (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: warmoes (snijbiet) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: knolselder (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-3 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: pompoen (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 1 dag
Risicobeperkende maatregelen	: /

Te behandelen	: meloen (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 1 dag
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: suikermâis (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: babyleaf (geogst tot het stadium 8 bladeren) (onder bescherming)
Opmerking	: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 14 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: postelein (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zuring (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zeekraal (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen	: radijs (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10-14 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: rammenas en rettich (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 10-14 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: koolrabi (koolraap-boven-de-grond) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 10-14 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: koolrabi (koolraap-boven-de-grond) (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 10-14 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: veldsla (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-3 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: veldsla (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-3 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: selderij (bleek-, groene en witte) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-3 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: selderij (bleek-, groene en witte) (onder bescherming)

Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-3 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: knolvenkel (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-3 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: knolvenkel (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-3 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: groengeoogste erwten (zonder peul) (open lucht)
Toepassingsstadium	: Tot begin van de bloei: 10% van de bloemen open (< BBCH 61)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,24 kg/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: groengeoogste erwten (met peul) (open lucht)
Toepassingsstadium	: Tot begin van de bloei: 10% van de bloemen open (< BBCH 61)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,24 kg/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: stamslabonen (prinsessen-, snijbonen) (groengeoogst, met peul) (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,2 kg/ha haag voor een verticale teelt of 0,2 kg/ha voor een horizontale teelt, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: sierplanten (eenjarige) (niet bestemd voor consumptie)(onder bescherming)
Ter bestrijding van	: witte vliegen(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)
Dosis / Concentratie	: 60 g/100 l, 1-3 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: /

Algemene opmerking :

/

Bijlage 2

CLP-etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 en
Verordening (EG) Nr. 547/2011

Signaalwoorden :

Waarschuwing

Gevarenpictogrammen en hun GHS-code :

GHS08



GHS09

Gevarenaanduidingen (H-zinnen):

H351

H410

Aanvullende informatie(EUH-zinnen) :

EUH210

EUH401

Standaardzinnen bijzondere risico's (R SH-zinnen) :Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) :

P102
P280
P501

P270
P363

P272
P391

P273
P308+P313