



FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,  
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DG Dier, Plant en Voeding (DG4)

DIENST  
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  
MESTSTOFFEN

NUFARM B.V.

RIVIUM QUADRANT 75-7  
2909 CAPELLE A/D IJSSEL  
NEDERLAND

Correspondent :

VALERIE VANDENBERGE

Attaché

02 524 7242

Onze referten :

Dossiernummer : 16773

Datum : 02/06/2020

1/37

Betreft : overdracht

**TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL OF TOEVOEGINGSSTOF**

1. Algemene bepalingen van de toelating

In toepassing van de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21/10/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad, en het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, en overeenkomstig het advies van het Erkenningscomité, wordt het product :

**FUSILADE MAX**

met de hieronder vermelde specificaties en voorwaarden toegelaten onder het

nummer : **9476P/B**

voor : **BEROEPSGEBRUIK**

als : Herbicide

op naam van : NUFARM B.V.



2. Samenstelling en vorm2.1. Algemene bepalingen :

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening Nr. 1107/2009 moeten de samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de bij de aanvraag of later verstrekte gegevens.

2.2. Werkzame stof(fen) en gewaarborgde gehalte(n) :

FLUAZIFOP-P-BUTYL 125 g/l

Algemene opmerking

/

2.3. Formuleringstype : EC (Emulgeerbaar concentraat)3. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Zie bijlage

4. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen4.1. Gevarencategorie(ën) :

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) Nr. 547/2011 van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen en het KB van 28/02/1994 tot regeling van de indeling en de verpakking moeten de volgende vermeldingen op het etiket vermeld worden.

4.2. De volgende symbolen van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG of van de bijlage XIV van het KB van 28/02/1994 en het KB van 11/01/1193 tot regeling van de indeling en de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op de markt brengen of het gebruik ervan :

4.3. De volgende R en S zinnen van de bijlage XIII van het KB van 28/02/1994 :

4.3.1. /

4.3.2. /

4.4. Aantal punten toegekend in toepassing van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten :

3.4

4.5. Andere vermeldingen :

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
- SPE3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt

gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2:

- Op het etiket te vermelden co-formulanten: /
- H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
- P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.

## 5. Geldigheidsduur van de toelating

5.1. Geldigheidsduur : vanaf 02/06/2020 tot en met 31/12/2022

5.2. Bijzondere voorwaarden voor de verlenging :

Evaluatie van het dossier voor de hererkenning

Deze toelating vervangt elke voorgaande toelating betreffende dit product.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:

De toelating is slechts geldig voor zover mij de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

GUELTON O.  
Celhoofd Toelatingen

## Bijlage 1

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden :

Te behandelen	: <b>druivelaars (tafeldruiven) (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/12 maanden - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: kweekgras ( <i>Agropyron repens</i> )
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: raaigras ( <i>Lolium spp.</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden ( <i>Poaceae</i> (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: duist ( <i>Alopecurus myosuroides</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver ( <i>Avena fatua</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag (volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: windhalm ( <i>Apera spica-venti</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 28 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>rammenas en rettich (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden ( <i>Poaceae</i> (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: kweekgras ( <i>Agropyron repens</i> )
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: duist ( <i>Alopecurus myosuroides</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: windhalm ( <i>Apera spica-venti</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver ( <i>Avena fatua</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras(Lolium spp.)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 56 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>schorseneren (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden(Poaceae (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: duist(Alopecurus myosuroides)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: kweekgras(Agropyron repens)
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: windhalm(Apera spica-venti)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver(Avena fatua)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras(Lolium spp.)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 56 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>peterselie (consumptie bladeren) (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: duist(Alopecurus myosuroides)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van	: wilde haver( <i>Avena fatua</i> )
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot( <i>Echinochloa crus-galli</i> )
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras( <i>Lolium spp.</i> )
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 35 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>mierikswortel (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden( <i>Poaceae</i> (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: kweekgras( <i>Agropyron repens</i> )
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver( <i>Avena fatua</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot( <i>Echinochloa crus-galli</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras( <i>Lolium spp.</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 56 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen	: <b>rucola (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: duist(Alopecurus myosuroides)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver(Avena fatua)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: windhalm(Apera spica-venti)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras(Lolium spp.)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 42 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>dille (consumptie bladeren) (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: duist(Alopecurus myosuroides)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: windhalm(Apera spica-venti)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver(Avena fatua)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras(Lolium spp.)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 35 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen	: <b>koriander (consumptie bladeren) (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Toepassingsstadium Dosis / Concentratie	: duist(Alopecurus myosuroides) : 2 bladeren - 3 bladeren : 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van Toepassingsstadium Dosis / Concentratie	: wilde haver(Avena fatua) : 2 bladeren - 3 bladeren : 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van Toepassingsstadium Dosis / Concentratie	: graanopslag(volunteers of cereals) : 2 bladeren - 3 bladeren : 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van Toepassingsstadium Dosis / Concentratie	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli) : 2 bladeren - 3 bladeren : 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van Toepassingsstadium Dosis / Concentratie	: windhalm(Apera spica-venti) : 2 bladeren - 3 bladeren : 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van Toepassingsstadium Dosis / Concentratie	: raaigras(Lolium spp.) : 2 bladeren - 3 bladeren : 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 35 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>lavas, maggiplant (consumptie bladeren) (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van Toepassingsstadium Dosis / Concentratie	: duist(Alopecurus myosuroides) : 2 bladeren - 3 bladeren : 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van Toepassingsstadium Dosis / Concentratie	: wilde haver(Avena fatua) : 2 bladeren - 3 bladeren : 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van Toepassingsstadium Dosis / Concentratie	: graanopslag(volunteers of cereals) : 2 bladeren - 3 bladeren : 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van Toepassingsstadium Dosis / Concentratie	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli) : 2 bladeren - 3 bladeren : 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van Toepassingsstadium Dosis / Concentratie	: windhalm(Apera spica-venti) : 2 bladeren - 3 bladeren : 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van Toepassingsstadium Dosis / Concentratie	: raaigras(Lolium spp.) : 2 bladeren - 3 bladeren : 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 35 dagen



Risicobeperkende maatregelen : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen : **engelwortel (consumptie bladeren) (open lucht)**

Opmerking : - max. 1 toepassing/teelt  
 - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden  
 - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van : duist(Alopecurus myosuroides)  
 Toepassingsstadium : 2 bladeren - 3 bladeren  
 Dosis / Concentratie : 1 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van : wilde haver(Avena fatua)  
 Toepassingsstadium : 2 bladeren - 3 bladeren  
 Dosis / Concentratie : 1,5 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van : graanopslag(volunteers of cereals)  
 Toepassingsstadium : 2 bladeren - 3 bladeren  
 Dosis / Concentratie : 1,5 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van : hanenpoot(Echinochloa crus-galli)  
 Toepassingsstadium : 2 bladeren - 3 bladeren  
 Dosis / Concentratie : 1 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van : windhalm(Apera spica-venti)  
 Toepassingsstadium : 2 bladeren - 3 bladeren  
 Dosis / Concentratie : 1,5 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van : raaigras(Lolium spp.)  
 Toepassingsstadium : 2 bladeren - 3 bladeren  
 Dosis / Concentratie : 1,5 l/ha, 1 toepassing

Veiligheidstermijn : 35 dagen

Risicobeperkende maatregelen : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen : **selderij (bleek-, groene en witte) (open lucht)**

Opmerking : - max. 1 toepassing/teelt  
 - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden

Ter bestrijding van : windhalm(Apera spica-venti)  
 Toepassingsstadium : 2-3 bladstadium  
 Dosis / Concentratie : 1,5 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van : wilde haver(Avena fatua)  
 Toepassingsstadium : 2-3 bladstadium  
 Dosis / Concentratie : 1,5 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van : graanopslag(volunteers of cereals)  
 Toepassingsstadium : 2-3 bladstadium  
 Dosis / Concentratie : 1,5 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van : duist(Alopecurus myosuroides)  
 Toepassingsstadium : 2-3 bladstadium  
 Dosis / Concentratie : 1 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van : hanenpoot(Echinochloa crus-galli)  
 Toepassingsstadium : 2-3 bladstadium  
 Dosis / Concentratie : 1 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van : raaigras(Lolium spp.)  
 Toepassingsstadium : 2-3 bladstadium  
 Dosis / Concentratie : 1,5 l/ha, 1 toepassing

Veiligheidstermijn : 42 dagen

Risicobeperkende maatregelen : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen	: <b>knolselder (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden(Poaceae (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: duist(Alopecurus myosuroides)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: kweekgras(Agropyron repens)
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: windhalm(Apera spica-venti)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver(Avena fatua)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras(Lolium spp.)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 56 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>knolvenkel (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: windhalm(Apera spica-venti)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver(Avena fatua)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: duist(Alopecurus myosuroides)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van	: raaigras(Lolium spp.)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 42 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: windhalm(Apera spica-venti)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver(Avena fatua)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: duist(Alopecurus myosuroides)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras(Lolium spp.)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 42 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>pastinaak (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden(Poaceae (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: kweekgras(Agrocyron repens)
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: windhalm(Apera spica-venti)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver(Avena fatua)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van	: duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot( <i>Echinochloa crus-galli</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras( <i>Lolium spp.</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 56 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>kervel (consumptie bladeren) (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver( <i>Avena fatua</i> )
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot( <i>Echinochloa crus-galli</i> )
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras( <i>Lolium spp.</i> )
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 35 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>slasoorten (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver( <i>Avena fatua</i> )
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras(Lolium spp.)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 42 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>spinazie (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: windhalm(Apera spica-venti)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver(Avena fatua)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: duist(Alopecurus myosuroides)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras(Lolium spp.)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 35 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>warmoes (snijbiet) (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: duist(Alopecurus myosuroides)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: windhalm(Apera spica-venti)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver(Avena fatua)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van	: hanenpoot( <i>Echinochloa crus-galli</i> )
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras( <i>Lolium spp.</i> )
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 35 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>koolraap (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden( <i>Poaceae</i> (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: kweekgras( <i>Agropyron repens</i> )
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver( <i>Avena fatua</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot( <i>Echinochloa crus-galli</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras( <i>Lolium spp.</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 56 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>wortelen (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van	: wilde haver( <i>Avena fatua</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot( <i>Echinochloa crus-galli</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras( <i>Lolium spp.</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 56 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>raap (stoppelraap, meiraap) (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot( <i>Echinochloa crus-galli</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras( <i>Lolium spp.</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden( <i>Poaceae</i> (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: kweekgras( <i>Agropyron repens</i> )
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver( <i>Avena fatua</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 56 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>uien (drooggeogste) (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden

Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden(Poaceae (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: duist(Alopecurus myosuroides)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: kweekgras(Agrocyron repens)
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: windhalm(Apera spica-venti)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver(Avena fatua)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras(Lolium spp.)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 28 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>sjalot (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden(Poaceae (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: duist(Alopecurus myosuroides)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: kweekgras(Agrocyron repens)
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: windhalm(Apera spica-venti)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver(Avena fatua)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing



Ter bestrijding van	: hanenpoot( <i>Echinochloa crus-galli</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras( <i>Lolium spp.</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 28 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/12 maanden - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden( <i>Poaceae</i> (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver( <i>Avena fatua</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot( <i>Echinochloa crus-galli</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: kweekgras( <i>Agropyron repens</i> )
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: raaigras( <i>Lolium spp.</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>tagetes (aaltjesbestrijding) (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: 4-bladstadium
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/12 maanden - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden( <i>Poaceae</i> (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van	: wilde haver( <i>Avena fatua</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot( <i>Echinochloa crus-galli</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: kweekgras( <i>Agropyron repens</i> )
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: raaigras( <i>Lolium spp.</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>aardbeien (productieveld) (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: voor de bloei (< BBCH 60) of na de oogst (> BBCH 89)
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/12 maanden - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden( <i>Poaceae</i> (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver( <i>Avena fatua</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot( <i>Echinochloa crus-galli</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: kweekgras( <i>Agropyron repens</i> )
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: raaigras( <i>Lolium spp.</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing

Veiligheidstermijn	: 42 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: voor de bloei (< BBCH 60) of BBCH 91-97
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/12 maanden - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden(Poaceae (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: duist(Alopecurus myosuroides)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver(Avena fatua)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: windhalm(Apera spica-venti)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: kweekgras(Agropyron repens)
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: raaigras(Lolium spp.)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>aalbessen (witte, rode, zwarte) (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: alleen toepassen voor de bloei of na de oogst
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/12 maanden - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden(Poaceae (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha aan de plantvoet, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: duist(Alopecurus myosuroides)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing aan de plantvoet
Ter bestrijding van	: wilde haver(Avena fatua)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing aan de plantvoet

Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing aan de plantvoet
Ter bestrijding van	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing aan de plantvoet
Ter bestrijding van	: windhalm(Apera spica-venti)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing aan de plantvoet
Ter bestrijding van	: kweekgras(Agropyron repens)
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha aan de plantvoet, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: raaigras(Lolium spp.)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing aan de plantvoet
Veiligheidstermijn	: 90 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>stekelbes (kruisbes) en kruisingen (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: alleen toepassen voor de bloei of na de oogst
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/12 maanden - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden(Poaceae (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha aan de plantvoet, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: duist(Alopecurus myosuroides)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing aan de plantvoet
Ter bestrijding van	: wilde haver(Avena fatua)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing aan de plantvoet
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing aan de plantvoet
Ter bestrijding van	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing aan de plantvoet
Ter bestrijding van	: windhalm(Apera spica-venti)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing aan de plantvoet
Ter bestrijding van	: kweekgras(Agropyron repens)
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha aan de plantvoet, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: raaigras(Lolium spp.)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing aan de plantvoet
Veiligheidstermijn	: 90 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen	: <b>frambozenstruiken (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: alleen toepassen voor de bloei of na de oogst
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/12 maanden - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden(Poaceae (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha aan de plantvoet, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: duist(Alopecurus myosuroides)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing aan de plantvoet
Ter bestrijding van	: wilde haver(Avena fatua)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing aan de plantvoet
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing aan de plantvoet
Ter bestrijding van	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing aan de plantvoet
Ter bestrijding van	: windhalm(Apera spica-venti)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing aan de plantvoet
Ter bestrijding van	: kweekgras(Agrocyron repens)
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha aan de plantvoet, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: raaigras(Lolium spp.)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing aan de plantvoet
Veiligheidstermijn	: 45 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen	: <b>braamstruiken (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: alleen toepassen voor de bloei of na de oogst
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/12 maanden - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden(Poaceae (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha aan de plantvoet, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: duist(Alopecurus myosuroides)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing aan de plantvoet
Ter bestrijding van	: wilde haver(Avena fatua)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing aan de plantvoet
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing aan de plantvoet

Ter bestrijding van	: hanenpoot( <i>Echinochloa crus-galli</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing aan de plantvoet
Ter bestrijding van	: windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing aan de plantvoet
Ter bestrijding van	: kweekgras( <i>Agropyron repens</i> )
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha aan de plantvoet, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: raaigras( <i>Lolium spp.</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing aan de plantvoet
Veiligheidstermijn	: 45 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>druivelaars (voor wijnproductie) (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/12 maanden - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden( <i>Poaceae</i> (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: kweekgras( <i>Agropyron repens</i> )
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: raaigras( <i>Lolium spp.</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver( <i>Avena fatua</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot( <i>Echinochloa crus-galli</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 28 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen	: <b>voederbieten (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden - Lagere doses mogen niet gebruikt worden op zware bodems en/of wanneer er vermoedens bestaan optreden van resistentie.
Ter bestrijding van Toepassingsstadium Dosis / Concentratie	: duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> ) : 2-3 bladstadium : 1 l/ha, eventueel gefractioneerd
Ter bestrijding van Toepassingsstadium Dosis / Concentratie	: kweekgras( <i>Agropyron repens</i> ) : 3-4 bladstadium : 3 l/ha, eventueel door 2 behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van Toepassingsstadium Dosis / Concentratie	: wilde haver( <i>Avena fatua</i> ) : 2-3 bladstadium : 1,5 l/ha, 1 toepassing.
Ter bestrijding van Toepassingsstadium Dosis / Concentratie	: hanenpoot( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) : 2-3 bladstadium : 1 l/ha, eventueel gefractioneerd
Ter bestrijding van Toepassingsstadium Dosis / Concentratie	: doorlevende grasachtige onkruiden( <i>Poaceae</i> (perennial)) : 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm : 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van Toepassingsstadium Dosis / Concentratie	: windhalm( <i>Apera spica-venti</i> ) : 2-3 bladstadium : 1,5 l/ha, 1 toepassing.
Ter bestrijding van Toepassingsstadium Dosis / Concentratie	: graanopslag(volunteers of cereals) : 2-3 bladstadium : 1,5 l/ha, 1 toepassing.
Ter bestrijding van Toepassingsstadium Dosis / Concentratie	: raaigras( <i>Lolium spp.</i> ) : 2-3 bladstadium : 1,5 l/ha, 1 toepassing.
Veiligheidstermijn	: 56 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen	: <b>suikerbieten (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden - Lagere doses mogen niet gebruikt worden op zware bodems en/of wanneer er vermoedens bestaan optreden van resistentie.
Ter bestrijding van Toepassingsstadium Dosis / Concentratie	: duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> ) : 2-3 bladstadium : 1 l/ha, eventueel gefractioneerd
Ter bestrijding van Toepassingsstadium Dosis / Concentratie	: kweekgras( <i>Agropyron repens</i> ) : 3-4 bladstadium : 3 l/ha, eventueel door 2 behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van Toepassingsstadium Dosis / Concentratie	: wilde haver( <i>Avena fatua</i> ) : 2-3 bladstadium : 1,5 l/ha, 1 toepassing.
Ter bestrijding van Toepassingsstadium Dosis / Concentratie	: hanenpoot( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) : 2-3 bladstadium : 1 l/ha, eventueel gefractioneerd

Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden(Poaceae (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: windhalm(Apera spica-venti)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing.
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing.
Ter bestrijding van	: raaigras(Lolium spp.)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing.
Veiligheidstermijn	: 56 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>winterkoolzaad (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: voor de winter
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: duist(Alopecurus myosuroides)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: windhalm(Apera spica-venti)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver(Avena fatua)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras(Lolium spp.)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>cichorei (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden(Poaceae (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: duist(Alopecurus myosuroides)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing



Ter bestrijding van	: kweekgras( <i>Agropyron repens</i> )
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver( <i>Avena fatua</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot( <i>Echinochloa crus-galli</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras( <i>Lolium spp.</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 56 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>witloofwortelteelt (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden( <i>Poaceae</i> (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: kweekgras( <i>Agropyron repens</i> )
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver( <i>Avena fatua</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot( <i>Echinochloa crus-galli</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras( <i>Lolium spp.</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 56 dagen

Risicobeperkende maatregelen : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen : **voedererwten (drooggeogst) (open lucht)**

Toepassingsstadium : voor de bloei

Opmerking : - max. 2 toepassingen/teelt  
- max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden

Ter bestrijding van : doorlevende grasachtige onkruiden(Poaceae (perennial))

Toepassingsstadium : 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm

Dosis / Concentratie : 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha

Ter bestrijding van : duist(Alopecurus myosuroides)

Toepassingsstadium : 2-3 bladstadium

Dosis / Concentratie : 1 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van : kweekgras(Agropyron repens)

Toepassingsstadium : 3-4 bladstadium

Dosis / Concentratie : 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha

Ter bestrijding van : windhalm(Apera spica-venti)

Toepassingsstadium : 2-3 bladstadium

Dosis / Concentratie : 1,5 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van : wilde haver(Avena fatua)

Toepassingsstadium : 2-3 bladstadium

Dosis / Concentratie : 1,5 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van : graanopslag(volunteers of cereals)

Toepassingsstadium : 2-3 bladstadium

Dosis / Concentratie : 1,5 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van : hanenpoot(Echinochloa crus-galli)

Toepassingsstadium : 2-3 bladstadium

Dosis / Concentratie : 1 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van : raaigras(Lolium spp.)

Toepassingsstadium : 2-3 bladstadium

Dosis / Concentratie : 1,5 l/ha, 1 toepassing

Veiligheidstermijn : 90 dagen

Risicobeperkende maatregelen : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen : **drooggeogste erwten (zonder peul) (open lucht)**

Toepassingsstadium : voor de bloei

Opmerking : - max. 2 toepassingen/teelt  
- max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden

Ter bestrijding van : doorlevende grasachtige onkruiden(Poaceae (perennial))

Toepassingsstadium : 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm

Dosis / Concentratie : 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha

Ter bestrijding van : duist(Alopecurus myosuroides)

Toepassingsstadium : 2-3 bladstadium

Dosis / Concentratie : 1 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van : kweekgras(Agropyron repens)

Toepassingsstadium : 3-4 bladstadium

Dosis / Concentratie : 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha

Ter bestrijding van	: windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver( <i>Avena fatua</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot( <i>Echinochloa crus-galli</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras( <i>Lolium spp.</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 90 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>groengeoogste erwten (met peul) (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: voor de bloei
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden(Poaceae (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: kweekgras( <i>Agropyron repens</i> )
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver( <i>Avena fatua</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot( <i>Echinochloa crus-galli</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras( <i>Lolium spp.</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 28 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen	: <b>groengeoogste erwten (zonder peul) (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: voor de bloei
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden(Poaceae (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: duist(Alopecurus myosuroides)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: kweekgras(Agrocyron repens)
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: windhalm(Apera spica-venti)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver(Avena fatua)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras(Lolium spp.)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 35 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul) (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: voor de bloei
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: kweekgras(Agrocyron repens)
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: windhalm(Apera spica-venti)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver(Avena fatua)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van	: hanenpoot( <i>Echinochloa crus-galli</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras( <i>Lolium spp.</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden( <i>Poaceae</i> (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Veiligheidstermijn	: 28 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...)</b> <b>(drooggeogst) (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: voor de bloei
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden( <i>Poaceae</i> (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: kweekgras( <i>Agropyron repens</i> )
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver( <i>Avena fatua</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot( <i>Echinochloa crus-galli</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras( <i>Lolium spp.</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 90 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen	: <b>appelbomen (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/12 maanden - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden(Poaceae (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: duist(Alopecurus myosuroides)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: kweekgras(Agrocyron repens)
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: windhalm(Apera spica-venti)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver(Avena fatua)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras(Lolium spp.)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 28 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen	: <b>perenbomen (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/12 maanden - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden(Poaceae (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: duist(Alopecurus myosuroides)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: kweekgras(Agrocyron repens)
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: windhalm(Apera spica-venti)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver(Avena fatua)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras(Lolium spp.)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 28 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>kersen- en kriekenbomen (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/12 maanden - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: wilde haver(Avena fatua)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras(Lolium spp.)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden(Poaceae (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: duist(Alopecurus myosuroides)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: kweekgras(Agrocyron repens)
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: windhalm(Apera spica-venti)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 28 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>pruimenbomen (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/12 maanden - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van	: hanenpoot( <i>Echinochloa crus-galli</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras( <i>Lolium spp.</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden( <i>Poaceae</i> (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: kweekgras( <i>Agropyron repens</i> )
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver( <i>Avena fatua</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 28 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>boomkwekerij (open lucht) (niet bestemd voor consumptie)</b>
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/12 maanden - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden( <i>Poaceae</i> (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: kweekgras( <i>Agropyron repens</i> )
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver( <i>Avena fatua</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot( <i>Echinochloa crus-galli</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing



Ter bestrijding van	: raaigras(Lolium spp.)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>knoflook (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden(Poaceae (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: duist(Alopecurus myosuroides)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: kweekgras(Agrocyron repens)
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: windhalm(Apera spica-venti)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver(Avena fatua)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras(Lolium spp.)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 28 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>rode biet (kroten) (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras(Lolium spp.)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden(Poaceae (perennial))
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium / hoogte van max. 20 cm
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: duist(Alopecurus myosuroides)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: kweekgras(Agropyron repens)
Toepassingsstadium	: 3-4 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: windhalm(Apera spica-venti)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver(Avena fatua)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 56 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>snijselder (consumptie bladeren) (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: windhalm(Apera spica-venti)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l /ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver(Avena fatua)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l /ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l /ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: duist(Alopecurus myosuroides)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 /ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras(Lolium spp.)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 /ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 35 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>asperge (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 1 toepassing/12 maanden - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: duist(Alopecurus myosuroides)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van	: windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver( <i>Avena fatua</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot( <i>Echinochloa crus-galli</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras( <i>Lolium spp.</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 42 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>vlas (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: max. 15 cm gewashoogte
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver( <i>Avena fatua</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot( <i>Echinochloa crus-galli</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras( <i>Lolium spp.</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 90 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>radijs (open lucht)</b>
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: hanenpoot( <i>Echinochloa crus-galli</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van	: raaigras(Lolium spp.)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver(Avena fatua)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: windhalm(Apera spica-venti)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: kweekgras(Agropyron repens)
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Ter bestrijding van	: doorlevende grasachtige onkruiden(Poaceae (perennial))
Toepassingsstadium	: 2-3 bladstadium
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, eventueel door twee behandelingen van 1,5 l/ha
Veiligheidstermijn	: 56 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>soja (drooggeogst, zonder peul) (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: drievoudig blad, op de 2de knoop, ontvouwd - 5de laterale scheut van eerste orde zichtbaar (BBCH 12-25)
Opmerking	: - max. 1 toepassing/teelt - max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: duist(Alopecurus myosuroides)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: hanenpoot(Echinochloa crus-galli)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: raaigras(Lolium spp.)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: wilde haver(Avena fatua)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: windhalm(Apera spica-venti)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van	: graanopslag(volunteers of cereals)
Toepassingsstadium	: 2 bladeren - 3 bladeren
Dosis / Concentratie	: 1,5 l/ha, 1 toepassing

Algemene opmerking :

/

## Bijlage 2

CLP-etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 en  
Verordening (EG) Nr. 547/2011

Signaalwoorden :

Waarschuwing

Gevarenpictogrammen en hun GHS-code :

GHS08



GHS09



Gevarenaanduidingen (H-zinnen):

H361

H410

Aanvullende informatie(EUH-zinnen) :

EUH401

Standaardzinnen bijzondere risico's (R SH-zinnen) :

Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) :

P263

P280

P391

P308+P313