



FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,  
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DG Dier, Plant en Voeding (DG4)

DIENST  
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  
MESTSTOFFEN

SYNGENTA CROP PROTECTION N.V.  
POSTBUS 512  
4600 AM BERGEN OP ZOOM  
NEDERLAND

Correspondent :

AUORE BONNECHERE  
Attaché  
02 524 7289

Onze referten :

Dossiernummer : 21267

Datum : 03/04/2018

1/11

Betreft : aanpassing van de etikettering

**TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL OF TOEVOEGINGSSTOF**

1. Algemene bepalingen van de toelating

In toepassing van de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21/10/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad, en het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, en overeenkomstig het advies van het Erkenningscomité, wordt het product :

**AXIAL**

met de hieronder vermelde specificaties en voorwaarden toegelaten onder het

nummer : **9602P/B**

voor : **BEROEPSGEBRUIK**

als : Herbicide

op naam van : SYNGENTA CROP PROTECTION N.V.



2. Samenstelling en vorm2.1. Algemene bepalingen :

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening Nr. 1107/2009 moeten de samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de bij de aanvraag of later verstrekte gegevens.

2.2. Werkzame stof(fen) en gewaarborgde gehalte(n) :

|                    |          |
|--------------------|----------|
| PINOXADEN          | 50 g/l   |
| CLOQUINTOCET-MEXYL | 12.5 g/l |

Algemene opmerking

/

2.3. Formuleringstype : EC (Emulgeerbaar concentraat)3. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Zie bijlage

4. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen4.1. Gevarencategorie(ën) : schadelijk en en milieugevaarlijk

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) Nr. 547/2011 van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen en het KB van 28/02/1994 tot regeling van de indeling en de verpakking moeten de volgende vermeldingen op het etiket vermeld worden.

4.2. De volgende symbolen van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG of van de bijlage XIV van het KB van 28/02/1994 en het KB van 11/01/1193 tot regeling van de indeling en de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op de markt brengen of het gebruik ervan :

Xn, N

4.3. De volgende R en S zinnen van de bijlage XIII van het KB van 28/02/1994 :

4.3.1. R37/38-R43-R63-R51/53

4.3.2. S2-S13-S20/21-S23-S36/37-S45-S35-S61

4.4. Aantal punten toegekend in toepassing van art. 2bis §1 van het KB van 14/01/2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten :

5

4.5. Andere vermeldingen :

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
- Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

- Pinoxaden is een ACCase-inhibitor herbicide. Slechts één toepassing per teelt van een ACCase-inhibitor is toegelaten. Om resistentie van grassen te vermijden of om resistente grassen te controleren: geen andere ACCase-inhibitor vóór of na het gebruik van pinoxaden in dezelfde teelt toepassen. In het geval van mengen met een andere ACCase-inhibitor of met een ALS-herbicide, steeds de volledige dosis van beide componenten gebruiken.
- Indien maïs, haver of raaigras als vervanggewas wordt gezaaid, moet een periode van 30 dagen tussen toepassing en zaaien van het vervanggewas worden in acht genomen.
- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.
- Voor de bereiding van de sproeioplossing is agitatie of roeren aanbevolen.

Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2:

- P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
- H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

## 5. Geldigheidsduur van de toelating

5.1. Geldigheidsduur : vanaf 03/04/2018 tot en met 30/06/2027

5.2. Bijzondere voorwaarden voor de verlenging :

/

Deze toelating vervangt elke voorgaande toelating betreffende dit product.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:

De toelating is slechts geldig voor zover mij de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

GUELTON O.  
Celhoofd Toelatingen

## Bijlage 1

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden :

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Te behandelen                | : <b>wintertarwe (open lucht)</b>                    |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren - 1ste knoop (BBCH 13-31)               |
| Opmerking                    | : max 1 toepassing/teelt                             |
| Ter bestrijding van          | : windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )               |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : wilde haver( <i>Avena fatua</i> )                  |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )             |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-begin uitstoeling (BBCH 13-20)          |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek |
| Te behandelen                | : <b>wintertarwe (zaadproductie)</b>                 |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren - 1ste knoop (BBCH 13-31)               |
| Opmerking                    | : max 1 toepassing/teelt                             |
| Ter bestrijding van          | : windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )               |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : wilde haver( <i>Avena fatua</i> )                  |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )             |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-begin uitstoeling (BBCH 13-20)          |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek |
| Te behandelen                | : <b>wintergerst (open lucht)</b>                    |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren - 1ste knoop (BBCH 13-31)               |
| Opmerking                    | : max 1 toepassing/teelt                             |
| Ter bestrijding van          | : windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )               |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : wilde haver( <i>Avena fatua</i> )                  |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )             |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-begin uitstoeling (BBCH 13-20)          |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek |
| Te behandelen                | : <b>wintergerst (zaadproductie)</b>                 |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren - 1ste knoop (BBCH 13-31)               |
| Opmerking                    | : max 1 toepassing/teelt                             |
| Ter bestrijding van          | : windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )               |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ter bestrijding van          | : wilde haver( <i>Avena fatua</i> )                  |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )             |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-begin uitstoeling (BBCH 13-20)          |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek |
| Te behandelen                | : <b>zomertarwe (open lucht)</b>                     |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Opmerking                    | : max 1 toepassing/teelt                             |
| Ter bestrijding van          | : windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )               |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : wilde haver( <i>Avena fatua</i> )                  |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )             |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-begin uitstoeling (BBCH 13-20)          |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek |
| Te behandelen                | : <b>zomertarwe (zaadproductie)</b>                  |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Opmerking                    | : max 1 toepassing/teelt                             |
| Ter bestrijding van          | : windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )               |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : wilde haver( <i>Avena fatua</i> )                  |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )             |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-begin uitstoeling (BBCH 13-20)          |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek |
| Te behandelen                | : <b>wintertarwe (open lucht)</b>                    |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren - 1ste knoop (BBCH 13-31), in de lente  |
| Opmerking                    | : max 1 toepassing/teelt                             |
| Ter bestrijding van          | : duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )             |
| Toepassingsstadium           | : begin uitstoeling-eerste knoop (BBCH 20-31)        |
| Dosis / Concentratie         | : 1,2 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : raaigras( <i>Lolium spp.</i> )                     |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 1,2 l/ha, 1 toepassing                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek |
| Te behandelen                | : <b>wintertarwe (zaadproductie)</b>                 |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren - 1ste knoop (BBCH 13-31), in de lente  |
| Opmerking                    | : max 1 toepassing/teelt                             |

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ter bestrijding van          | : duist(Alopecurus myosuroides)                      |
| Toepassingsstadium           | : begin uitstoeling-eerste knoop (BBCH 20-31)        |
| Dosis / Concentratie         | : 1,2 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : raaigras(Lolium spp.)                              |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 1,2 l/ha, 1 toepassing                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek |
| Te behandelen                | : <b>wintergerst (open lucht)</b>                    |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren - 1ste knoop (BBCH 13-31), in de lente  |
| Opmerking                    | : max 1 toepassing/teelt                             |
| Ter bestrijding van          | : duist(Alopecurus myosuroides)                      |
| Toepassingsstadium           | : begin uitstoeling-eerste knoop (BBCH 20-31)        |
| Dosis / Concentratie         | : 1,2 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : raaigras(Lolium spp.)                              |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)n                |
| Dosis / Concentratie         | : 1,2 l/ha, 1 toepassing                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek |
| Te behandelen                | : <b>wintergerst (zaadproductie)</b>                 |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren - 1ste knoop (BBCH 13-31), in de lente  |
| Opmerking                    | : max 1 toepassing/teelt                             |
| Ter bestrijding van          | : duist(Alopecurus myosuroides)                      |
| Toepassingsstadium           | : begin uitstoeling-eerste knoop (BBCH 20-31)        |
| Dosis / Concentratie         | : 1,2 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : raaigras(Lolium spp.)                              |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)n                |
| Dosis / Concentratie         | : 1,2 l/ha, 1 toepassing                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek |
| Te behandelen                | : <b>zomergerst (open lucht)</b>                     |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren - 1ste knoop (BBCH 13-31)               |
| Opmerking                    | : max 1 toepassing/teelt                             |
| Ter bestrijding van          | : windhalm(Apera spica-venti)                        |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : wilde haver(Avena fatua)                           |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : duist(Alopecurus myosuroides)                      |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-begin uitstoeling (BBCH 13-20)          |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek |
| Te behandelen                | : <b>zomergerst (zaadproductie)</b>                  |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren - 1ste knoop (BBCH 13-31)               |
| Opmerking                    | : max 1 toepassing/teelt                             |
| Ter bestrijding van          | : windhalm(Apera spica-venti)                        |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ter bestrijding van          | : wilde haver( <i>Avena fatua</i> )                  |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )             |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-begin uitstoeling (BBCH 13-20)          |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek |
| Te behandelen                | : <b>spelt (open lucht)</b>                          |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren - 1ste knoop (BBCH 13-31), in de lente  |
| Opmerking                    | : max 1 toepassing/teelt                             |
| Ter bestrijding van          | : raaigras( <i>Lolium spp.</i> )                     |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 1,2 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )             |
| Toepassingsstadium           | : begin uitstoeling-1ste knoop (BBCH 20-31)          |
| Dosis / Concentratie         | : 1,2 l/ha, 1 toepassing                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek |
| Te behandelen                | : <b>spelt (zaadproductie)</b>                       |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren - 1ste knoop (BBCH 13-31), in de lente  |
| Opmerking                    | : max 1 toepassing/teelt                             |
| Ter bestrijding van          | : raaigras( <i>Lolium spp.</i> )                     |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 1,2 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )             |
| Toepassingsstadium           | : begin uitstoeling-1ste knoop (BBCH 20-31)          |
| Dosis / Concentratie         | : 1,2 l/ha, 1 toepassing                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek |
| Te behandelen                | : <b>spelt (open lucht)</b>                          |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren - 1ste knoop (BBCH 13-31)               |
| Opmerking                    | : max 1 toepassing/teelt                             |
| Ter bestrijding van          | : windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )               |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : wilde haver( <i>Avena fatua</i> )                  |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )             |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-begin uitstoeling (BBCH 13-20)          |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek |
| Te behandelen                | : <b>spelt (zaadproductie)</b>                       |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren - 1ste knoop (BBCH 13-31)               |
| Opmerking                    | : max 1 toepassing/teelt                             |
| Ter bestrijding van          | : windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )               |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ter bestrijding van          | : wilde haver( <i>Avena fatua</i> )                  |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )             |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-begin uitstoeling (BBCH 13-20)          |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek |
| Te behandelen                | : <b>wintertriticale (open lucht)</b>                |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren - 1ste knoop (BBCH 13-31), in de lente  |
| Opmerking                    | : max 1 toepassing/teelt                             |
| Ter bestrijding van          | : duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )             |
| Toepassingsstadium           | : begin uitstoeling-eerste knoop (BBCH 20-31)        |
| Dosis / Concentratie         | : 1,2 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : raaigras( <i>Lolium spp.</i> )                     |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 1,2 l/ha, 1 toepassing                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek |
| Te behandelen                | : <b>wintertriticale (zaadproductie)</b>             |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren - 1ste knoop (BBCH 13-31), in de lente  |
| Opmerking                    | : max 1 toepassing/teelt                             |
| Ter bestrijding van          | : duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )             |
| Toepassingsstadium           | : begin uitstoeling-eerste knoop (BBCH 20-31)        |
| Dosis / Concentratie         | : 1,2 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : raaigras( <i>Lolium spp.</i> )                     |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 1,2 l/ha, 1 toepassing                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek |
| Te behandelen                | : <b>zomertriticale (open lucht)</b>                 |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren - 1ste knoop (BBCH 13-31), in de lente  |
| Opmerking                    | : max 1 toepassing/teelt                             |
| Ter bestrijding van          | : duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )             |
| Toepassingsstadium           | : begin uitstoeling-eerste knoop (BBCH 20-31)        |
| Dosis / Concentratie         | : 1,2 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : raaigras( <i>Lolium spp.</i> )                     |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 1,2 l/ha, 1 toepassing                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek |
| Te behandelen                | : <b>zomertriticale (zaadproductie)</b>              |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren - 1ste knoop (BBCH 13-31), in de lente  |
| Opmerking                    | : max 1 toepassing/teelt                             |
| Ter bestrijding van          | : duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )             |
| Toepassingsstadium           | : begin uitstoeling-eerste knoop (BBCH 20-31)        |
| Dosis / Concentratie         | : 1,2 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : raaigras( <i>Lolium spp.</i> )                     |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 1,2 l/ha, 1 toepassing                             |

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek |
| Te behandelen                | : <b>wintertriticale (open lucht)</b>                |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren - 1ste knoop (BBCH 13-31)               |
| Opmerking                    | : max 1 toepassing/teelt                             |
| Ter bestrijding van          | : windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )               |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : wilde haver( <i>Avena fatua</i> )                  |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )             |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-begin uitstoeling (BBCH 13-20)          |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek |
| Te behandelen                | : <b>wintertriticale (zaadproductie)</b>             |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren - 1ste knoop (BBCH 13-31)               |
| Opmerking                    | : max 1 toepassing/teelt                             |
| Ter bestrijding van          | : windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )               |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : wilde haver( <i>Avena fatua</i> )                  |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )             |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-begin uitstoeling (BBCH 13-20)          |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek |
| Te behandelen                | : <b>zomertriticale (open lucht)</b>                 |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren - 1ste knoop (BBCH 13-31)               |
| Opmerking                    | : max 1 toepassing/teelt                             |
| Ter bestrijding van          | : windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )               |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : wilde haver( <i>Avena fatua</i> )                  |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )             |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-begin uitstoeling (BBCH 13-20)          |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek |
| Te behandelen                | : <b>zomertriticale (zaadproductie)</b>              |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren - 1ste knoop (BBCH 13-31)               |
| Opmerking                    | : max 1 toepassing/teelt                             |
| Ter bestrijding van          | : windhalm( <i>Apera spica-venti</i> )               |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ter bestrijding van          | : wilde haver( <i>Avena fatua</i> )                  |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-1ste knoop (BBCH 13-31)                 |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Ter bestrijding van          | : duist( <i>Alopecurus myosuroides</i> )             |
| Toepassingsstadium           | : 3 bladeren-begin uitstoeling (BBCH 13-20)          |
| Dosis / Concentratie         | : 0,9 l/ha, 1 toepassing                             |
| Risicobeperkende maatregelen | : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek |

Algemene opmerking :

## Bijlage 2

CLP-etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 en  
Verordening (EG) Nr. 547/2011

Signaalwoorden :

Waarschuwing

Gevarenpictogrammen en hun GHS-code :Gevarenaanduidingen (H-zinnen):

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| H317 | H335 | H361 | H410 |
|------|------|------|------|

Aanvullende informatie(EUH-zinnen) :

EUH401

Standaardzinnen bijzondere risico's (R SH-zinnen) :Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) :

|                   |                   |      |      |
|-------------------|-------------------|------|------|
| P261<br>P302+P352 | P263<br>P308+P313 | P280 | P391 |
|-------------------|-------------------|------|------|