



FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DG Dier, Plant en Voeding (DG4)

DIENST
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN
MESTSTOFFEN

SYNGENTA CROP PROTECTION N.V.
POSTBUS 512
4600 AM BERGEN OP ZOOM
NEDERLAND

Correspondent :

VALÉRIE SEUTIN
Attaché
02 524 7282

Onze referten :

Dossiernummer : 21752

Datum : 21/08/2015

1/13

Betreft : Aanpassing van de bufferzones

TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL OF TOEVOEGINGSSTOF

1. Algemene bepalingen van de toelating

In toepassing van de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21/10/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad, en het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, en overeenkomstig het advies van het Erkenningscomité, wordt het product :

REVUS

met de hieronder vermelde specificaties en voorwaarden toegelaten onder het

nummer : **9604P/B**

voor : **BEROEPSGEBRUIK**

als : Fungicide

op naam van : SYNGENTA CROP PROTECTION N.V.



2. Samenstelling en vorm2.1. Algemene bepalingen :

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening Nr. 1107/2009 moeten de samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de bij de aanvraag of later verstrekte gegevens.

2.2. Werkzame stof(fen) en gewaarborgde gehalte(n) :

MANDIPROPAMID

250 g/l

Algemene opmerking

/

2.3. Formuleringstype : SC (Suspensie concentraat)3. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Zie bijlage

4. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen4.1. Gevarencategorie(ën) : /

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) Nr. 547/2011 van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen en het KB van 28/02/1994 tot regeling van de indeling en de verpakking moeten de volgende vermeldingen op het etiket vermeld worden.

4.2. De volgende symbolen van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG of van de bijlage XIV van het KB van 28/02/1994 en het KB van 11/01/1193 tot regeling van de indeling en de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op de markt brengen of het gebruik ervan :

/

4.3. De volgende R en S zinnen van de bijlage XIII van het KB van 28/02/1994 :

4.3.1. R52/53

4.3.2. S2-S13-S20/21-S61

4.4. Aantal punten toegekend in toepassing van art. 2bis §1 van het KB van 14/01/2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten :

0

4.5. Andere vermeldingen :

- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.
- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
- SPE3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2:

- Op het etiket te vermelden co-formulanten: /
- P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

5. Geldigheidsduur van de toelating

5.1. Geldigheidsduur : vanaf 21/08/2015 tot en met 31/07/2024

5.2. Bijzondere voorwaarden voor de verlenging :

/

Deze toelating vervangt elke voorgaande toelating betreffende dit product.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:

De toelating is slechts geldig voor zover mij de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

GUELTON O.
Celhoofd Toelatingen

Bijlage 1

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden :

Te behandelen	: hop (open lucht)
Toepassingsstadium	: vanaf het einde van de oprichting (> BBCH 40)
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Pseudoperonospora humuli)
Dosis / Concentratie	: 0,34 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 10-21 dagen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: kervel (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snedes
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: snijelder (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snedes
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: koriander (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snedes
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: kervel (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snedes
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /

Te behandelen	: koriander (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snedes
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: karwij (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snedes
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: lavas, maggiplant (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snedes
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: dille (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snedes
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: snijzelder (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snedes
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /

Te behandelen	: lavas, maggiplant (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snedes
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: karwij (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snedes
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: dille (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snedes
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardappelen (open lucht)
Ter bestrijding van	: phytophthora(Phytophthora infestans)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-6 toepassingen met een interval van 7 dagen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardappelpootgoedteelt (open lucht)
Ter bestrijding van	: phytophthora(Phytophthora infestans)
Toepassingsstadium	: volgens de waarschuwingen
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-6 toepassingen met een interval van 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: slasoorten (open lucht)
Opmerking	: max. 6 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Bremia lactucae</i>)
Toepassingsstadium	: preventief of bij het waarnemen van de eerste symptomen
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: slasoorten (onder bescherming)
Opmerking	: max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Bremia lactucae</i>)
Toepassingsstadium	: preventief of bij het waarnemen van de eerste symptomen
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: rucola (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Peronospora brassicae</i> (<i>Peronospora parasitica</i>))
Toepassingsstadium	: preventief of bij het waarnemen van de eerste symptomen
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: rucola (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Peronospora brassicae</i> (<i>Peronospora parasitica</i>))
Toepassingsstadium	: preventief of bij het waarnemen van de eerste symptomen
Dosis / Concentratie	: 0,6l/ha, 1-2 toepassingen/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: peterselie (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Peronospora</i> spp.)
Toepassingsstadium	: preventief of bij het waarnemen van de eerste symptomen
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen	: peterselie (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Toepassingsstadium	: preventief of bij het waarnemen van de eerste symptomen
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: babyleaf (geoogst tot het stadium 8 bladeren) (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Bremia lactucae)
Toepassingsstadium	: preventief of bij het waarnemen van de eerste symptomen
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: babyleaf (geoogst tot het stadium 8 bladeren) (open lucht)
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Bremia lactucae)
Toepassingsstadium	: preventief of bij het waarnemen van de eerste symptomen
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: rode amsoi (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora brassicae (Peronospora parasitica))
Toepassingsstadium	: preventief of bij het waarnemen van de eerste symptomen
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/ snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen	: rode amsoi (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 2 toepassingen/teelt - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(<i>Peronospora brassicae</i> (<i>Peronospora parasitica</i>))
Toepassingsstadium	: preventief of bij het waarnemen van de eerste symptomen
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht)
Opmerking	: Het gebruik in sierplanten werd toegelaten op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: <i>Viola</i> , <i>Chamaecyparis</i> , <i>Hedera</i> en <i>Azalea</i> . Niet-grondgebonden teelt.
Ter bestrijding van	: blad-en takphytophthora en valse meeldauw(<i>Phytophthora</i> spp. / <i>Peronospora</i> spp.)
Toepassingsstadium	: preventief of bij het waarnemen van de eerste symptomen
Dosis / Concentratie	: 0,06 l/100 l, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming)
Opmerking	: Het gebruik in sierplanten werd toegelaten op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: <i>Viola</i> , <i>Chamaecyparis</i> , <i>Hedera</i> en <i>Azalea</i> . Niet-grondgebonden teelt.
Ter bestrijding van	: blad-en takphytophthora en valse meeldauw(<i>Phytophthora</i> spp. / <i>Peronospora</i> spp.)
Toepassingsstadium	: preventief of bij het waarnemen van de eerste symptomen
Dosis / Concentratie	: 0,06 l/100 l, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht)
Toepassingsstadium	: vanaf volledige ontwikkeling van de planten (> BBCH 49)
Opmerking	: Het gebruik in sierplanten werd toegelaten op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: <i>Viola</i> , <i>Chamaecyparis</i> , <i>Hedera</i> en <i>Azalea</i> .
Ter bestrijding van	: blad-en takphytophthora en valse meeldauw(<i>Phytophthora</i> spp. / <i>Peronospora</i> spp.)
Toepassingsstadium	: preventief of bij het waarnemen van de eerste symptomen
Dosis / Concentratie	: 0,06 l/100 l, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek

Te behandelen	: tomaten (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: phytophthora(Phytophthora infestans)
Dosis / Concentratie	: 0,24 l/ha haag, 1-4 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: aubergine/eierplant en pepino (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: phytophthora(Phytophthora infestans)
Dosis / Concentratie	: 0,24 l/ha haag, 1-4 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: spinazie (open lucht)
Opmerking	: max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: valse meeldauw (wolf)(Peronospora farinosa f.sp. spinaciae)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: spinazie (onder bescherming)
Opmerking	: max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: valse meeldauw (wolf)(Peronospora farinosa f.sp. spinaciae)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: warmoes (snijbiet) (open lucht)
Opmerking	: max. 6 toepassingen/12 maanden
Ter bestrijding van	: valse meeldauw (wolf)(Peronospora farinosa f.sp. spinaciae)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: basilicum (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snede
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /

Te behandelen	: salie (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snedes
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: rozemarijn (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snedes
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: munt (consumptie bladeren en/of stengels)(onder bescherming)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1 toepassing/snedes
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: basilicum (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snedes
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: salie (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Opmerking	: - max. 6 toepassingen/12 maanden - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	: valse meeldauw(Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	: 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snedes
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen : **rozemarijn (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)**

Opmerking : - max. 6 toepassingen/12 maanden
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van : valse meeldauw(Peronospora spp.)

Dosis / Concentratie : 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snede

Veiligheidstermijn : 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen : **munt (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)**

Opmerking : - max. 6 toepassingen/12 maanden
- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van : valse meeldauw(Peronospora spp.)

Dosis / Concentratie : 0,6 l/ha, 1-2 toepassingen/snede

Veiligheidstermijn : 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen : Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Algemene opmerking :

/

Bijlage 2

CLP-etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 en
Verordening (EG) Nr. 547/2011

Signaalwoorden :

Gevarenpictogrammen en hun GHS-code :

GHS09



Gevarenaanduidingen (H-zinnen):

H411

Aanvullende informatie(EUH-zinnen) :

EUH210

EUH401

Standaardzinnen bijzondere risico's (R SH-zinnen) :

Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) :

P102
P501

P270

P273

P391