

Dossiernummer: 24446

Datum: 19/04/2022

TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL

Handelsbenaming:

MINECTO ONE

Toelatingsnummer:

11119P/B

Gebruikerscategorie: uitsluitend bestemd voor **PROFESSIONEEL** gebruik

Toelatingshouder:

Syngenta Crop Protection

Naamloze vennootschap

Louizalaan 489

1050 Brussel

BELGIË

Aard van het middel: **Insecticide**

Formuleringstype: **WG (Water dispergeerbaar granulaat)**

Gewaarborgde gehalten van de werkzame stoffen, synergisten en beschermstoffen:

- **cyantranilprole: 400 g/kg (werkzame stof)**

Deze toelating is geldig van **19/04/2022** tot en met **14/09/2027** en vervangt elke voorafgaande toelatingsakte voor dit product.

De bijzondere voorwaarden voor de verlenging zijn de volgende: **zie begeleidende brief bij de akte van 16/01/2021.**

Toegekende punten voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage in toepassing van het koninklijk besluit van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten: **2.**

Het product, voor zover het voldoet aan alle voorwaarden vastgesteld in deze toelatingsakte en haar bijlage, is toegelaten in toepassing van:

- de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21/10/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;
- het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:
De toelating is slechts geldig voor zover de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden aan de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

Dossierbeheerder: Dimitri Maerschalc
E-mail: dimitri.maerschalc@health.fgov.be
Tel: 02 524 72 70
Site: www.fytoweb.be

BIJLAGE

INDELING EN ETIKETTERING VAN HET PRODUCT

Onverminderd de bepalingen inzake indeling en/of etikettering van:

- de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006;
- de Verordening (EU) Nr. 547/2011 van de Commissie van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen;
- Het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik;

moeten de volgende vermeldingen op het etiket van het product vermeld worden:

Indeling en etikettering in overeenstemming met Verordening (EG) nr 1272/2008

Gevarenklassen en -categorieën:

- Niet van toepassing

Signaalwoord :

- WAARSCHUWING

GHS-codes en gevarenpictogrammen :

- GHS09: Milieugevaarlijk



Gevarenaanduidingen (H zinnen):

- H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (P zinnen):

- P280: Draag beschermende handschoenen.
- P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.

Aanvullende gevareninformatie (EUH zinnen) :

- EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Zinnen volgens Verordening (EG) nr. 1107/2009 of (EU) nr. 547/2011

Standaardzinnen voor veiligheidsadviezen (SP zinnen):

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De IRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 28.



- SPe2: Om in het water levende organismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden, is het gebruik wel toegestaan.
- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
- SPe3: Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten te beschermen dient u een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen (zie risicobeperkende maatregelen).
- SPe8: Gevaarlijk voor bijen en andere bestuivende insecten. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. Het product moet toegepast worden vroeg in de morgen of laat in de avond. Tijdens de bloei van het gewas mag dit product maximum 1 keer worden toegepast en dit slechts laat in de avond. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid.
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Andere voorwaarden/nationale zinnen

- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn (en) te verkorten.
- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.
- Effecten op de smaak van behandelde gewassen vallen niet uit te sluiten. Raadpleeg de toelatingshouder/vergunningshouder voor informatie in verband met effecten op de kwaliteit.

GEBRUIKEN

De toepassingen waarvoor het product is toegelaten en de specifieke voorwaarden waaronder het product gebruikt mag worden:

appelbomen (*Malus domestica*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: vruchtdiameter tot 10 mm; vruchtval na bloei - vruchten plukrijp (BBCH 71-87)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 99% driftreducerende techniek

Opmerking:

- Dit product niet meer toepassen na 31/07.

Ter bestrijding van: bladrollers (*Cacoecia*, *Spilonota*, *Argyroplote*, *Pandemis*, *Notocelia*)

Dosis: 0,1 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: fruitmotje (*Carpocapsa pomonella* (*Cydia pomonella*))

Dosis: 0,1 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

perenbomen (*Pyrus communis*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: vruchtdiameter tot 10 mm; vruchtval na bloei - vruchten plukrijp (BBCH 71-87)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 99% driftreducerende techniek

Opmerking:

- Dit product niet meer toepassen na 31/07.



Ter bestrijding van: bladrollers (*Cacoecia*, *Spilonota*, *Argyroplote*, *Pandemis*, *Notocelia*)

Dosis: 0,1 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: fruitmotje (*Carpocapsa pomonella* (*Cydia pomonella*))

Dosis: 0,1 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

pruimenbomen (*Prunus domestica* subsp. *domestica*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: ontwikkeling vruchtbeginsel; vruchtval na bloei - vruchten plukrijp (BBCH 71-87)

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 99% driftreducerende techniek

Opmerking:

- Dit product niet meer toepassen na 31/07.

Ter bestrijding van: pruimenmot (*Laspeyresia funebrana*)

Dosis: 0,1 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 10 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

wortelen (*Daucus carota*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: begin wortelontwikkeling (diameter > 0,50 cm) - wortel heeft variëteitspecifieke diameter bereikt (BBCH 41-49)

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek

Opmerking:

- Dit product niet meer toepassen na 31/07.



Ter bestrijding van: wortelvlieg (*Psila rosae*)

Dosis: 0,19 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

knoflook (*Allium sativum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek

Opmerking:

- Dit product niet meer toepassen na 31/07.

Ter bestrijding van: trips (*Thysanoptera*)

Dosis: 0,31 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

uien (droogge oogste) (*Allium cepa*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek

Opmerking:

- Dit product niet meer toepassen na 31/07.

Ter bestrijding van: trips (*Thysanoptera*)

Dosis: 0,31 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

sjalot (*Allium cepa* *Aggregatum* types)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek

Opmerking:

- Dit product niet meer toepassen na 31/07.

Ter bestrijding van: trips (*Thysanoptera*)

Dosis: 0,31 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

broccoli (*Brassica oleracea* var. *botrytis* subvar. *cymosa*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste zijscheut zichtbaar - kool heeft typische grootte en vorm bereikt en is gesloten (BBCH 21-49)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek

Opmerking:

- Dit product niet meer toepassen na 31/07.

Ter bestrijding van: bladvreterende rupsen (*Mamestra*, *Spodoptera*, *Autographa*, *Orthosia*, *Thaumetopoeidae*, *Pieris*...)

Dosis: 0,19 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: koolmotje (*Plutella maculipennis*, *Plutella xylostella*)

Dosis: 0,19 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting



Ter bestrijding van: koolvlieg (*Delia radicum*)

Dosis: 0,19 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

broccoli (*Brassica oleracea* var. *botrytis* subvar. *cymosa*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 2 bladeren ontvouwen (BBCH 12)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek

Opmerking:

- Dit product niet meer toepassen na 31/07.

Ter bestrijding van: bladvreterende rupsen (*Mamestra*, *Spodoptera*, *Autographa*, *Orthosia*, *Thaumetopoeidae*, *Pieris*...)

Dosis: 0,19 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: koolmotje (*Plutella maculipennis*, *Plutella xylostella*)

Dosis: 0,19 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: koolvlieg (*Delia radicum*)

Dosis: 0,19 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

bloemkool (witte en groene) (*Brassica oleracea* var. *botrytis* subvar. *cauliflora*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: ontwikkeling roosjes, grootte > 1 cm - kool heeft typische grootte en vorm bereikt en is gesloten (BBCH 41-49)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:



- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek

Opmerking:

- Dit product niet meer toepassen na 31/07.

Ter bestrijding van: bladvreterende rupsen (*Mamestra*, *Spodoptera*, *Autographa*, *Orthosia*, *Thaumetopoeidae*, *Pieris*...)

Dosis: 0,19 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: koolmotje (*Plutella maculipennis*, *Plutella xylostella*)

Dosis: 0,19 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: koolvlieg (*Delia radicum*)

Dosis: 0,19 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

bloemkool (witte en groene) (*Brassica oleracea* var. *botrytis* subvar. *cauliflora*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 2 bladeren ontvouwen (BBCH 12)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek

Opmerking:

- Dit product niet meer toepassen na 31/07.

Ter bestrijding van: bladvreterende rupsen (*Mamestra*, *Spodoptera*, *Autographa*, *Orthosia*, *Thaumetopoeidae*, *Pieris*...)

Dosis: 0,19 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: koolmotje (*Plutella maculipennis*, *Plutella xylostella*)

Dosis: 0,19 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: koolvlieg (*Delia radicum*)

Dosis: 0,19 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

spruitkool (*Brassica oleracea* var. *gemmifera*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: hoofdstengel heeft 10% van variëteitspecifieke lengte bereikt - spruitjes onder eindscheut nauw gesloten (BBCH 31-49)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek

Opmerking:

- Dit product niet meer toepassen na 31/07.

Ter bestrijding van: bladvreterende rupsen (*Mamestra*, *Spodoptera*, *Autographa*, *Orthosia*, *Thaumetopoeidae*, *Pieris*...)

Dosis: 0,19 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: koolmotje (*Plutella maculipennis*, *Plutella xylostella*)

Dosis: 0,19 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: koolvlieg (*Delia radicum*)

Dosis: 0,19 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

spruitkool (*Brassica oleracea* var. *gemmifera*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 2 bladeren ontvouwen (BBCH 12)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:



- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek

Opmerking:

- Dit product niet meer toepassen na 31/07.

Ter bestrijding van: bladvreterende rupsen (*Mamestra*, *Spodoptera*, *Autographa*, *Orthosia*, *Thaumetopoeidae*, *Pieris*...)

Dosis: 0,19 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: koolmotje (*Plutella maculipennis*, *Plutella xylostella*)

Dosis: 0,19 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: koolvlieg (*Delia radicum*)

Dosis: 0,19 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (*Brassica oleracea* var. *capitata*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: begin vorming van kool, 2 jongste bladeren ontvouwen niet meer - typische grootte, vorm en stevigheid van kool bereikt (BBCH 41-49)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek

Opmerking:

- Dit product niet meer toepassen na 31/07.

Ter bestrijding van: bladvreterende rupsen (*Mamestra*, *Spodoptera*, *Autographa*, *Orthosia*, *Thaumetopoeidae*, *Pieris*...)

Dosis: 0,19 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: koolmotje (*Plutella maculipennis*, *Plutella xylostella*)

Dosis: 0,19 kg/ha



Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: koolvlieg (*Delia radicum*)

Dosis: 0,19 kg/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (*Brassica oleracea var. capitata*)

Locatie van het gewas: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 2 bladeren ontvouwen (BBCH 12)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek

Opmerking:

- Dit product niet meer toepassen na 31/07.

Ter bestrijding van: bladvreterende rupsen (*Mamestra*, *Spodoptera*, *Autographa*, *Orthosia*, *Thaumetopoeidae*, *Pieris*...)

Dosis: 0,19 kg/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: koolmotje (*Plutella maculipennis*, *Plutella xylostella*)

Dosis: 0,19 kg/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: koolvlieg (*Delia radicum*)

Dosis: 0,19 kg/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

slasoorten (*Lactuca sp.*)

Locatie van het gewas: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater



Ter bestrijding van: bladvreterende rupsen (*Mamestra*, *Spodoptera*, *Autographa*, *Orthosia*, *Thaumetopoeidae*, *Pieris*...)

Dosis: 0,19 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

slasoorten (*Lactuca sp.*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek

Opmerking:

- Dit product niet meer toepassen na 31/07.

Ter bestrijding van: bladvreterende rupsen (*Mamestra*, *Spodoptera*, *Autographa*, *Orthosia*, *Thaumetopoeidae*, *Pieris*...)

Dosis: 0,19 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul) (*Phaseolus vulgaris*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste zij scheut zichtbaar - volledig rijp: peulen rijp (zaden hard) (BBCH 21-89)

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek

Opmerking:

- Dit product niet meer toepassen na 31/07.

Ter bestrijding van: bladvreterende rupsen (*Mamestra*, *Spodoptera*, *Autographa*, *Orthosia*, *Thaumetopoeidae*, *Pieris*...)

Dosis: 0,19 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)



Toepassingstechniek: bespuiting

groengeoogste erwten (zonder peul) (*Pisum sativum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste bloemen geopend (sporadisch in gewas) - peulen hebben finale lengte bereikt ("groen rijp"); erwten volledig gevormd (BBCH 60-79)

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek

Opmerking:

- Dit product niet meer toepassen na 31/07.

Ter bestrijding van: bladvreterende rupsen (*Mamestra*, *Spodoptera*, *Autographa*, *Orthosia*, *Thaumetopoeidae*, *Pieris*...)

Dosis: 0,19 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (groengeoogst, zonder peul) (*Vicia faba*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: geen zijscheuten - volledig rijp: bijna alle peulen rijp, zaden droog en hard (BBCH 20-89)

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek

Opmerking:

- Dit product niet meer toepassen na 31/07.

Ter bestrijding van: bladvreterende rupsen (*Mamestra*, *Spodoptera*, *Autographa*, *Orthosia*, *Thaumetopoeidae*, *Pieris*...)

Dosis: 0,19 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

VERPAKKINGEN

Dit product mag alleen op de markt worden gebracht in de volgende verpakkingen:

Type: bus		Materiaal: HDPE	
<u>Volume van de verpakking:</u>	0.75 l	<u>Inhoud van de verpakking:</u>	0.25 kg
<u>Volume van de verpakking:</u>	1.5 l	<u>Inhoud van de verpakking:</u>	0.5 kg
<u>Volume van de verpakking:</u>	3.5 l	<u>Inhoud van de verpakking:</u>	1 kg
<u>Volume van de verpakking:</u>	17.5 l	<u>Inhoud van de verpakking:</u>	5 kg
Type: kartonnen doos met inliner		Materiaal: papier/metaal/PE/PET meerlagig	
<u>Volume van de verpakking:</u>	1 l	<u>Inhoud van de verpakking:</u>	0.25 kg
<u>Volume van de verpakking:</u>	1.5 l	<u>Inhoud van de verpakking:</u>	0.5 kg
<u>Volume van de verpakking:</u>	2.5 l	<u>Inhoud van de verpakking:</u>	1 kg
<u>Volume van de verpakking:</u>	12 l	<u>Inhoud van de verpakking:</u>	5 kg

OMSCHRIJVING VAN DE TEELTEN

appelbomen (*Malus domestica*): alle variëteiten

perenbomen (*Pyrus communis*): alle variëteiten, inbegrepen Nashi (nashipeer)

pruimenbomen (*Prunus domestica subsp. domestica*): alle variëteiten

wortelen (*Daucus carota*): alle variëteiten

knoflook (*Allium sativum*): alle variëteiten

uien (drooggeoogste) (*Allium cepa*): alle variëteiten, zowel gezaaid als geplant, die rijp geoogst worden

sjalot (*Allium cepa Aggregatum types*): alle variëteiten

broccoli (*Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa*): alle variëteiten

bloemkool (witte en groene) (*Brassica oleracea var. botrytis subvar. cauliflora*): alle variëteiten

spruitkool (*Brassica oleracea var. gemmifera*): alle variëteiten

sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (*Brassica oleracea var. capitata*): alle variëteiten

slasoorten (*Lactuca sp.*): alle soorten en variëteiten

stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul) (*Phaseolus vulgaris*): alle variëteiten, inbegrepen de 'flageolets', onrijp geoogst

groengeoogste erwten (zonder peul) (*Pisum sativum*): alle variëteiten waarvan de zaden onrijp geoogst worden voor verwerking tot conserven, om in te vriezen of voor de verse markt

vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (groengeoogst, zonder peul) (*Vicia faba*): alle variëteiten waarvan de onrijpe zaden geoogst worden