

Dossiernummer: 27222

Datum: 17/08/2022

TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL

Betreft : corrigendum CLP-classificatie

Handelsbenaming :

CERATAVO PLUS

Toelatingsnummer :

10676P/B

Gebruikerscategorie : uitsluitend bestemd voor **PROFESSIONEEL** gebruik

Toelatingshouder :

Syngenta Crop Protection

Naamloze vennootschap

Louizalaan 489

1050 Brussel

Belgique

Aard van het middel : **Fungicide**

Formuleringstype : **EC (Emulgeerbaar concentraat)**

Referentieproduct : **10601P/B**

Gewaarborgd gehalte van de werkzame stof(fen), synergist(en) en beschermstof(fen) :

- **benzovindiflupyr: 100 g/l (werkzame stof)**

Deze toelating is geldig van **10/08/2022** tot en met **02/03/2024** en vervangt elke voorafgaande toelatingsakte voor dit product.

Toegekende punten voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage (in toepassing van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten) : **4,5**.

Het product, voor zover het voldoet aan alle voorwaarden vastgesteld in deze toelatingsakte en haar bijlage, is toegelaten in toepassing van:

- de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;
- het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma :
de toelating is slechts geldig voor zover de namen en adressen van elke invoerder van dit product voorafgaandelijk meegedeeld worden aan de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

BIJLAGE

INDELING EN ETIKETTERING VAN HET PRODUCT

Onverminderd de bepalingen inzake indeling en/of etikettering van :

- de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006;
- de Verordening (EU) nr. 547/2011 van de Commissie van 08 juni 2011 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen;
- het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik;

moeten de volgende vermeldingen op het etiket van het product vermeld worden:

Indeling en etikettering in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008

Signaalwoord :

- GEVAAR

GHS-codes en gevarenpictogrammen :

- GHS05 : Corrosief 
- GHS07 : Schadelijk 
- GHS09 : Milieugevaarlijk 

Gevarenaanduidingen (H zinnen) :

- H302 : Schadelijk bij inslikken.
- H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H332 : Schadelijk bij inademing.
- H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (P zinnen) :

- P261 : Inademing van damp en spuitnevel vermijden.
- P280 : Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming.
- P301 + P311 : NA INSLIKKEN: Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
- P301 + P330 : NA INSLIKKEN: De mond spoelen.
- P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende



- minstens 15 minuten.
- P304 + P311 : NA INADEMING: Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 - P305 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 - P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
 - P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 - P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.

Aanvullende gevareninformatie (EUH zinnen) :

- EUH066 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
- EUH401 : Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Zinnen volgens Verordening (EG) nr. 1107/2009 of (EU) nr. 547/2011

Standaardzinnen voor veiligheidsadviezen (SP zinnen) :

- SP1 : Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPa1 : Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 7.
- SPe2 : Om in het water levende organismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden, is het gebruik wel toegestaan.
- SPe3 : Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
- SPo : Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Andere voorwaarden/nationale zinnen

- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn (en) te verkorten.

- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

GEBRUIKEN

De toepassingen waarvoor het product is toegelaten en de specifieke voorwaarden waaronder het product gebruikt mag worden :

wintertarwe (*Triticum aestivum* (winter))

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kafjesbruin (*Septoria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

zomertarwe (*Triticum aestivum* (spring))

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt



Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kaffesbruin (*Septoria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

wintergerst (*Hordeum vulgare* (winter))

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde opzwellig: vlagbladschede van laatste blad maximaal gezwollen (BBCH 31-45)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: netvlekkenziekte/strepenziekte (*Pyrenophora*, *Helminthosporium*, *Drechslera*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/ramularia (*Ramularia collo-cygni*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: dwergroest (*Puccinia hordei*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

zomergerst (*Hordeum vulgare* (spring))

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde opzwellig: vlagbladschede van laatste blad maximaal gezwollen (BBCH 31-45)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: netvlekkenziekte/strepenziekte (*Pyrenophora*, *Helminthosporium*, *Drechslera*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/ramularia (*Ramularia collo-cygni*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: dwergroest (*Puccinia hordei*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting



winterrogge (*Secale cereale (winter)*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

zomerrogge (*Secale cereale (spring)*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

winterhaver (*Avena sativa* (winter))

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: kroonroest (*Puccinia coronata*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

zomerhaver (*Avena sativa* (spring))

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: kroonroest (*Puccinia coronata*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

wintertriticale (*Triticale x Secale* (winter))

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*)

Dosis: 0,75 l/ha



Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kaffesbruin (*Septoria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)

Dosis: 0,75 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

zomertriticale (*Triticale x Secale* (spring))

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*)

Dosis: 0,75 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha
Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kafjesbruin (*Septoria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

winterspelt (*Triticum spelta* (winter))

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kafjesbruin (*Septoria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting



Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

zomerspelt (*Triticum spelta* (spring))

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kaffesbruin (*Septoria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

winteremmer (*Triticum turgidum* subsp. *dicoccon*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)



Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kafjesbruin (*Septoria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

zomeremmer (*Triticum turgidum* subsp. *dicoccon*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoeingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kafjesbruin (*Septoria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)

Dosis: 0,75 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

wintereenkoorn (*Triticum monococcum subsp. monococcum*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kafjesbruin (*Septoria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)

Dosis: 0,75 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting



zomereenkoorn (*Triticum monococcum* subsp. *monococcum*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kaffesbruin (*Septoria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

winterhorasan (*Triticum turgidum* subsp. *turanicum*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kafjesbruin (*Septoria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

zomerkhorasan (*Triticum turgidum subsp. turanicum*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kafjesbruin (*Septoria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

winterdurum (*Triticum durum*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kaffesbruin (*Septoria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

zomerdurum (*Triticum durum*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kaffesbruin (*Septoria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

wintertarwe (zaadproductie) (*Triticum aestivum* (winter))

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: zaaizaadproductie

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kafjesbruin (*Septoria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

zomertarwe (zaadproductie) (*Triticum aestivum* (spring))

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: zaaizaadproductie

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kafjesbruin (*Septoria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting



Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

wintergerst (zaadproductie) (*Hordeum vulgare* (winter))

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: zaaizaadproductie

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde opzwellings- vlagbladschede van laatste blad maximaal gezwollen (BBCH 31-45)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: netvlekkenziekte/strepenziekte (*Pyrenophora*, *Helminthosporium*, *Drechslera*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/ramularia (*Ramularia collo-cygni*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: dwergroest (*Puccinia hordei*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting



zomergerst (zaadproductie) (*Hordeum vulgare* (spring))

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: zaaizaadproductie

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde opzwellings: vlagbladschede van laatste blad maximaal gezwollen (BBCH 31-45)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: netvlekkenziekte/strepenziekte (*Pyrenophora*, *Helminthosporium*, *Drechslera*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/ramularia (*Ramularia collo-cygni*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: dwergroest (*Puccinia hordei*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

winterhaver (zaadproductie) (*Avena sativa* (winter))

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: zaaizaadproductie

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: kroonroest (*Puccinia coronata*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

zomerhaver (zaadproductie) (*Avena sativa (spring)*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: zaaizaadproductie

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: kroonroest (*Puccinia coronata*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

winterrogge (zaadproductie) (*Secale cereale (winter)*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: zaaizaadproductie

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

zomerrogge (zaadproductie) (*Secale cereale* (spring))

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: zaaizaadproductie

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

winterspelt (zaadproductie) (*Triticum spelta* (winter))

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: zaaizaadproductie

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kafjesbruin (*Septoria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

zomerspelt (zaadproductie) (*Triticum spelta* (spring))

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: zaaizaadproductie

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kaffesbruin (*Septoria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting



wintertriticale (zaadproductie) (*Triticale x Secale (winter)*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: zaaizaadproductie

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kaffesbruin (*Septoria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

zomertriticale (zaadproductie) (*Triticale x Secale (spring)*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: zaaizaadproductie

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)



Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kafjesbruin (*Septoria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

winteremmer (zaadproductie) (*Triticum turgidum subsp. dicoccon* (winter))

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kafjesbruin (*Septoria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)

Dosis: 0,75 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

zomeremmer (zaadproductie) (*Triticum turgidum subsp. dicoccon (spring)*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kafjesbruin (*Septoria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting



Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

wintereenkoorn (zaadproductie) (*Triticum monococcum subsp. monococcum (winter)*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kaffesbruin (*Septoria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

zomereenkoorn (zaadproductie) (*Triticum monococcum subsp. monococcum (spring)*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)



Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kafjesbruin (*Septoria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

winterkhorasan (zaadproductie) (*Triticum turgidum subsp. turanicum (winter)*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoeingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kafjesbruin (*Septoria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha



Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)

Dosis: 0,75 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

zomerkhorasan (zaadproductie) (*Triticum turgidum subsp. turanicum (spring)*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kafjesbruin (*Septoria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)

Dosis: 0,75 l/ha
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting



winterdurum (zaadproductie) (*Triticum durum* (winter))

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kaffesbruin (*Septoria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

zomerdurum (zaadproductie) (*Triticum durum* (spring))

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak - einde aarvorming: bloeiwijze volledig uit schede tevoorschijn (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kafjesbruin (*Septoria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bruine roest (*Puccinia recondita*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: gele roest (*Puccinia striiformis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

graszaadteelt (*grass culture (seeds production)*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: zaaizaadproductie

Toepassingsstadium: 1 knoop zichtbaar - bloeiwijze volledig tevoorschijn (einde aarvorming) (BBCH 31-59)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Opmerking(en):

De bijproducten mogen niet voor de diervoeding gebruikt worden

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kroonroest (*Puccinia coronata*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwarte roest (*Puccinia graminis*)

Dosis: 0,75 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

VERPAKKINGEN

Dit product mag alleen op de markt worden gebracht in de volgende verpakkingen :

Type : fles		Materiaal : HDPE/PA	
<u>Volume :</u>	1 l	<u>Inhoud :</u>	1 l
Type : fles		Materiaal : PET	
<u>Volume :</u>	1 l	<u>Inhoud :</u>	1 l
Type : bus		Materiaal : f-HDPE	
<u>Volume :</u>	10 l	<u>Inhoud :</u>	10 l
<u>Volume :</u>	20 l	<u>Inhoud :</u>	20 l
<u>Volume :</u>	5 l	<u>Inhoud :</u>	5 l

OMSCHRIJVING VAN DE TEELTEN

wintertarwe (*Triticum aestivum* (winter)) : alle variëteiten
zomertarwe (*Triticum aestivum* (spring)) : alle variëteiten
wintergerst (*Hordeum vulgare* (winter)) : alle variëteiten
zomergerst (*Hordeum vulgare* (spring)) : alle variëteiten
winterrogge (*Secale cereale* (winter)) : alle variëteiten
zomerrogge (*Secale cereale* (spring)) : alle variëteiten
winterhaver (*Avena sativa* (winter)) : alle variëteiten
zomerhaver (*Avena sativa* (spring)) : alle variëteiten
wintertriticale (*Triticale* $\times$ *Secale* (winter)) : alle variëteiten
zomertriticale (*Triticale* $\times$ *Secale* (spring)) : alle variëteiten
winterspelt (*Triticum spelta* (winter)) : alle variëteiten
zomerspelt (*Triticum spelta* (spring)) : alle variëteiten
winteremmer (*Triticum turgidum* subsp. *dicoccon*) : alle variëteiten
zomeremmer (*Triticum turgidum* subsp. *dicoccon*) : alle variëteiten
wintereenkoorn (*Triticum monococcum* subsp. *monococcum*) : alle variëteiten
zomereenkoorn (*Triticum monococcum* subsp. *monococcum*) : alle variëteiten
winterkhorasan (*Triticum turgidum* subsp. *turanicum*) : alle variëteiten
zomerkhorasan (*Triticum turgidum* subsp. *turanicum*) : alle variëteiten
winterdurum (*Triticum durum*) : alle variëteiten
zomerdurum (*Triticum durum*) : alle variëteiten
wintertarwe (zaadproductie) (*Triticum aestivum* (winter)) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten
zomertarwe (zaadproductie) (*Triticum aestivum* (spring)) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten
wintergerst (zaadproductie) (*Hordeum vulgare* (winter)) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten
zomergerst (zaadproductie) (*Hordeum vulgare* (spring)) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten
winterhaver (zaadproductie) (*Avena sativa* (winter)) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle

variëteiten

zomerhaver (zaadproductie) (*Avena sativa (spring)*) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten

winterrogge (zaadproductie) (*Secale cereale (winter)*) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten

zomerrogge (zaadproductie) (*Secale cereale (spring)*) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten

winterspelt (zaadproductie) (*Triticum spelta (winter)*) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten

zomerspelt (zaadproductie) (*Triticum spelta (spring)*) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten

wintertriticale (zaadproductie) (*Triticale x Secale (winter)*) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten

zomertriticale (zaadproductie) (*Triticale x Secale (spring)*) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten

winteremmer (zaadproductie) (*Triticum turgidum subsp. dicoccon (winter)*) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten

zomeremmer (zaadproductie) (*Triticum turgidum subsp. dicoccon (spring)*) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten

wintereenkoorn (zaadproductie) (*Triticum monococcum subsp. monococcum (winter)*) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten

zomereenkoorn (zaadproductie) (*Triticum monococcum subsp. monococcum (spring)*) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten

winterkhorasan (zaadproductie) (*Triticum turgidum subsp. turanicum (winter)*) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten

zomerkhorasan (zaadproductie) (*Triticum turgidum subsp. turanicum (spring)*) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten

winterdurum (zaadproductie) (*Triticum durum (winter)*) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten

zomerdurum (zaadproductie) (*Triticum durum (spring)*) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten

graszaadteelt (*grass culture (seeds production)*) : teelt bestemd voor de oogst van zaaizaden, alle variëteiten