

Dossiernummer: 22579

Datum: 22/10/2021

TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL

Betreft: Migratie

Handelsbenaming:

CELEST

Toelatingsnummer:

9269P/B

Gebruikerscategorie: uitsluitend bestemd voor **PROFESSIONEEL** gebruik

Toelatingshouder:

Syngenta Crop Protection

Naamloze vennootschap

Louizalaan 489

1050 Brussel

BELGIË

Aard van het middel: **Fungicide**

Formuleringstype: **FS (Suspensieconcentraat voor zaadbehandeling)**

Gewaarborgde gehalten van de werkzame stoffen, synergisten en beschermstoffen:

- **fludioxonil: 25 g/l (werkzame stof)**

Deze toelating is geldig van **22/10/2021** tot en met **31/10/2022** en vervangt elke voorafgaande toelatingsakte voor dit product.

Toegekende punten voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage in toepassing van het koninklijk besluit van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten: **2**.

Het product, voor zover het voldoet aan alle voorwaarden vastgesteld in deze toelatingsakte en haar bijlage, is toegelaten in toepassing van:

- de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21/10/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;
- het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:
De toelating is slechts geldig voor zover de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden aan de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

Dossierbeheerder: Cindy De Kinder
E-mail: cindy.dekinder@health.fgov.be
Tel: 02 524 72 45
Fax: /
Site: www.fytoweb.be

BIJLAGE

INDELING EN ETIKETTERING VAN HET PRODUCT

Onverminderd de bepalingen inzake indeling en/of etikettering van:

- de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006;
- de Verordening (EU) Nr. 547/2011 van de Commissie van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen;
- Het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik;

moeten de volgende vermeldingen op het etiket van het product vermeld worden:

Indeling en etikettering in overeenstemming met Verordening (EG) nr 1272/2008

Gevarenklassen en -categorieën:

- Niet van toepassing

Signaalwoord :

- Niet van toepassing

GHS-codes en gevarenpictogrammen :

- GHS09: Milieugevaarlijk



Gevarenaanduidingen (H zinnen):

- H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (P zinnen):

- P280: Beschermende handschoenen dragen.
- P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.

Aanvullende gevareninformatie (EUH zinnen) :

- EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
- EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Zinnen volgens Verordening (EG) nr. 1107/2009 of (EU) nr. 547/2011

Standaardzinnen voor veiligheidsadviezen (SP zinnen):

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met



producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 12.

- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag behandeld zaaizaad niet gezaaid worden op minder dan 1 meter afstand van oppervlaktewater.
- SPe5: Om vogels en wilde zoogdieren te beschermen moet behandeld zaaizaad volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat behandeld zaaizaad ook aan het einde van de rij is ondergewerkt.
- SPe6: Om vogels en wilde zoogdieren te beschermen moet u gemorst zaaizaad verwijderen.

Andere voorwaarden/nationale zinnen

- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

GEBRUIKEN

De toepassingen waarvoor het product is toegelaten en de specifieke voorwaarden waaronder het product gebruikt mag worden:

zaaizaden van stamslabonen (prinsesse-, snijbonen) (*Phaseolus vulgaris*)

Locatie van het gewas: behandelingslokaal

Gewastype: zaadbehandeling

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Ascochyta fabae*, *Didymella fabae*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: fusarium (*Fusarium spp.*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

zaaizaden van erwten (*Pisum sativum*)

Locatie van het gewas: behandelingslokaal

Gewastype: zaadbehandeling

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Septoria pisi*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: fusarium (*Fusarium spp.*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

zaaizaden van viciabonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (*Vicia faba*)

Locatie van het gewas: behandelingslokaal

Gewastype: zaadbehandeling

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte (*Ascochyta fabae*, *Didymella fabae*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: fusarium (*Fusarium spp.*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

zaaizaden van kekererwten (*Cicer arietinum*)

Locatie van het gewas: behandelingslokaal

Gewastype: zaadbehandeling

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: fusarium (*Fusarium spp.*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

zaaizaden van wintertarwe (*Triticum aestivum* (winter))

Locatie van het gewas: behandelingslokaal

Gewastype: zaadbehandeling

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: fusarium (*Fusarium spp.*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: steenbrand (*Tilletia caries*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

zaaizaden van zomertarwe (*Triticum aestivum* (spring))

Locatie van het gewas: behandelingslokaal

Gewastype: zaadbehandeling

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: fusarium (*Fusarium spp.*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: steenbrand (*Tilletia caries*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

zaaizaden van wintergerst (*Hordeum vulgare* (winter))

Locatie van het gewas: behandelingslokaal

Gewastype: zaadbehandeling

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: netvlekkenziekte/strepenziekte (*Pyrenophora*, *Helminthosporium*, *Drechslera*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: fusarium (*Fusarium spp.*)

Dosis: 200 ml/100 kg
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

zaaizaden van zomergerst (*Hordeum vulgare (spring)*)

Locatie van het gewas: behandelingslokaal
Gewastype: zaadbehandeling

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: netvlekkenziekte/strepenziekte (*Pyrenophora, Helminthosporium, Drechslera*)

Dosis: 200 ml/100 kg
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: fusarium (*Fusarium spp.*)

Dosis: 200 ml/100 kg
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

zaaizaden van winterrogge (*Secale cereale*)

Locatie van het gewas: behandelingslokaal
Gewastype: zaadbehandeling

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: fusarium (*Fusarium spp.*)

Dosis: 200 ml/100 kg
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

zaaizaden van zomerrogge (*Secale cereale*)

Locatie van het gewas: behandelingslokaal
Gewastype: zaadbehandeling

Risicobeperkende maatregelen:



- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: fusarium (*Fusarium spp.*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

zaaizaden van winterhaver (*Avena sativa*)

Locatie van het gewas: behandelingslokaal

Gewastype: zaadbehandeling

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: fusarium (*Fusarium spp.*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

zaaizaden van zomerhaver (*Avena sativa*)

Locatie van het gewas: behandelingslokaal

Gewastype: zaadbehandeling

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: fusarium (*Fusarium spp.*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

zaaizaden van wintertriticale (*Triticum x Secale*)

Locatie van het gewas: behandelingslokaal

Gewastype: zaadbehandeling

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: fusarium (*Fusarium spp.*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: steenbrand (*Tilletia caries*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

zaaizaden van zomertriticale (*Triticum x Secale*)

Locatie van het gewas: behandelingslokaal

Gewastype: zaadbehandeling

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: fusarium (*Fusarium spp.*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: steenbrand (*Tilletia caries*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

zaaizaden van winterspelt (*Triticum spelta* (winter))

Locatie van het gewas: behandelingslokaal

Gewastype: zaadbehandeling

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: fusarium (*Fusarium spp.*)

Dosis: 200 ml/100 kg
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: steenbrand (*Tilletia caries*)

Dosis: 200 ml/100 kg
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

zaaizaden van zomerspelt (*Triticum spelta* (spring))

Locatie van het gewas: behandelingslokaal
Gewastype: zaadbehandeling

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 200 ml/100 kg
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: fusarium (*Fusarium spp.*)

Dosis: 200 ml/100 kg
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: steenbrand (*Tilletia caries*)

Dosis: 200 ml/100 kg
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

zaaizaden van winterremmer (*Triticum turgidum subsp. dicoccon*)

Locatie van het gewas: behandelingslokaal
Gewastype: zaadbehandeling

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: fusarium (*Fusarium spp.*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: steenbrand (*Tilletia caries*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

zaaizaden van zomeremmer (*Triticum turgidum subsp. dicoccon*)

Locatie van het gewas: behandelingslokaal

Gewastype: zaadbehandeling

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: fusarium (*Fusarium spp.*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: steenbrand (*Tilletia caries*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

zaaizaden van winterenekoorn (*Triticum monococcum subsp. monococcum*)

Locatie van het gewas: behandelingslokaal

Gewastype: zaadbehandeling

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: fusarium (*Fusarium spp.*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: steenbrand (*Tilletia caries*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

zaaizaden van zomereenekoorn (*Triticum monococcum subsp. monococcum*)

Locatie van het gewas: behandelingslokaal

Gewastype: zaadbehandeling

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: fusarium (*Fusarium spp.*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: steenbrand (*Tilletia caries*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

zaaizaden van winterkhorasan (*Triticum turgidum subsp. turanicum*)

Locatie van het gewas: behandelingslokaal

Gewastype: zaadbehandeling

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: fusarium (*Fusarium spp.*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: steenbrand (*Tilletia caries*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

zaaizaden van zomerkhorasan (*Triticum turgidum subsp. turanicum*)

Locatie van het gewas: behandelingslokaal

Gewastype: zaadbehandeling

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: fusarium (*Fusarium spp.*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: steenbrand (*Tilletia caries*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

zaaizaden van winterdurum (*Triticum durum*)

Locatie van het gewas: behandelingslokaal

Gewastype: zaadbehandeling

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: fusarium (*Fusarium spp.*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: steenbrand (*Tilletia caries*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

zaaizaden van zomerdurum (*Triticum durum*)

Locatie van het gewas: behandelingslokaal

Gewastype: zaadbehandeling

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici*, *Leptosphaeria nodorum*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: fusarium (*Fusarium spp.*)

Dosis: 200 ml/100 kg



Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: steenbrand (*Tilletia caries*)

Dosis: 200 ml/100 kg
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

zaaizaden van vlas (*Linum usitatissimum*)

Locatie van het gewas: behandelingslokaal
Gewastype: zaadbehandeling

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: phoma (*Phoma linicola*)

Dosis: 200 ml/100 kg
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria*)

Dosis: 200 ml/100 kg
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 200 ml/100 kg
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

Ter bestrijding van: fusarium (*Fusarium spp.*)

Dosis: 200 ml/100 kg
Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

zaaizaden van lupine (*Lupinus sp.*)

Locatie van het gewas: behandelingslokaal
Gewastype: zaadbehandeling

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater



Ter bestrijding van: fusarium (*Fusarium spp.*)

Dosis: 200 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

zaaizaden van zonnebloem (*Helianthus annuus*)

Locatie van het gewas: behandelingslokaal

Gewastype: zaadbehandeling

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 600 ml/100 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Zaaizaadbehandeling

VERPAKKINGEN

Dit product mag alleen op de markt worden gebracht in de volgende verpakkingen:

Type: fles	Materiaal: HDPE
-------------------	------------------------

<u>Volume van de verpakking:</u> 1 l	<u>Inhoud van de verpakking:</u> 1 l
--------------------------------------	--------------------------------------

Type: jerrycan	Materiaal: HDPE
-----------------------	------------------------

<u>Volume van de verpakking:</u> 5 l	<u>Inhoud van de verpakking:</u> 5 l
--------------------------------------	--------------------------------------

<u>Volume van de verpakking:</u> 10 l	<u>Inhoud van de verpakking:</u> 10 l
---------------------------------------	---------------------------------------

<u>Volume van de verpakking:</u> 12 l	<u>Inhoud van de verpakking:</u> 12 l
---------------------------------------	---------------------------------------

<u>Volume van de verpakking:</u> 20 l	<u>Inhoud van de verpakking:</u> 20 l
---------------------------------------	---------------------------------------

Type: bus	Materiaal: HDPE
------------------	------------------------

<u>Volume van de verpakking:</u> 60 l	<u>Inhoud van de verpakking:</u> 60 l
---------------------------------------	---------------------------------------

Type: vat	Materiaal: HDPE
------------------	------------------------

<u>Volume van de verpakking:</u> 50 l	<u>Inhoud van de verpakking:</u> 50 l
---------------------------------------	---------------------------------------

<u>Volume van de verpakking:</u> 200 l	<u>Inhoud van de verpakking:</u> 200 l
--	--

Type: IBC-tank	Materiaal: HDPE/staal
-----------------------	------------------------------

<u>Volume van de verpakking:</u> 1000 l	<u>Inhoud van de verpakking:</u> 1000 l
---	---

OMSCHRIJVING VAN DE TEELTEN

zaaizaden van stamslabonen (princesse-, snijbonen) (*Phaseolus vulgaris*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van erwten (*Pisum sativum*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van viciabonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (*Vicia faba*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van kekererwten (*Cicer arietinum*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van wintertarwe (*Triticum aestivum (winter)*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van zomertarwe (*Triticum aestivum (spring)*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van wintergerst (*Hordeum vulgare (winter)*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van zomergerst (*Hordeum vulgare (spring)*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van winterrogge (*Secale cereale*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van zomerrogge (*Secale cereale*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van winterhaver (*Avena sativa*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van zomerhaver (*Avena sativa*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van wintertriticale (*Triticum x Secale*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van zomertriticale (*Triticum x Secale*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van winterspelt (*Triticum spelta (winter)*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van zomerspelt (*Triticum spelta (spring)*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van winteremmer (*Triticum turgidum subsp. dicoccon*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de

behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van zomeremmer (*Triticum turgidum subsp. dicoccon*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van winterenkoorn (*Triticum monococcum subsp. monococcum*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van zomereenkoorn (*Triticum monococcum subsp. monococcum*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van winterkhorasan (*Triticum turgidum subsp. turanicum*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van zomerkhorasan (*Triticum turgidum subsp. turanicum*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van winterdurum (*Triticum durum*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van zomerdurum (*Triticum durum*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van vlas (*Linum usitatissimum*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van lupine (*Lupinus sp.*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.

zaaizaden van zonnebloem (*Helianthus annuus*): Voor de behandeling van zaden, gebruik van de behandelde zaden voor humane of dierlijke consumptie is uitgesloten.