

Dossiernummer: 26284

Datum: 07/06/2022

TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL

Betreft : administratieve verlenging

Handelsbenaming :

DUAL GOLD

Toelatingsnummer :

9244P/B

Gebruikerscategorie : uitsluitend bestemd voor **PROFESSIONEEL** gebruik

Toelatingshouder :

Syngenta Crop Protection

Naamloze vennootschap

Louizalaan 489

1050 Brussel

Belgique

Aard van het middel : **Herbicide**

Formuleringstype : **EC (Emulgeerbaar concentraat)**

Gewaarborgd gehalte van de werkzame stof(fen), synergist(en) en beschermstof(fen) :

- **S-metolachloor: 960 g/l (werkzame stof)**

Deze toelating is geldig van **07/06/2022** tot en met **31/07/2024** en vervangt elke voorafgaande toelatingsakte voor dit product.

Toegekende punten voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage (in toepassing van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten) : **3**.

Het product, voor zover het voldoet aan alle voorwaarden vastgesteld in deze toelatingsakte en haar bijlage,

is toegelaten in toepassing van:

- de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;
- het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma :
de toelating is slechts geldig voor zover de namen en adressen van elke invoerder van dit product voorafgaandelijk meegedeeld worden aan de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

BIJLAGE

INDELING EN ETIKETTERING VAN HET PRODUCT

Onverminderd de bepalingen inzake indeling en/of etikettering van :

- de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006;
- de Verordening (EU) nr. 547/2011 van de Commissie van 08 juni 2011 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen;
- het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik;

moeten de volgende vermeldingen op het etiket van het product vermeld worden:

Indeling en etikettering in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008

Signaalwoord :

- WAARSCHUWING

GHS-codes en gevarenpictogrammen :

- GHS07 : Schadelijk 
- GHS09 : Milieugevaarlijk 

Gevarenaanduidingen (H zinnen) :

- H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (P zinnen) :

- P261 : Inademing van damp en spuitnevel vermijden.
- P280 : Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming.
- P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.
- P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
- P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.



- P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.

Aanvullende gevareninformatie (EUH zinnen) :

- EUH401 : Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Zinnen volgens Verordening (EG) nr. 1107/2009 of (EU) nr. 547/2011

Standaardzinnen voor veiligheidsadviezen (SP zinnen) :

- SP1 : Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPa1 : Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 15.
- SPe2 : Om in het water levende organismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden, is het gebruik wel toegestaan.
- SPe3 : Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
- SPo : Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Andere voorwaarden/nationale zinnen

- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn (en) te verkorten.
- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.
- Gewasschade bij volg- of vervanggewassen is niet uit te sluiten. De volg- of vervanggewassen die geteeld kunnen worden, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder/vergunningshouder.

GEBRUIKEN

De toepassingen waarvoor het product is toegelaten en de specifieke voorwaarden waaronder het product gebruikt mag worden :

aardbeien (*Fragaria x ananassa*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: productieveld

Toepassingsstadium: 1-14 dagen na het planten

Wachttijd voor de oogst: 30 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)

Dosis: 0,7 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

aardbeien (*Fragaria x ananassa*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: selectie- en vermeerderingsveld

Toepassingsstadium: 1-14 dagen na het planten

Wachttijd voor de oogst: 30 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Opmerking(en):

rijbehandeling op de moederplanten

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)

Dosis: 0,7 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

koolrapen (*Brassica napus subsp. rapifera*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst



Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)

Toepassingsstadium: kiemende tot weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 00-14)

Dosis: 1,3 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)

Toepassingsstadium: kiemende tot weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 00-14)

Dosis: 1,3 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

raap (stoppelraap, meiraap) (*Brassica rapa subsp. rapa*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)

Toepassingsstadium: kiemende tot weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 00-14)

Dosis: 1,3 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)

Toepassingsstadium: kiemende tot weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 00-14)

Dosis: 1,3 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

broccoli (*Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 1-5 dagen na het planten

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt



Wachttijd voor de oogst: 73 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)

Toepassingsstadium: kiemende tot weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 00-14)

Dosis: 1,3 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)

Toepassingsstadium: kiemende tot weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 00-14)

Dosis: 1,3 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

bloemkool (witte en groene) (*Brassica oleracea* var. *botrytis* subvar. *cauliflora*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 1-5 dagen na het planten

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 73 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)

Toepassingsstadium: kiemende tot weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 00-14)

Dosis: 1,3 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)

Toepassingsstadium: kiemende tot weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 00-14)

Dosis: 1,3 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

spruitkool (*Brassica oleracea* var. *gemmifera*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 1-5 dagen na het planten



Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 86 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)

Toepassingsstadium: kiemende tot weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 00-14)

Dosis: 1,3 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)

Toepassingsstadium: kiemende tot weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 00-14)

Dosis: 1,3 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (*Brassica oleracea var. capitata*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 1-5 dagen na het planten

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 86 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)

Toepassingsstadium: kiemende tot weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 00-14)

Dosis: 1,3 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)

Toepassingsstadium: kiemende tot weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 00-14)

Dosis: 1,3 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna (*Brassica rapa chinensis* & *B. rapa pekinensis*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 1-5 dagen na het planten

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 69 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae* (*annual*))

Toepassingsstadium: kiemende tot weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 00-14)

Dosis: 1,3 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae* (*annual*))

Toepassingsstadium: kiemende tot weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 00-14)

Dosis: 1,3 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

boerenkool (krulkool, palmboerenkool) (*Brassica oleracea* var. *sabellica*; *Brassica oleracea* var. *palmifolia*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 1-5 dagen na het planten

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 69 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae* (*annual*))

Toepassingsstadium: kiemende tot weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 00-14)

Dosis: 1,3 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae* (*annual*))

Toepassingsstadium: kiemende tot weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 00-14)

Dosis: 1,3 l/ha

Aantal toepassingen: 1
Toepassingstechniek: bespuiting

witloofwortelteelt (*Cichorium intybus* var. *foliosum*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste blad ontvouwen -8 bladeren ontvouwen (BBCH 11-18)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Opmerking(en):

max. 1,3 l/ha/12 maanden

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae* (annual))

Dosis: 0,1 - 0,6 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 8 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kamille (echte) (*Matricaria chamomilla*)

Dosis: 0,1 - 0,6 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 8 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*)

Dosis: 0,1 - 0,6 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 8 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul) (*Phaseolus vulgaris*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae* (annual))

Dosis: 1 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting



vicia-bonen (paarden-, duiven, tuin,...) (drooggeogst) (*Vicia faba*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae* (annual))

Dosis: 0,8 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae* (annual))

Dosis: 0,8 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

vicia-bonen (paarden-, duiven, tuin,...) (drooggeogst) (*Vicia faba*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 2 bladeren ontvouwen - 4 bladeren ontvouwen (BBCH 12-14)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae* (annual))

Dosis: 0,5 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae* (annual))

Dosis: 0,5 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (groengeoogst, zonder peul) (*Vicia faba*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor opkomst

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)

Dosis: 0,8 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)

Dosis: 0,8 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (groengeoogst, zonder peul) (*Vicia faba*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 2 bladeren ontvouwen - 4 bladeren ontvouwen (BBCH 12-14)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)

Dosis: 0,5 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)

Dosis: 0,5 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

maïs (behalve suikermaïs) (*Zea mays*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor-zaai met inwerking of voor opkomst

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: hanenpoot (*Echinochloa crus-galli*)

Dosis: 1,5 l/ha, 1,6l/ha op humusrijke bodems

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: max. 1,5 l/ha/12 maanden (1,6 l/ha/12 maanden voor terreinen rijk aan humus)

maïs (behalve suikermaïs) (*Zea mays*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 3 bladeren ontvouwen - 4 bladeren ontvouwen (BBHC 13-14)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: hanenpoot (*Echinochloa crus-galli*)

Dosis: 0,9 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: max. 1,5 l/ha/12 maanden (1,6 l/ha/12 maanden voor terreinen rijk aan humus)

suikerbieten (*Beta vulgaris* subsp. *vulgaris* var. *altissima*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 6 bladeren ontvouwen - 8 bladeren ontvouwen (BBCH 16-18)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Opmerking(en):

max. 1,3 l/ha/12 maanden

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae* (*annual*))

Dosis: 1,3 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: hanenpoot (*Echinochloa crus-galli*)

Dosis: 1,3 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kamille (echte) (*Matricaria chamomilla*)

Dosis: 1,3 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*)

Dosis: 1,3 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

suikerbieten (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 4 bladeren ontvouwen - 6 bladeren ontvouwen (BBCH 14-16)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Opmerking(en):

max. 1,3 l/ha/12 maanden

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)

Dosis: 0,5 - 0,65 l/ha

Aantal toepassingen: 1

In menging met: fenmedifam en/of ethofumesaat

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: hanenpoot (*Echinochloa crus-galli*)

Dosis: 0,5 - 0,65 l/ha

Aantal toepassingen: 1

In menging met: fenmedifam en/of ethofumesaat

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kamille (echte) (*Matricaria chamomilla*)

Dosis: 0,5 - 0,65 l/ha

Aantal toepassingen: 1

In menging met: fenmedifam en/of ethofumesaat

Toepassingstechniek: bespuiting



Ter bestrijding van: zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*)

Dosis: 0,5 - 0,65 l/ha

Aantal toepassingen: 1

In menging met: fenmedifam en/of ethofumesaat

Toepassingstechniek: bespuiting

voederbieten (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 6 bladeren ontvouwen - 8 bladeren ontvouwen (BBCH 16-18)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Opmerking(en):

max. 1,3 l/ha/12 maanden

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)

Dosis: 1,3 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: hanenpoot (*Echinochloa crus-galli*)

Dosis: 1,3 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kamille (echte) (*Matricaria chamomilla*)

Dosis: 1,3 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*)

Dosis: 1,3 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

voederbieten (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 4 bladeren ontvouwen - 6 bladeren ontvouwen (BBCH 14-16)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Opmerking(en):

max. 1,3 l/ha/12 maanden

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)

Dosis: 0,5 - 0,65 l/ha

Aantal toepassingen: 1

In menging met: fenmedifam en/of ethofumesaat

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: hanenpoot (*Echinochloa crus-galli*)

Dosis: 0,5 - 0,65 l/ha

Aantal toepassingen: 1

In menging met: fenmedifam en/of ethofumesaat

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kamille (echte) (*Matricaria chamomilla*)

Dosis: 0,5 - 0,65 l/ha

Aantal toepassingen: 1

In menging met: fenmedifam en/of ethofumesaat

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*)

Dosis: 0,5 - 0,65 l/ha

Aantal toepassingen: 1

In menging met: fenmedifam en/of ethofumesaat

Toepassingstechniek: bespuiting

cichorei (*Cichorium intybus var. sativum*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste blad ontvouwen -8 bladeren ontvouwen (BBCH 11-18)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Opmerking(en):

max. 1,3 l/ha/12 maanden

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)

Dosis: 0,1 - 0,6 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 8 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kamille (echte) (*Matricaria chamomilla*)

Dosis: 0,1 - 0,6 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 8 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*)

Dosis: 0,1 - 0,6 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 8 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

knolbegonia (*Begonia spp.*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: kort na het planten

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Waarschuwing(en):

- Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort(en):
- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating/vergunning.

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)

Toepassingsstadium: kiemende tot weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 00-14)

Dosis: 0,5 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)

Toepassingsstadium: kiemende tot weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 00-14)

Dosis: 0,5 l/ha

Aantal toepassingen: 1

In menging met: 100 g/ha isoxaben, gevolgd door 350 g/ha bentazon wanneer de eerste onkruiden opkomen

Toepassingstechniek: bespuiting



sierplanten (eenjarige) (*summer flowering ornamental plants*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: na het planten

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Waarschuwing(en):

- Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort(en): Dendranthema
- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating/vergunning.

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)

Dosis: 1,5 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)

Dosis: 1,5 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

VERPAKKINGEN

Dit product mag alleen op de markt worden gebracht in de volgende verpakkingen :

Type : jerrycan		Materiaal : HDPE	
<u>Volume :</u>	10 l	<u>Inhoud :</u>	10 l
<u>Volume :</u>	20 l	<u>Inhoud :</u>	20 l
<u>Volume :</u>	5 l	<u>Inhoud :</u>	5 l
Type : vat		Materiaal : HDPE	
<u>Volume :</u>	120 l	<u>Inhoud :</u>	120 l
Type : IBC-tank		Materiaal : HDPE	
<u>Volume :</u>	1000 l	<u>Inhoud :</u>	1000 l
<u>Volume :</u>	640 l	<u>Inhoud :</u>	640 l
Type : fles		Materiaal : HDPE	
<u>Volume :</u>	1 l	<u>Inhoud :</u>	1 l

OMSCHRIJVING VAN DE TEELTEN

aardbeien (*Fragaria × ananassa*) : productieveld: aardbeien waarvan de oogst bestemd is voor consumptie, alle variëteiten; selectie- en vermeerderingsveld: gewas geteeld voor selectie of vermeerdering, alle variëteiten, de oogst mag niet gebruikt worden voor consumptie.

koolrapen (*Brassica napus subsp. rapifera*) : alle variëteiten

raap (stoppelraap, meiraap) (*Brassica rapa subsp. rapa*) : alle variëteiten

broccoli (*Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa*) : alle variëteiten

bloemkool (witte en groene) (*Brassica oleracea var. botrytis subvar. cauliflora*) : alle variëteiten

spruitkool (*Brassica oleracea var. gemmifera*) : alle variëteiten

sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (*Brassica oleracea var. capitata*) : alle variëteiten

Chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna (*Brassica rapa chinensis* & *B. rapa pekinensis*) : alle variëteiten

boerenkool (krulkool, palmboerenkool) (*Brassica oleracea var. sabellica*; *Brassica oleracea var. palmifolia*) : alle variëteiten

witloofwortelteelt (*Cichorium intybus var. foliosum*) : Voor de behandeling van het gewas op het veld; alle variëteiten voor de productie van witloof en roodlof.

stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul) (*Phaseolus vulgaris*) : alle variëteiten, inbegrepen de 'flageolets', onrijp geoogst

vicia-bonen (paarden-, duiven, tuin-,...) (drooggeoogst) (*Vicia faba*) : alle variëteiten, drooggeoogst, voornamelijk voor dierlijke consumptie

vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (groengeoogst, zonder peul) (*Vicia faba*) : alle variëteiten waarvan de onrijpe zaden geoogst worden

maïs (behalve suikermaïs) (*Zea mays*) : korrelmaïs en kuilmaïs, alle variëteiten

suikerbieten (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima*) : alle variëteiten

voederbieten (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa*) : alle variëteiten

cichorei (*Cichorium intybus var. sativum*) : alle variëteiten

knolbegonia (*Begonia spp.*) : alle soorten en variëteiten, niet bestemd voor consumptie

sierplanten (eenjarige) (*summer flowering ornamental plants*) : Alle soorten en variëteiten, niet bestemd voor consumptie, gekweekt in volle grond, pot of container (vb. Chrysanthemum, Petunia, Salvia, Tagetes, ...).