

Dossiernummer: 25376

Datum: 16/03/2022

TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL

Betreft: administratieve verlenging

Handelsbenaming:

SERENVA

Toelatingsnummer:

10530P/B

Gebruikerscategorie: uitsluitend bestemd voor **PROFESSIONEEL** gebruik

Toelatingshouder:

Syngenta Crop Protection

Naamloze vennootschap

Louizalaan 489

1050 Brussel

BELGIË

Aard van het middel: **Fungicide**

Formuleringstype: **WG (Water dispergeerbaar granulaat)**

Referentieproduct: **8893P/B**

Gewaarborgde gehalten van de werkzame stoffen, synergisten en beschermstoffen:

- **cyprodinil: 375 g/kg (werkzame stof)**
- **fludioxonil: 250 g/kg (werkzame stof)**

Deze toelating is geldig van **10/03/2022** tot en met **31/10/2023** en vervangt elke voorafgaande toelatingsakte voor dit product.

Toegekende punten voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage in toepassing van het koninklijk besluit van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor

de grondstoffen en de producten: **3.**

Het product, voor zover het voldoet aan alle voorwaarden vastgesteld in deze toelatingsakte en haar bijlage, is toegelaten in toepassing van:

- de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21/10/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;
- het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:
De toelating is slechts geldig voor zover de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden aan de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

Dossierbeheerder: Nathalie Pynket
E-mail: Nathalie.pynket@health.fgov.be
Tel: 02 524 72 54
Site: www.fytoweb.be

BIJLAGE

INDELING EN ETIKETTERING VAN HET PRODUCT

Onverminderd de bepalingen inzake indeling en/of etikettering van:

- de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006;
- de Verordening (EU) Nr. 547/2011 van de Commissie van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen;
- Het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik;

moeten de volgende vermeldingen op het etiket van het product vermeld worden:

Indeling en etikettering in overeenstemming met Verordening (EG) nr 1272/2008

Gevarenklassen en -categorieën:

- Niet van toepassing

Signaalwoord :

- WAARSCHUWING

GHS-codes en gevarenpictogrammen :

- GHS07: Schadelijk 
- GHS09: Milieugevaarlijk 

Gevarenaanduidingen (H zinnen):

- H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (P zinnen):

- P261: Inademing van stof en spuitnevel vermijden.
- P280: Draag beschermende handschoenen en beschermende kleding.
- P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.
- P333 + P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
- P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.

Aanvullende gevareninformatie (EUH zinnen) :

- EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.



Zinnen volgens Verordening (EG) nr. 1107/2009 of (EU) nr. 547/2011

Standaardzinnen voor veiligheidsadviezen (SP zinnen):

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 12 en 9.
- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Andere voorwaarden/nationale zinnen

- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn (en) te verkorten.
- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

GEBRUIKEN

De toepassingen waarvoor het product is toegelaten en de specifieke voorwaarden waaronder het product gebruikt mag worden:

appelbomen (*Malus domestica*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: vanaf 6 weken voor de oogst

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: gloeosporiumrot/vruchtrot (*Gloeosporium sp.*)

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 0,5 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zachtrot (*Penicillium expansum*)

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 0,5 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 0,5 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

perenbomen (*Pyrus communis*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: bloei loopt ten einde: meerderheid van kroonbladeren gevallen - vruchten klaar voor consumptie: vruchten hebben typische smaak en stevigheid (BBCH 67-89)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: zwartvruchtrot (*Stemphylium vesicarium*)

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 0,5 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

perenbomen (*Pyrus communis*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: vanaf 6 weken voor de oogst

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: gloeosporiumrot/vruchtrot (*Gloeosporium sp.*)

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 0,5 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zachtrot (*Penicillium expansum*)

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 0,5 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 0,5 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 7 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

kersen- en kriekenbomen (*Prunus avium* et *P. cerasus*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: kelkbladeren geopend, uiteinden van witte of roze kroonbladeren zichtbaar (bloemen nog gesloten) - volle bloei: minstens 50% van bloemen geopend, eerste kroonbladeren vallen (BBCH 57-65)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: tak- en bloesemsterfte (*Monilinia*) (*Monilinia fructigena*/M. *laxa*)

Dosis: 0,67 kg/ha haag

Andere uitdrukking: 0,067 kg/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

kersen- en kriekenbomen (*Prunus avium* et *P. cerasus*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: begin verkleuren vruchten - vruchten rijp voor consumptie: vruchten hebben typische smaak en stevigheid (BBCH 81-89)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: vruchtrot (*Monilinia*) (*Monilinia fructigena*/ M. *laxa*)

Dosis: 0,67 kg/ha haag

Andere uitdrukking: 0,067 kg/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

pruimenbomen (*Prunus domestica* subsp. *domestica*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek



Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,67 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

druivelaars (voor wijnproductie) (*Vitis vinifera*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: einde bloei - 'veraison': zacht worden van bessen (BBCH 69-85)

Wachttijd voor de oogst: 21 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,83 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

druivelaars (tafeldruiven) (*Vitis vinifera*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: einde bloei - 'veraison': zacht worden van bessen (BBCH 69-85)

Wachttijd voor de oogst: 21 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,83 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

aardbeien (*Fragaria x ananassa*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: productieveld

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 1 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater



Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: antracnose (*Colletotrichum acutatum*)

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

aardbeien (*Fragaria x ananassa*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: selectie- en vermeerderingsveld

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: antracnose (*Colletotrichum acutatum*)

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

aardbeien (*Fragaria x ananassa*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: productieveld

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: antracnose (*Colletotrichum acutatum*)

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

aardbeien (*Fragaria x ananassa*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: selectie- en vermeerderingsveld

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: antracnose (*Colletotrichum acutatum*)

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

braamstruiken (*Rubus fruticosus*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 80% van vruchten gevormd (BBCH 78)

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,5 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

braamstruiken (*Rubus fruticosus*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 80% van vruchten gevormd (BBCH 78)

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,5 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

frambozenstruiken (*Rubus idaeus*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 80% jonge, groene vruchten zichtbaar (BBCH 78)

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,5 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

frambozenstruiken (*Rubus idaeus*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 80% jonge, groene vruchten zichtbaar (BBCH 78)

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,5 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 3



Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

blauwe / rode bosbessen (*Vaccinium myrtillus*, *V. corymbosum* & *V. vitis-idaea*)

Locatie van het gewas: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/12 maanden

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,5 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bladvalziekte (*Drepanopeziza ribis*)

Dosis: 0,5 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

veenbessen (*Vaccinium macrocarpon*)

Locatie van het gewas: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/12 maanden

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,5 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bladvalziekte (*Drepanopeziza ribis*)

Dosis: 0,5 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)



Toepassingstechniek: bespuiting

aalbessen (witte, rode, zwarte) (*Ribes spp.*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/12 maanden

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,5 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bladvalziekte (*Drepanopeziza ribis*)

Dosis: 0,5 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

stekelbes (kruisbes) en kruisingen (*Ribes uva-crispa*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/12 maanden

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,5 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bladvalziekte (*Drepanopeziza ribis*)

Dosis: 0,5 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

kiwibes (*Actinidia arguta*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: stempels zwart en verdroogd, begin zwellen vruchtbeginsel - gevorderde rijping of vruchtkleuring (BBCH 69-85)

Wachttijd voor de oogst: 21 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,83 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

wortelen (*Daucus carota*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: sclerotienrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 0,8 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 12 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)

Dosis: 0,8 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 12 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

pastinaak (*Pastinaca sativa*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)



Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 0,8 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 12 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)

Toepassingsstadium: /

Dosis: 0,8 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 12 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

knolselder (*Apium graveolens* var. *rapaceum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 0,8 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

radijs (*Raphanus sativus* var. *radicula*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: $\geq$ BBCH 41 (begin wortel- of knolontwikkeling (diameter > 0,5 cm))

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2



Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)

Dosis: 0,6 kg/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

schorseneren (*Scorzonera hispanica*)

Locatie van het gewas: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: $\geq$ BBCH 41 (begin wortel- of knolontwikkeling (diameter $> 0,5$ cm))
Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 0,8 kg/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)

Dosis: 0,8 kg/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,8 kg/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

knoflook (*Allium sativum*)

Locatie van het gewas: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: $\geq$ BBCH 41 (begin verdikking of verlenging bladbasis)
Wachttijd voor de oogst: 21 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: sclerotienrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 21 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

uien (droogge oogste) (*Allium cepa*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: $\geq$ BBCH 41 (begin verdikking of verlenging bladbasis)

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: sclerotienrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

bosuien (lente-ui) (*Allium fistulosum*/ *A. cepa*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/12 maanden

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: sclerotienrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

sjalot (*Allium cepa* *Aggregatum* types)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: $\geq$ BBCH 41 (begin verdikking of verlenging bladbasis)

Wachttijd voor de oogst: 21 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 21 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

tomaten (*Solanum lycopersicum*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Opmerking:

De toepassing op jonge planten of bladeren kan schade veroorzaken, zeker onder zwakke lichtomstandigheden.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 0,457 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

paprika/Spaanse peper (*Capsicum annuum*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Opmerking:

De toepassing op jonge planten of bladeren kan schade veroorzaken, zeker onder zwakke



lichtomstandigheden.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 0,457 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

aubergine/ierplant en pepino (*Solanum melongena* - *Solanum muricatum*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Opmerking:

De toepassing op jonge planten of bladeren kan schade veroorzaken, zeker onder zwakke lichtomstandigheden.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 0,457 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

komkommer (*Cucumis sativus*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Opmerking:

De toepassing op jonge planten of bladeren kan schade veroorzaken, zeker onder zwakke lichtomstandigheden.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 0,457 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)



Toepassingstechniek: bespuiting

augurk (*Cucumis sativus*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Opmerking:

De toepassing op jonge planten of bladeren kan schade veroorzaken, zeker onder zwakke lichtomstandigheden.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 0,457 kg/ha

Andere uitdrukking: 0,457 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

courgette/patisson (*Cucurbita pepo*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Opmerking:

De toepassing op jonge planten of bladeren kan schade veroorzaken, zeker onder zwakke lichtomstandigheden.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Toepassingsstadium: preventief

Dosis: 0,457 kg/ha

Andere uitdrukking: 0,457 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

meloen (*Cucumis melo*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: sclerotienrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 1 kg/ha

Andere uitdrukking: 1 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 1 kg/ha

Andere uitdrukking: 1 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

pompoen (*Cucurbita maxima* & *C. moschata*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

pompoen (*Cucurbita maxima* & *C. moschata*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)



Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

tuinkers en andere kiemen en scheuten (*Lepidium sativum*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

veldsla (*Valerianella locusta*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

slasoorten (*Lactuca sp.*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 1-7 dagen na het planten

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Opmerking:

Het gebruik is enkel toegelaten in gesloten waterrecirculatiesystemen. Het door het product gecontamineerde water mag in geen enkel geval in contact komen met het oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

slasoorten (*Lactuca sp.*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 1-7 dagen na het planten

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Opmerking:

max. 3 toepassingen/ha/12 maanden

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

slasoorten (*Lactuca sp.*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 1-7 dagen na het planten

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Opmerking:

Max. 3 toepassingen/ha/12 maanden

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

andijvie, radicchio rosso, suikerbrood (*Cichorium endivia var latifolia et crispum*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 1-7 dagen na het planten

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Opmerking:

max. 3 toepassingen/ha/12 maanden

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

andijvie, radicchio rosso, suikerbrood (*Cichorium endivia* var *latifolia* et *crispum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 1-7 dagen na het planten

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Opmerking:

max. 3 toepassingen/ha/12 maanden

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

witloofwortels (bewaring, na-oogst) (*Cichorium intybus* var. *foliosum*)

Locatie van het gewas: behandelingslokaal

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Aanbevelingen voor goede landbouwpraktijk voor naoogst behandelingen zijn beschikbaar op www.fytoweb.be/nl/witloofwortels.

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 36 g/1000 kg

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: verneveling

Opmerking: Verneveling over transportband vooraleer in de bewaarcel te brengen.

witloofwortels (bewaring, na-oogst) (*Cichorium intybus* var. *foliosum*)

Locatie van het gewas: behandelingslokaal

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Aanbevelingen voor goede landbouwpraktijk voor naoogst behandelingen zijn beschikbaar op www.fytoweb.be/nl/witloofwortels.

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 90 g/100 l

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: dompelen (naoogstbehandeling of behandeling van plantmateriaal)

Opmerking: 1-2 minuten onderdompelen vooraleer in de bewaarcel te brengen.

witloof en roodloof (forcerie hydrocultuur) (*Cichorium intybus* var. *foliosum*)

Locatie van het gewas: behandelingslokaal

Gewastype: forcerie hydrocultuur

Toepassingsstadium: na het intafelen, over de wortelkragen

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 21 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 4,5 g/m²

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

witloof en roodloof (forcerie grondteelt) (*Cichorium intybus* var. *foliosum*)

Locatie van het gewas: behandelingslokaal

Gewastype: forcerie grondteelt

Toepassingsstadium: na het intafelen, over de wortelkragen

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 21 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 4,5 g/m²

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul) (*Phaseolus vulgaris*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste bloemen geopend (sporadisch in gewas) - einde bloei: eerste peulen zichtbaar (BBCH 60-69)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 1 kg/ha

Andere uitdrukking: 1 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis fabae*)

Dosis: 1 kg/ha

Andere uitdrukking: 1 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul) (*Phaseolus vulgaris*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste bloemen geopend (sporadisch in gewas) - einde bloei: eerste peulen zichtbaar (BBCH 60-69)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis fabae*)

Dosis: 1 kg/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Toepassingstechniek: bespuiting

drooggeogste erwten (zonder peul) (*Pisum sativum*)

Locatie van het gewas: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste bloemen geopend (sporadisch in gewas) - einde bloei (BBCH 60-69)
Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 1 kg/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: anthracnose (*Didymella pisi*, *Ascochyta pisi*)

Dosis: 1 kg/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 1 kg/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Toepassingstechniek: bespuiting

groengeogste erwten (zonder peul) (*Pisum sativum*)

Locatie van het gewas: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste bloemen geopend (sporadisch in gewas) - einde bloei (BBCH 60-69)
Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: anthracnose (*Didymella pisi*, *Ascochyta pisi*)

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

groengeoogste erwten (met peul) (*Pisum sativum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste bloemen geopend (sporadisch in gewas) - einde bloei (BBCH 60-69)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: anthracnose (*Didymella pisi*, *Ascochyta pisi*)

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

voedererwten (drooggeogst) (*Pisum sativum subsp. arvense*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste bloemen geopend (sporadisch in gewas) - einde bloei (BBCH 60-69)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: anthracnose (*Didymella pisi*, *Ascochyta pisi*)

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

vicia-bonen (paarden-, duiven, tuin,...) (drooggeogst) (*Vicia faba*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste bloemen geopend - einde bloei (BBCH 60-69)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: anthracnose (*Didymella pisi*, *Ascochyta pisi*)

Dosis: 1 kg/ha



Aantal toepassingen: 1 tot 2
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis fabae*)

Dosis: 1 kg/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Toepassingstechniek: bespuiting

vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (groengeoogst, zonder peul) (*Vicia faba*)

Locatie van het gewas: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste bloemen geopend - einde bloei (BBCH 60-69)
Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: sclerotienrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 1 kg/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: anthracnose (*Didymella pisi*, *Ascochyta pisi*)

Dosis: 1 kg/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis fabae*)

Dosis: 1 kg/ha
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Toepassingstechniek: bespuiting

asperge (*Asparagus officinalis*)

Locatie van het gewas: onder bescherming
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: na de oogst
Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

asperge (*Asparagus officinalis*)

Locatie van het gewas: open lucht
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: na de oogst

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

selderij (bleek-, groene en witte) (*Apium graveolens* var. *dulce*)

Locatie van het gewas: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 0,8 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

knolvenkel (*Foeniculum vulgare*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 1 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

bieslook (consumptie bladeren) (*Allium schoenoprasum*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

bieslook (consumptie bladeren) (*Allium schoenoprasum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

dille (consumptie bladeren) (*Anethum graveolens*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

dille (consumptie bladeren) (*Anethum graveolens*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):



- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

kervel (consumptie bladeren) (*Anthriscus cerefolium*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

kervel (consumptie bladeren) (*Anthriscus cerefolium*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting



snijzelder (consumptie bladeren) (*Apium graveolens* var. *secalinum*)

Locatie van het gewas: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

snijzelder (consumptie bladeren) (*Apium graveolens* var. *secalinum*)

Locatie van het gewas: open lucht
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

karwij (consumptie bladeren) (*Carum carvi*)

Locatie van het gewas: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):



- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

karwij (consumptie bladeren) (*Carum carvi*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

koriander (consumptie bladeren) (*Coriandrum sativum*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting



koriander (consumptie bladeren) (*Coriandrum sativum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

lavas, maggiplant (consumptie bladeren) (*Levisticum officinale*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

lavas, maggiplant (consumptie bladeren) (*Levisticum officinale*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):



- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

peterselie (consumptie bladeren) (*Petroselinum crispum*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

peterselie (consumptie bladeren) (*Petroselinum crispum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting



wortelpeterselie en wortelkervel (consumptie wortels) (*Petroselinum crispum* var. *tuberosum* & *Chaerophyllum bulbosum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 0,8 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 12 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)

Dosis: 0,8 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 12 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)

Dosis: 0,8 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 12 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

engelwortel (consumptie wortels) (*Angelica sylvestris*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: sclerotienrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 0,8 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 12 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)

Dosis: 0,8 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 12 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

lavas, maggiplant (consumptie wortels) (*Levisticum officinale*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: sclerotienrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 0,8 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 12 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)

Dosis: 0,8 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 12 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: zwartrot (rhizoctonia) (*Rhizoctonia solani*)

Dosis: 0,8 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 12 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting



dragon (consumptie bladeren) (*Artemisia dracunculus*)

Locatie van het gewas: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

dragon (consumptie bladeren) (*Artemisia dracunculus*)

Locatie van het gewas: open lucht
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

rode amsoi (consumptie bladeren) (*Brassica juncea*)

Locatie van het gewas: onder bescherming
Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):



- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Toepassingstechniek: bespuiting

rucola (*Eruca sativa*/*Diplotaxis spp.*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 21 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Toepassingstechniek: bespuiting

rucola (*Eruca sativa*/*Diplotaxis spp.*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 21 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Toepassingstechniek: bespuiting

citroenmelisse (consumptie bladeren) (*Melissa officinalis*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

citroenmelisse (consumptie bladeren) (*Melissa officinalis*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

munt (consumptie bladeren) (*Mentha sp.*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):



- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

mint (consumptie bladeren) (*Mentha sp.*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

basilicum (consumptie bladeren) (*Ocimum basilicum*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

basilicum (consumptie bladeren) (*Ocimum basilicum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

eetbare bloemen (*Edible flowers*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

eetbare bloemen (*Edible flowers*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):



- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

marjolein/oregano (consumptie bladeren) (*Origanum vulgare*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

marjolein/oregano (consumptie bladeren) (*Origanum vulgare*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

salie (consumptie bladeren) (*Salvia officinalis*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

salie (consumptie bladeren) (*Salvia officinalis*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

tijm (consumptie bladeren) (*Thymus sp.*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):



- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

tijm (consumptie bladeren) (*Thymus sp.*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

rozemarijn (consumptie bladeren) (*Rosmarinus officinalis*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

rozemarijn (consumptie bladeren) (*Rosmarinus officinalis*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

laurier (consumptie bladeren) (*Laurus nobilis*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

laurier (consumptie bladeren) (*Laurus nobilis*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):



- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,6 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Interval tussen twee toepassingen: 10 tot 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

valeriaan (consumptie wortels) (*Valeriana officinalis*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: sclerotienrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 0,8 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 12 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)

Dosis: 0,8 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 12 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

sierbomen en -heesters (*ornamental trees and shrubs*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort(en): Buxus, Ficus, roos, Viburnum en Thuja.

- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating/vergunning.

Ter bestrijding van: Calonectria (Cylindrocladium) (*Calonectria* spp.)

Dosis: 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

sierbomen en -heesters (*ornamental trees and shrubs*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste kroonbladeren zichtbaar, bloem nog gesloten - einde bloei: vruchtaanzet zichtbaar (BBCH 59-69)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort(en): Buxus, Ficus, roos, Viburnum en Thuja.
- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating/vergunning.

Ter bestrijding van: tak- en bloesemsterfte (*Monilinia*) (*Monilinia fructigena*/M. *laxa*)

Dosis: 0,067 kg/100 l

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

sierbomen en -heesters (*ornamental trees and shrubs*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Waarschuwing(en):

- Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort(en): Buxus, Ficus, roos, Viburnum en Thuja.
- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating/vergunning.

Ter bestrijding van: Calonectria (Cylindrocladium) (*Calonectria spp.*)

Dosis: 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

sierbomen en -heesters (*ornamental trees and shrubs*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste kroonbladeren zichtbaar, bloem nog gesloten - einde bloei: vruchtaanzet zichtbaar (BBCH 59-69)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Waarschuwing(en):

- Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort(en): Buxus, Ficus, roos, Viburnum en Thuja.
- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating/vergunning.

Ter bestrijding van: tak- en bloesemsterfte (*Monilinia*) (*Monilinia fructigena*/M. *laxa*)

Dosis: 0,067 kg/100 l

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting



sierplanten (niet houtachtig) (*ornamental herbaceous plants*)

Locatie van het gewas: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort(en): Kalanchoe, Knolbegonia, chrysant, Lonicera en Vinca.
- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating/vergunning.

Ter bestrijding van: Calonectria (Cylindrocladium) (*Calonectria spp.*)

Dosis: 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

sierplanten (niet houtachtig) (*ornamental herbaceous plants*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Waarschuwing(en):

- Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort(en): Kalanchoe, Knolbegonia, chrysant, Lonicera en Vinca.
- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating/vergunning.

Ter bestrijding van: Calonectria (Cylindrocladium) (*Calonectria spp.*)

Dosis: 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 100 g/100 l

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

UITBREIDING VAN DE TOELATING VOOR KLEINE TOEPASSINGEN (in toepassing van Artikel 51 van Verordening (EG) nr. 1107/2009).

Voor deze uitbreidingen valt het gebruik van het product onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Omdat er slechts beperkte werkzaamheid- en fytotoxiciteitsgegevens werden geëvalueerd, wordt er aangeraden een test uit te voeren voordat het product wordt gebruikt.

mierikswortel (*Armoracia rusticana*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: $\geq$ BBCH 41 (begin wortel- of knolontwikkeling (diameter $> 0,5$ cm))

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: sclerotiënrot (sclerotinia) (*Sclerotinia minor* (*S. sclerotiorum*))

Dosis: 0,8 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: alternaria (*Alternaria dauci*)

Dosis: 0,8 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Dosis: 0,8 kg/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

VERPAKKINGEN

Dit product mag alleen op de markt worden gebracht in de volgende verpakkingen:

Type: fles

Materiaal: PET

Volume van de verpakking: 1 l

Inhoud van de verpakking: 1 kg

Volume van de verpakking: 5 l

Inhoud van de verpakking: 5 kg

Type: bus

Materiaal: HDPE

Volume van de verpakking: 1 l

Inhoud van de verpakking: 1 kg

Volume van de verpakking: 5 l

Inhoud van de verpakking: 5 kg

OMSCHRIJVING VAN DE TEELTEN

appelbomen (*Malus domestica*): alle variëteiten

perenbomen (*Pyrus communis*): alle variëteiten, inbegrepen Nashi (nashipeer)

kersen- en krieckenbomen (*Prunus avium* et *P. cerasus*): alle variëteiten

pruimenbomen (*Prunus domestica subsp. domestica*): alle variëteiten

druivelaars (voor wijnproductie) (*Vitis vinifera*): wijnstokken waarvan de oogst bestemd is voor wijnproductie, alle variëteiten

druivelaars (tafeldruiven) (*Vitis vinifera*): wijnstokken waarvan de oogst bestemd is voor consumptie, alle variëteiten

aardbeien (*Fragaria × ananassa*): productieveld: aardbeien waarvan de oogst bestemd is voor consumptie, alle variëteiten; selectie- en vermeerderingsveld: gewas geteeld voor selectie of vermeerdering, alle variëteiten, de oogst mag niet gebruikt worden voor consumptie.

braamstruiken (*Rubus fruticosus*): alle variëteiten

frambozenstruiken (*Rubus idaeus*): alle variëteiten

blauwe / rode bosbessen (*Vaccinium myrtillus*, *V. corymbosum* & *V. vitis-idaea*): alle variëteiten

veenbessen (*Vaccinium macrocarpon*): alle variëteiten

aalbessen (witte, rode, zwarte) (*Ribes spp.*): alle variëteiten

stekelbes (kruisbes) en kruisingen (*Ribes uva-crispa*): alle variëteiten

kiwibes (*Actinidia arguta*): alle variëteiten

wortelen (*Daucus carota*): alle variëteiten

pastinaak (*Pastinaca sativa*): alle variëteiten

knolselder (*Apium graveolens var. rapaceum*): alle variëteiten

radijs (*Raphanus sativus var. radicula*): radijs met een overwegend rode of witte schil, weinig pikante smaak, alle variëteiten

schorseneren (*Scorzonera hispanica*): alle variëteiten

mierikswortel (*Armoracia rusticana*): alle variëteiten

knoflook (*Allium sativum*): alle variëteiten

uien (drooggeogste) (*Allium cepa*): alle variëteiten, zowel gezaaid als geplant, die rijp geogst worden

bosuien (lente-ui) (*Allium fistulosum* / *A. cepa*): jong geogste uien, alle variëteiten

sjalot (*Allium cepa Aggregatum types*): alle variëteiten

tomaten (*Solanum lycopersicum*): alle variëteiten, inbegrepen de kerstomaten

paprika/Spaanse peper (*Capsicum annuum*): alle variëteiten

aubergine/eierplant en pepino (*Solanum melongena* - *Solanum muricatum*): alle variëteiten

komkommer (*Cucumis sativus*): alle variëteiten

augurk (*Cucumis sativus*): alle variëteiten

courgette/patisson (*Cucurbita pepo*): alle variëteiten van courgette en patisson die geoogst worden wanneer de schil nog eetbaar is en die volledig gegeten worden

meloen (*Cucumis melo*): alle variëteiten, watermeloenen zijn niet inbegrepen

pompoen (*Cucurbita maxima* & *C. moschata*): alle variëteiten die geschild worden voor consumptie

tuinkers en andere kiemen en scheuten (*Lepidium sativum*): alle variëteiten van scheutgroenten

veldsla (*Valerianella locusta*): alle variëteiten

slasoorten (*Lactuca sp.*): alle soorten en variëteiten

andijvie, radicchio rosso, suikerbrood (*Cichorium endivia* var. *latifolia* et *crispum*): alle variëteiten

witloofwortels (bewaring, na-oogst) (*Cichorium intybus* var. *foliosum*): Voor de behandeling van wortels in bewaring; alle variëteiten voor de productie van witloof en rood witloof.

witloof en roodloof (forcerie hydrocultuur) (*Cichorium intybus* var. *foliosum*): Voor de behandeling van wortels in hydrocultuur forcerie; alle variëteiten voor de productie van witloof en roodlof.

witloof en roodloof (forcerie grondteelt) (*Cichorium intybus* var. *foliosum*): Voor de behandeling van wortels in grondteelt forcerie; alle variëteiten voor de productie van witloof en roodlof.

stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul) (*Phaseolus vulgaris*): alle variëteiten, inbegrepen de 'flageolets', onrijp geoogst

drooggeoogste erwten (zonder peul) (*Pisum sativum*): alle variëteiten waarvan de zaden drooggeoogst worden, zowel voor dierlijke als menselijke consumptie

groengeoogste erwten (zonder peul) (*Pisum sativum*): alle variëteiten waarvan de zaden onrijp geoogst worden voor verwerking tot conserven, om in te vriezen of voor de verse markt

groengeoogste erwten (met peul) (*Pisum sativum*): alle variëteiten waarvan de peulen onrijp geoogst worden voor verwerking tot conserven, om in te vriezen of voor de verse markt

voedererwten (drooggeoogst) (*Pisum sativum* subsp. *arvense*): alle variëteiten waarvan de peulen of zaden drooggeoogst worden

vicia-bonen (paarden-, duiven, tuin,...) (drooggeoogst) (*Vicia faba*): alle variëteiten, drooggeoogst, voornamelijk voor dierlijke consumptie

vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin,...) (groengeoogst, zonder peul) (*Vicia faba*): alle variëteiten waarvan de onrijpe zaden geoogst worden

asperge (*Asparagus officinalis*): alle variëteiten (productieveld: asperges op velden die in productie zijn, dus niet het 1ste of 2de jaarsgewas)

selderij (bleek-, groene en witte) (*Apium graveolens var. dulce*): alle variëteiten

knolvenkel (*Foeniculum vulgare*): alle variëteiten

bieslook (consumptie bladeren) (*Allium schoenoprasum*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

dille (consumptie bladeren) (*Anethum graveolens*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

kervel (consumptie bladeren) (*Anthriscus cerefolium*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

snijselder (consumptie bladeren) (*Apium graveolens var. secalinum*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

karwij (consumptie bladeren) (*Carum carvi*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

koriander (consumptie bladeren) (*Coriandrum sativum*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

lavas, maggiplant (consumptie bladeren) (*Levisticum officinale*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

peterselie (consumptie bladeren) (*Petroselinum crispum*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

wortelpeterselie en wortelkervel (consumptie wortels) (*Petroselinum crispum var. tuberosum* & *Chaerophyllum bulbosum*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

engelwortel (consumptie wortels) (*Angelica sylvestris*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

lavas, maggiplant (consumptie wortels) (*Levisticum officinale*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

dragon (consumptie bladeren) (*Artemisia dracunculus*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

rode amsoi (consumptie bladeren) (*Brassica juncea*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

rucola (*Eruca sativa/Diplotaxis spp.*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

citroenmelisse (consumptie bladeren) (*Melissa officinalis*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

munt (consumptie bladeren) (*Mentha sp.*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

basilicum (consumptie bladeren) (*Ocimum basilicum*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

eetbare bloemen (*Edible flowers*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

marjolein/oregano (consumptie bladeren) (*Origanum vulgare*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

salie (consumptie bladeren) (*Salvia officinalis*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

tijm (consumptie bladeren) (*Thymus sp.*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

rozemarijn (consumptie bladeren) (*Rosmarinus officinalis*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

laurier (consumptie bladeren) (*Laurus nobilis*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

valeriaan (consumptie wortels) (*Valeriana officinalis*): aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

sierbomen en -heesters (*ornamental trees and shrubs*): Alle soorten en variëteiten, niet bestemd voor consumptie. Middelen toegelaten in deze teelt mogen ook gebruikt worden voor de opkweek van fruitbomen en -heesters voor zover deze nog niet op hun definitieve plaats staan en de vruchten niet geoogst worden.

sierplanten (niet houtachtig) (*ornamental herbaceous plants*): alle soorten en variëteiten, niet bestemd voor consumptie