

2. Samenstelling en vorm2.1. Algemene bepalingen :

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening Nr. 1107/2009 moeten de samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de bij de aanvraag of later verstrekte gegevens.

2.2. Werkzame stof(fen) en gewaarborgde gehalte(n) :

DIQUAT

200 g/l

Algemene opmerking

/

2.3. Formuleringstype : SL (Met water mengbaar concentraat)3. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Zie bijlage

4. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen4.1. Gevarencategorie(ën) : giftig, schadelijk, irriterend,
sensibiliserend en milieugevaarlijk

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) Nr. 547/2011 van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen en het KB van 28/02/1994 tot regeling van de indeling en de verpakking moeten de volgende vermeldingen op het etiket vermeld worden.

4.2. De volgende symbolen van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG of van de bijlage XIV van het KB van 28/02/1994 en het KB van 11/01/1193 tot regeling van de indeling en de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op de markt brengen of het gebruik ervan :

T, N

4.3. De volgende R en S zinnen van de bijlage XIII van het KB van 28/02/1994 :

4.3.1. R22-R23-R37/38-R43-R48/25-R50/53

4.3.2. S2-S13-S20/21-S23-S36/37-S45-S35-S61

4.4. Aantal punten toegekend in toepassing van art. 2bis §1 van het KB van 14/01/2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten :

8

4.5. Andere vermeldingen :

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).
- Bevat diquat. Kan een allergische reactie veroorzaken.
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

- SPo2: Was alle beschermende kleding na gebruik.
- Een te vroege vooroogstbehandeling kan een zware vermindering van de oogst ten gevolge hebben.
- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2:

- Op het etiket te vermelden co-formulanten: /.
- P280: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
- P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

5. Geldigheidsduur van de toelating

5.1. Geldigheidsduur : vanaf 12/09/2016 tot en met 30/06/2018

5.2. Bijzondere voorwaarden voor de verlenging :

/

Deze toelating vervangt elke voorgaande toelating betreffende dit product.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:

De toelating is slechts geldig voor zover mij de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

GUELTON O.
Celhoofd Toelatingen

Bijlage 1

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden :

Te behandelen	: koolzaad (open lucht)
Toepassingsstadium	: 80% van de hauwen zijn rijp - volrijpheid : bijna alle hauwen zijn rijp (BBCH 88-89)
Opmerking	: maximum 1000 g diquat/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: onkruiden
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, 1 plaatselijke toepassing, in combinatie met een uitvloeier, alleen in geval van belangrijke overwoekering door onkruiden zoals kleeftkruid
Veiligheidstermijn	: 4 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardappelen (open lucht)
Opmerking	: maximum 1000 g diquat/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: aardappelbloem (Solanum tuberosum)
Dosis / Concentratie	: 5 l/ha, eventueel gefractioneerd toedienen in 2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 4 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardappelwortelgoedteelt (open lucht)
Opmerking	: maximum 1000 g diquat/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: aardappelbloem (Solanum tuberosum)
Dosis / Concentratie	: 5 l/ha, eventueel gefractioneerd toedienen in 2 toepassingen, in functie van de stand van het gewas. De stand van het gewas hangt o.a. af van de variëteit (bladontwikkeling), het type behandeling (volledig veld, of rijbehandeling na mechanische worteldoding) of voorafgaande behandelingen met een ander worteldodingsmiddel.
Veiligheidstermijn	: 4 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: boomgaard
Opmerking	: maximum 2 toepassingen per teelt, maximum 1000 g diquat/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: opslag van fruitboomstronken
Dosis / Concentratie	: 5 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: voedererwten (drooggeogst) (open lucht)
Toepassingsstadium	: voor de oogst, rijping volledig (BBCH 89); hooguit 8 dagen voor de oogst
Opmerking	: maximum 1000 g diquat/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: onkruiden
Dosis / Concentratie	: 3 l/ha, 1 plaatselijke toepassing, zonder uitvloeier, enkel in geval van belangrijke overwoekering door onkruiden zoals echte kamille, melganzewort of korrelganzewort
Veiligheidstermijn	: 4 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

Te behandelen	: tijdelijk onbeteelde landbouwgronden
Toepassingsstadium	: ten laatste 1 dag voor het zaaien of het planten
Opmerking	: maximum 1000 g diquat/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: onkruiden
Toepassingsstadium	: ontwikkelde vegetatie
Dosis / Concentratie	: 3-5 l/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: alle teelten
Toepassingsstadium	: ten laatste 1 dag voor de opkomst of zonder de gewassen te raken
Opmerking	: maximum 1000 g diquat/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: onkruiden
Toepassingsstadium	: ontwikkelde vegetatie
Dosis / Concentratie	: 3-5 l/ha of 0,05 l/10 l/are, 1 toepassing, plaatselijke behandeling
Veiligheidstermijn	: 10 dagen voor het maaien, het inkuilen of het beweiden
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomerhaver (open lucht)
Toepassingsstadium	: volrijpheid (BBCH 89)
Opmerking	: maximum 1 toepassing/teelt, enkel voor veevoeding, maximum 1000 g diquat/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: onkruiden
Dosis / Concentratie	: 2-4 l/ha, 1 plaatselijke toepassing, in combinatie met een uitvloeier, in gelegerd graan en volgens de ontwikkeling van de onkruiden
Ter bestrijding van	: doorwas van graangewassen
Dosis / Concentratie	: 2-4 l/ha, 1 plaatselijke toepassing, in combinatie met een uitvloeier, volgens de ontwikkeling van de onkruiden
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterhaver (open lucht)
Toepassingsstadium	: volrijpheid (BBCH 89)
Opmerking	: maximum 1 toepassing/teelt, enkel voor veevoeding, maximum 1000 g diquat/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: onkruiden
Dosis / Concentratie	: 2-4 l/ha, 1 plaatselijke toepassing, in combinatie met een uitvloeier, in gelegerd graan en volgens de ontwikkeling van de onkruiden
Ter bestrijding van	: doorwas van graangewassen
Dosis / Concentratie	: 2-4 l/ha, 1 plaatselijke toepassing, in combinatie met een uitvloeier, volgens de ontwikkeling van de onkruiden
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met klassieke techniek

Te behandelen	: hop (open lucht)
Toepassingsstadium	: juli
Opmerking	: maximum 1000 g diquat/ha/12 maanden
Ter bestrijding van	: ongewenste scheut- en bladvorming
Dosis / Concentratie	: 1,8 l/1120 l/ha, voor de eerste 90-120 cm onderaan de hopstam.
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 20 m met 75% driftreducerende techniek

Algemene opmerking :

maximum 1000 g diquat/ha/12 maanden

Bijlage 2

CLP-etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 en
Verordening (EG) Nr. 547/2011

Signaalwoorden :

Gevaar

Gevarenpictogrammen en hun GHS-code :Gevarenaanduidingen (H-zinnen):

H302	H315	H317	H331
H335	H372	H410	

Aanvullende informatie(EUH-zinnen) :

EUH210	EUH401
--------	--------

Standaardzinnen bijzondere risico's (R SH-zinnen) :Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) :

P102	P260	P270	P272
P273	P280	P301	P330
P363	P391	P302+P352	P308-P311
P403+P233	P501		