



FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DG Dier, Plant en Voeding (DG4)

DIENST
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN
MESTSTOFFEN

SYNGENTA CROP PROTECTION N.V.
POSTBUS 512
4600 AM BERGEN OP ZOOM
NEDERLAND

Correspondent :

NELE VAN HAUWE
Attaché
02 524 72 65

Onze referten :

Dossiernummer : 3779

Datum : 06/12/2016

1/21

Betreft : Intrekking gebruik kiwibes

TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL OF TOEVOEGINGSSTOF

1. Algemene bepalingen van de toelating

In toepassing van de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21/10/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad, en het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, en overeenkomstig het advies van het Erkenningscomité, wordt het product :

PIRIMOR

met de hieronder vermelde specificaties en voorwaarden toegelaten onder het

nummer : **6640P/B**

voor : **BEROEPSGEBRUIK**

als : Insecticide

op naam van : SYNGENTA CROP PROTECTION N.V.



2. Samenstelling en vorm2.1. Algemene bepalingen :

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening Nr. 1107/2009 moeten de samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de bij de aanvraag of later verstrekte gegevens.

2.2. Werkzame stof(fen) en gewaarborgde gehalte(n) :

PIRIMICARB

50 %

Algemene opmerking

/

2.3. Formuleringstype : WG (Water dispergeerbaar granulaat)3. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Zie bijlage

4. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen4.1. Gevarencategorie(ën) : giftig, irriterend, sensibiliserend en milieugevaarlijk

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) Nr. 547/2011 van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen en het KB van 28/02/1994 tot regeling van de indeling en de verpakking moeten de volgende vermeldingen op het etiket vermeld worden.

4.2. De volgende symbolen van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG of van de bijlage XIV van het KB van 28/02/1994 en het KB van 11/01/1193 tot regeling van de indeling en de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op de markt brengen of het gebruik ervan :

T, N

4.3. De volgende R en S zinnen van de bijlage XIII van het KB van 28/02/1994 :

4.3.1. R20-R25-R36-R40-R43-R50/53

4.3.2. S2-S13-S20/21-S23-S24/25-S26-S36/37-S45-S35-S61

4.4. Aantal punten toegekend in toepassing van art. 2bis §1 van het KB van 14/01/2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten :

7

4.5. Andere vermeldingen :

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPE3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).
- SPE8: Gevaarlijk voor bijen. Gebruik dit product niet op het ogenblik dat de bijen actief naar voedsel zoeken.
- Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op de natuurlijke vijanden van

bladluizen en andere nuttige arthropoden, met uitzondering van zweefvliegen.

- Groenteteelten onder glas: het product kan samen ingezet worden met de meeste biologische bestrijdingsmiddelen, indien maximaal één maal om de twee maanden toegepast.

- Fruitboomgaarden: het product kan gebruikt worden in de geïntegreerde bestrijding in fruitboomgaarden.

- De soorten en variëteiten van sierplanten die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

- SPO: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2:

- Op het etiket te vermelden co-formulanten: /

- P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen.

- P321: Specifieke behandeling vereist (zie eerste hulp aanwijzingen op dit etiket).

- P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

5. Geldigheidsduur van de toelating

5.1. Geldigheidsduur : vanaf 06/12/2016 tot en met 30/04/2019

5.2. Bijzondere voorwaarden voor de verlenging :

Evaluatie van de aanvraag tot her-erkenning

Deze toelating vervangt elke voorgaande toelating betreffende dit product.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:

De toelating is slechts geldig voor zover mij de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

GUELTON O.
Celhoofd Toelatingen

Bijlage 1

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden :

Te behandelen	: aalbessen (witte, rode, zwarte) (open lucht)
Opmerking	: Max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 kg/ha haag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bloedluizen(Eriosoma)
Dosis / Concentratie	: 0,5 kg/ha haag, met toevoeging van een hiervoor erkende uitvloeier, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: veenbessen (open lucht)
Opmerking	: Max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 kg/ha haag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bloedluizen(Eriosoma)
Dosis / Concentratie	: 0,5 kg/ha haag, met toevoeging van een hiervoor erkende uitvloeier, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: blauwe / rode bosbessen (open lucht)
Opmerking	: Max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 kg/ha haag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bloedluizen(Eriosoma)
Dosis / Concentratie	: 0,5 kg/ha haag, met toevoeging van een hiervoor erkende uitvloeier, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: frambozenstruiken (open lucht)
Opmerking	: Max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 kg/ha haag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bloedluizen(Eriosoma)
Dosis / Concentratie	: 0,5 kg/ha haag, met toevoeging van een hiervoor erkende uitvloeier, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: braamstruiken (open lucht)
Opmerking	: Max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 kg/ha haag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bloedluizen(Eriosoma)
Dosis / Concentratie	: 0,5 kg/ha haag, met toevoeging van een hiervoor erkende uitvloeier, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek

Te behandelen	: stekelbes (kruisbes) en kruisingen (open lucht)
Opmerking	: Max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 kg/ha haag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bloedluizen(Eriosoma)
Dosis / Concentratie	: 0,5 kg/ha haag, met toevoeging van een hiervoor erkende uitvloeier, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardappelpootgoedteelt (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: paprika/spaanse peper (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,32 kg/ha haag, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 1 dag
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: aubergine/eierplant en pepino (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,32 kg/ha haag, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 1 dag
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: komkommer (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,32 kg/ha haag, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 1 dag
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: courgette/patisson (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,32 kg/ha haag, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 1 dag
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: courgette/patisson (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 1 dag
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: augurk (onder bescherming)

Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,32 kg/ha haag, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 1 dag
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: augurk (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 1 dag
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: meloen (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,32 kg/ha haag, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: tomaten (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,32 kg/ha haag, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 1 dag
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: voederbieten (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,35 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: suikerbieten (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,35 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: voedererwten (drooggeogst) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: drooggeogste erwten (zonder peul) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen	: groengeoogste erwten (met peul) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: groengeoogste erwten (zonder peul) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (groengeoogst, zonder peul) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (drooggeogst) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 kg/ha haag (verticale teelt) of 0,4 kg/ha bodem (horizontale teelt), het gewas over maximaal 1,20 m hoogte behandelen, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: stamslabonen (prinsessen-, snijbonen) (groengeoogst, met peul) (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 kg/ha haag (verticale teelt) of 0,4 kg/ha bodem (horizontale teelt), het gewas over maximaal 1,20 m hoogte behandelen, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: bloemkool (witte en groene) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen

Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: broccoli (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: koolrabi (koolraap-boven-de-grond) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: raap (stoppelraap, meiraap) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,3 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: koolraap (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: schorseneren (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: pastinaak (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: mierikswortel (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen

Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wortelen (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: knolselder (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: knolvenkel (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 21 dagen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: radijs (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: radijs (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: rammenas en rettich (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: rammenas en rettich (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: rode biet (kroten) (open lucht)

Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: witloofwortelteelt (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: cichorei (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: slasoorten (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: slasoorten (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: vanaf 1/3 tot 31/10: 14 dagen vanaf 1/11 tot 28/2: 28 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: spinazie (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: warmoes (snijbiet) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: peterselie (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen	: wortelpeterselie (consumptie wortels) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: dille (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: kervel (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: engelwortel (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: koriander (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: lavas, maggiplant (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: bieslook (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: rucola (open lucht)

Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardappelen (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardbeien (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: aardbeien (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 50 g/100 l water
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 50 g/100 l water
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: zomertarwe (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,25 kg/ha, 1-2 toepassingen, maar enkel in geval van zware aantasting.
Veiligheidstermijn	: 35 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wintertarwe (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,25 kg/ha, 1-2 toepassingen, maar enkel in geval van zware aantasting.
Veiligheidstermijn	: 35 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen	: zomergerst (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,25 kg/ha, 1-2 toepassingen, maar enkel in geval van zware aantasting.
Veiligheidstermijn	: 35 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: wintergerst (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,25 kg/ha, 1-2 toepassingen, maar enkel in geval van zware aantasting.
Veiligheidstermijn	: 35 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterrogge (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,25 kg/ha, 1-2 toepassingen, maar enkel in geval van zware aantasting.
Veiligheidstermijn	: 35 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomerrogge (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,25 kg/ha, 1-2 toepassingen, maar enkel in geval van zware aantasting.
Veiligheidstermijn	: 35 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: zomerhaver (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,25 kg/ha, 1-2 toepassingen, maar enkel in geval van zware aantasting.
Veiligheidstermijn	: 35 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: winterhaver (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,25 kg/ha, 1-2 toepassingen, maar enkel in geval van zware aantasting.
Veiligheidstermijn	: 35 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: spelt (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,25 kg/ha, 1-2 toepassingen, maar enkel in geval van zware aantasting.
Veiligheidstermijn	: 35 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Te behandelen	: triticale (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,25 kg/ha, 1-2 toepassingen, maar enkel in geval van zware aantasting.
Veiligheidstermijn	: 35 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: appelbomen (open lucht)
Opmerking	: Max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 kg/ha fruitboomhaag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bloedluizen(Eriosoma)
Dosis / Concentratie	: 0,5 kg/ha fruitboomhaag, met toevoeging van een hiervoor erkende uitvloeier, 1-2 toepassingen.
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: perenbomen (open lucht)
Opmerking	: Max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 kg/ha fruitboomhaag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bloedluizen(Eriosoma)
Dosis / Concentratie	: 0,5 kg/ha fruitboomhaag, met toevoeging van een hiervoor erkende uitvloeier, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: abrikoos (open lucht)
Opmerking	: Max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 kg/ha fruitboomhaag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bloedluizen(Eriosoma)
Dosis / Concentratie	: 0,5 kg/ha fruitboomhaag, met toevoeging van een hiervoor erkende uitvloeier, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: perzikkbomen (open lucht)
Opmerking	: Max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 kg/ha fruitboomhaag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bloedluizen(Eriosoma)
Dosis / Concentratie	: 0,5 kg/ha fruitboomhaag, met toevoeging van een hiervoor erkende uitvloeier, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: kersen- en kriekenbomen (open lucht)
Opmerking	: Max. 2 toepassingen/teelt

Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 kg/ha haag (laagstam) of 0,05 kg/100 l (hoogstam), 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bloedluizen(Eriosoma)
Dosis / Concentratie	: 0,5 kg/ha haag (laagstam) of 0,05 kg/100 l (hoogstam), met toevoeging van een hiervoor erkende uitvloeier, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: pruimenbomen (open lucht)
Opmerking	: Max. 2 toepassingen/teelt
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,5 kg/ha fruitboomhaag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van	: bloedluizen(Eriosoma)
Dosis / Concentratie	: 0,5 kg/ha fruitboomhaag, met toevoeging van een hiervoor erkende uitvloeier, 1-2 toepassingen
Veiligheidstermijn	: 3 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek
Te behandelen	: peterselie (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: dille (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: kervel (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: koriander (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: lavas, maggiplant (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)

Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: bieslook (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: snijselder (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: roomse kervel (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: salie (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: rozemarijn (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: tijm (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: marjolein/oregano (consumptie bladeren en/of stengels)(open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing

Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: citroenmelisse (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: basilicum (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: munt (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: laurier (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: dragon (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: snijselder (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: roomse kervel (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /

Te behandelen	: salie (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: rozemarijn (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: tijm (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: marjolein/oregano (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: citroenmelisse (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: basilicum (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: munt (consumptie bladeren en/of stengels)(onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /

Te behandelen	: laurier (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: dragon (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 10 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: /
Te behandelen	: spruitkool (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassing
Veiligheidstermijn	: 4 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: selderij (bleek-, groene en witte) (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
Te behandelen	: knolvenkel (open lucht)
Ter bestrijding van	: bladluizen(Aphididae)
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha, 1-2 toepassing
Veiligheidstermijn	: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Algemene opmerking :

/

Bijlage 2

CLP-etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 en
Verordening (EG) Nr. 547/2011

Signaalwoorden :

Gevaar

Gevarenpictogrammen en hun GHS-code :Gevarenaanduidingen (H-zinnen):

H301	H317	H319	H332
H351	H410		

Aanvullende informatie(EUH-zinnen) :

EUH210	EUH401
--------	--------

Standaardzinnen bijzondere risico's (R SH-zinnen) :Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) :

P102	P261	P270	P272
P273	P280	P321	P330
P363	P391	P301+P310	P302+P352
P304+P340	P305+P351+P338	P308-P311	P501